3.2.276

[redacted]

Digitized by Google

MÉMOIRES,

POUR SERVIR À

L'HISTOIRE

D'UN GENRE DE

POLYPES

D'EAU DOUCE,

À BRAS EN FORME DE CORNES:

Par A. TREMBLEY, de la Société Royale.



A LEIDE,

Chez JEAN & HERMAN VERBEEK,

M. DCC. XLIV.

Digitized by Google

PREFACE.

COMME il y a divers Animaux qui peuvent être placés dans la Claſſe des Polypes, j'ai cru qu'il étoit néceſſaire, pour déſigner ceux dont il eſt queſtion dans ces *Mémoires*, d'ajouter au nom general de Polype, l'indication de quelques-uns de leurs caractéres. Je leur ai donc donné le nom de *Polype d'eau douce*, pour les diſtinguer des Polypes de mer. Mais, cette diſtinction n'étant pas ſuffiſante, parce qu'on trouve dans les eaux douces pluſieurs genres d'Animaux, qui paroiſſent devoir être rangés dans la Claſſe des Polypes, j'ai cherché dans les Polypes, dont je dois parler, un caractére qui pût ſervir à indiquer même leur genre, & à le diſtinguer des autres genres de Polypes d'eau douce. Ils n'en ont point de plus facile à remarquer, que celui que préſente la forme de leurs bras: & c'eſt pour cela, que je les ai appellés *Polypes d'eau douce à bras en forme de cornes.*

LES Obſervations, que renferment ces *Mémoires*, ſont le fruit des Recherches, que j'ai faites ſur ces Ani-

maux, pendant trois Ans & demi. Après m'être assuré que les Polypes avoient la propriété remarquable de pouvoir être multipliés par la Section, je fus curieux d'approfondir leur Histoire. Je me mis donc à les étudier avec attention, & avec assiduité. Je ne croiois pas d'abord, que ces Animaux m'occuperoient aussi long-tems qu'ils ont fait. Les deux premiéres années que je les ai observés, j'ai été, en quelque maniére, entrainé d'une Observation à l'autre : ensorte que je n'ai eu que le tems de faire ces Observations, & de les noter dans mon Journal; & c'est pourquoi je n'ai pu commencer de bonne heure à dresser les *Mémoires* que je donne à présent au Public.

Quand même j'aurois eu le loisir de les dresser, il est aisé de comprendre, que je n'aurois pu que difficilement m'y résoudre, tant que j'aurois été en train de faire des Observations intéressantes. Ces Observations ne pouvoient que fournir une nouvelle matiére pour mes *Mémoires*, & même influer plus ou moins sur le plan que je devois suivre en les écrivant. D'ailleurs, les Polypes étant pour moi des objets parfaitement inconnus, lorsque j'ai commencé à les observer, j'étois obligé de donner une grande attention, même aux plus petites circonstances, pour n'en laisser échapper aucune, qui pût être importante. Si donc, j'avois écrit dans ces commencemens, j'aurois couru ris-

risque, par cela même, d'entrer dans le détail d'un grand nombre de Faits peu conſidérables, qu'on ne doit en quelque façon faire ſentir, que par la maniére dont on expoſe les autres; mais qu'on n'eſt en état de conſidérer dans leur véritable point de vue, que lorsqu'on a une connoiſſance plus étendue du ſujet dont il s'agit. Outre cela, j'ai été obligé, pour vérifier certains Faits, d'attendre d'une année à l'autre, afin de faire les mêmes Obſervations, préciſément dans les mêmes circonſtances.

QUELQUE informe qu'eût pu être la Rélation de mes Obſervations ſur les Polypes, je me ſerois empreſſé à la faire paroitre, ſi je n'avois pas eu d'autre moïen de publier ce qu'elle pouvoit renfermer de plus intéreſſant. Comme il m'a paru, dès que j'ai commencé à obſerver les Polypes, que la connoiſſance des propriétés remarquables, qui ſe trouvent dans ces Animaux, pouvoit faire plaiſir aux Curieux, & contribuer en quelque choſe aux progrès de l'Hiſtoire Naturelle, je me ſuis fait un devoir de communiquer mes Découvertes, à meſure que je les ai faites. J'ai donné des Polypes, autant que je l'ai pu, à ceux qui ont ſouhaité de repeter mes Expériences; & je leur ai indiqué comment je m'y ſuis pris pour les faire.

IL eſt arrivé de là, que les Polypes ont été aſſés généralement connus en peu de tems; & qu'on a été,

en plusieurs endroits, en état de vérifier une partie de mes Expériences. C'est ce qu'a fait Mr. Baker en Angleterre l'Eté dernier à l'égard de quelques-unes. Il a publié peu après le Journal de ses Observations, auxquelles il a joint un Abrégé de ce qui étoit déjà imprimé sur les Polypes, dans la Préface du sixiéme Tome des *Mémoires sur les Insectes* de Mr. de Reaumur, & dans les nombres 467 & 469 *des Transactions Philosophiques.*

Il m'auroit été impossible d'exposer clairement mes Observations, sans le secours d'un grand nombre de Figures. Je n'ai pas été moins heureux à cet égard, qu'à celui de la Découverte que j'ai faite sur les Polypes. Sans flatter l'habile Dessinateur, à la bonté duquel je suis redevable des Figures, qui accompagnent cet Ouvrage, je puis bien dire, qu'il n'y en a point qui eût pu, comme lui, exécuter les Dessins nécessaires, pour faciliter l'intelligence des Descriptions que je devois donner. Il m'a suffi de mettre les objets sous les yeux de Mr. Lyonet, pour qu'il vît tout ce qu'il auroit été difficile de faire remarquer à d'autres. C'est qu'il est, non seulement habile Dessinateur, mais encore Observateur pénétrant & expérimenté.

Mr. Lyonet a, non seulement dessiné les Figures qui accompagnent cet Ouvrage, mais, il a même gravé

vé les huit derniéres Planches. Je ne ſaurois mieux faire l'éloge de la beauté de la Gravure, qu'en renvoiant à ces Planches. Il ſuffit de les voir, pour les admirer.

On ſera, peut-être, ſurpris de ce que Mr. Lyonet n'a pas gravé les cinq premiéres; mais on le ſera bien davantage de ce que je vais dire à cette occaſion. Les Deſſins de ces cinq Planches furent prêts à être gravés au mois de Mai de l'année paſſée *. Dans ce tems-là, Mr. Lyonet ne ſavoit pas encore graver, & n'avoit même jamais vu graver. Cependant, il étoit déjà, le mois ſuivant, un excellent Graveur. On aura, peut-être, de la peine à croire ce que je dis. C'eſt néanmoins un Fait, qui a eu pluſieurs temoins. Mr. Lyonet, s'étant trouvé au mois de Mai 1743 avec un des plus habiles Graveurs de la Hollande, lui montra pluſieurs Deſſins, qu'il a faits, des Inſectes qu'il a obſervés. La beauté de ces Deſſins frappa Mr. Wandelaar, (c'eſt le Graveur dont il s'agit,) & il y reconnut tant d'art & tant de facilité, qu'il ſe perſuada d'abord, qu'il ne tiendroit qu'à Mr. Lyonet d'exceller dans la Gravure, comme il excelloit dans le Deſſin. Il l'exhorta à faire un Eſſai. Mr. Lyonet ſe rendit donc au milieu du mois de Juin ſuivant chés Mr. Wandelaar à Leyde. Ce fut alors, qu'il mania, pour la

* 1743.

la premiére fois de ſa vie, la pointe & le burin. Il grava une de ces Mouches, nommées *Demoiſelles*; & ſon premier Ouvrage pourroit facilement être pris pour celui d'un Maitre. Ce ſuccès détermina Mr. Lyonet à raſſembler les outils néceſſaires pour graver; &, dès qu'il les eut, il grava de ſuite trois Papillons, qui furent encore une preuve de ſa prodigieuſe facilité. Enfin, il entreprit de graver des Polypes. Il a commencé par la Planche 6me, qui a été faite au mois de Septembre. La 7me a été achevée dans le mois d'Octobre; les 8me, 9me & 10me en Novembre & Décembre; & les trois derniéres dans le mois de Janvier ſuivant, & dans une partie de Février.

Si l'on fait attention au grand nombre de Figures que renferment ces Planches, & à la délicateſſe avec laquelle elles ſont gravées, on ne pourra qu'être porté à croire, qu'elles ont occupé Mr. Lyonet pendant tout le tems dont je viens de parler, c'eſt-à-dire, depuis le mois de Septembre 1743, juſqu'au milieu du mois de Février ſuivant. Cependant, il n'a emploié à cet ouvrage, qu'une petite partie de ce tems-là, qu'une partie du loiſir que ſes divers Emplois lui ont laiſſé.

On peut juger par-là, & par tout ce que j'ai dit ſur les progrès de Mr. Lyonet dans un Art ſi difficile, que ſes Gravures nous offrent un prodige auſſi re-

remarquable dans ſon Eſpéce, que ceux que renferment les Animaux qu'elles repréſentent.

Mr. Lyonet commence à préſent à graver les Inſectes qu'il a lui-même obſervés, & dont les Deſſins font l'admiration de tous ceux qui les voient. Il eſt fort à ſouhaiter, que ſes occupations lui permettent de faire paroitre un Ouvrage, digne à tous égards de la curioſité de ceux qui aiment les Sciences & les Arts; & très propre à hâter les progrès de l'Hiſtoire Naturelle. Perſonne n'eſt plus capable d'y contribuer, qu'un habile Obſervateur, qui eſt en même tems excellent Deſſinateur & Graveur.

Je ſuis bien aiſe, que Mr. Lyonet m'ait permis de publier une Découverte qu'il a faite, ſur un ſujet qui attire depuis quelques années, avec beaucoup de raiſon, l'attention des Naturaliſtes. On a vu, dans le treiziéme *Mémoire* du ſixiéme Tome de l'Ouvrage de Mr. de Reaumur, ce qui a été découvert ſur la Génération de diverſes eſpéces de Pucerons terreſtres. Il eſt fait mention, dans ce *Mémoire* *, d'un Fait très intéreſſant, vu par Mrs. Lyonet & Bonnet. C'eſt que des Pucerons vivipares ont fait auſſi des corps oblongs, qui ſemblent être des œufs. Mr. de Reaumur, en rapportant ce Fait, demande, ſi ces corps oblongs ſont réel-

* Pag. 556.

réellement des œufs. C'eſt l'idée que Mr. Lyonet a eue dès qu'il les a vus ; & que l'expérience a juſtifiée, au moins par rapport à cette eſpéce de Pucerons, dont parle Mr. de Reaumur dans le neuviéme *Mémoire* du troiſiéme Tome de ſon Ouvrage ſur les Inſectes *, & qui ſont repréſentés dans les Figures 5, 6, 7, 8, 9 & 10 de la Planche 28me. Mr. Lyonet, aiant remarqué, au mois d'Avril 1743, des Fourmis qui ſe raſſembloient ſur l'écorce d'un Chêne, fut curieux de connoitre ce qui les y attiroit. Il trouva de petits corps oblongs & bruns, qu'il ſoupçonna d'abord être des œufs de Pucerons. Il les porta chés lui, les conſerva avec ſoin, & en vit, en effet, au bout d'une quinzaine de jours, ſortir des Pucerons, qu'il reconnut être de l'eſpéce décrite par Mr. de Reaumur à l'endroit cité ci-deſſus. Mr. Lyonet m'en a fait voir un, qui ſortoit de l'œuf. Il étoit reſté pluſieurs œufs ſur un des Chênes où Mr. Lyonet en avoit trouvés. Les Pucerons, qui en ſont ſortis, ſe ſont nourris ſur ce Chêne, & y ont beaucoup multiplié. Mais, il eſt à remarquer, que, depuis le mois d'Avril juſqu'à la fin de Septembre, on n'a jamais pu trouver un ſeul œuf ſur l'écorce du Chêne: on y a trouvé, au contraire, très ſouvent des meres qui produiſoient des petits. Quand la ſaiſon eſt devenue plus froide, on n'a pu découvrir, ni Pucerons, ni œufs. Ce-

* Pag. 334 & ſuiv.

Cependant il y avoit des œufs ſur le Chêne dont il s'agit, car au commencement du Printems on en a trouvé, comme l'année précédente, par le moïen des Fourmis qui ſe raſſembloient autour. Les petits Pucerons en ſont ſortis au commencement de Mai. Il eſt à remarquer que quand on a trouvé des œufs, on n'a point vu de petits, & que quand on a trouvé des petits, on n'a plus vu d'œufs. On ſeroit porté à croire, ſur ces Obſervations que Mr. Lyonet ſe propoſe de repeter, que cette eſpéce de Pucerons du Chêne eſt vivipare en Eté, & ovipare ſur la fin de l'automne; que la derniére génération de l'année qui multiplie, fait des œufs, & non des petits; & que ce ſont ces œufs, qui doivent conſerver, pendant l'Hyver, la génération qui doit commencer à faire des petits au Printems.

Les cinq premiéres Planches, que Mr. Lyonet n'a pas gravées, ſont l'ouvrage d'un habile Diſciple du célébre Bernard Picart. Quoiqu'il n'y ait que peu de tems que Mr. Van der Schley a commencé à graver des Inſectes, il eſt déjà parvenu à un point de perfection, qui prouve ce qu'on doit attendre de lui dans ce genre. C'eſt un grand bonheur, que, dans un tems où l'on s'applique de plus en plus à l'Etude des Inſectes, il ſe trouve un Ouvrier ſi propre à ſéconder par ſes talens ceux qui travaillent à l'Hiſtoire Naturelle de ces Animaux.

C'EST auſſi Mr. Van der Schley, qui a gravé, ſur les Deſſins de Mr. Pronk, les Vignettes qui ſe trouvent à la tête de ces *Mémoires*. Les Points-de-Vûe, qui ſont repréſentés dans ces Tailles-douces, ſont pris ſur les lieux avec une grande exactitude. Ce ſont des Points-de-Vûe de Sorgvliet, maiſon de Campagne de Mr. le Comte de Bentinck. C'eſt-là, où j'ai trouvé des Polypes, & où j'ai fait la plupart des Obſervations dont il eſt parlé dans ces *Mémoires*. J'ai été ſouvent accompagné dans cet endroit à la pêche des Polypes, & à la Chaſſe de divers autres Inſectes, par mes deux Eleves; & j'ai eu de fréquentes occaſions d'éprouver avec eux, que l'on peut, même dès l'Enfance, commencer à gouter les plaiſirs que donne la contemplation de la Nature. Elle préſente à un Enfant un ſpectacle, qui commence par l'amuſer, mais qui enſuite pique ſa curioſité, l'inſtruit, le ravit, le touche même, & accoutume ſon eſprit à gouter tout ce qu'il y a de plus beau.

LA Vignette, qui eſt au commencement du premier *Mémoire*, a rapport à ce qui eſt dit dans ce *Mémoire*, & dans le ſuivant, ſur la Pèche des Polypes. On voit au bord d'un Vivier de Sorgvliet trois Perſonnages, dont deux ſont occupés à chercher des Polypes. L'un en cherche ſur des Plantes aquatiques qu'il tient dans ſa main, & celui, qui eſt vis-à-vis, tâche d'en

d'en découvrir ſur celles qui ſont dans un verre plein d'eau. J'ai trouvé très ſouvent des Polypes dans le Vivier, dont un bout eſt repréſenté dans cette Vignette. On découvre une partie de la Serre de l'Orangerie de Sorgvliet, de l'endroit où les trois Figures ſont placées.

Le ſujet de la Vignette, qui eſt au commencement du ſecond *Mémoire*, eſt pris dans ce *Mémoire* *. Un Homme, placé au bord du Vivier qui eſt au milieu de la Ménagerie de Sorgvliet, pêche des Pucerons d'eau avec l'inſtrument, décrit à l'endroit cité au bas de la page. Il eſt repréſenté dans le moment où il tire de l'eau le cerceau qui ſert à les raſſembler. Deux inſtruments, propres à pêcher les Pucerons, ſont appuiés contre les deux premiers Arbres à gauche.

Il s'agit, dans la Vignette du troiſiéme *Mémoire*, de la Pêche des Vers, décrite dans le ſecond *Mémoire* à la page 99me. Un Homme, placé au bord d'un Vivier, tient dans l'eau un inſtrument propre à pêcher des Vers, décrit à l'endroit que je viens de citer, & tel que celui qui eſt appuié contre le ſecond Arbre à gauche. Le Verre dans lequel il met les Vers, après les avoir tirés de l'eau, eſt à côté de lui. Deux jeunes Gens ſont aſſis auprès, & s'amuſent à conſide-

rer

* Pag. 97.

rer ceux qui y ſont déjà. Cette Vignette-ci, & celle qui eſt au commencement du premier Mémoire, repréſentent chacune un bout du même Vivier.

On voit, dans la Vignette du quatriéme *Mémoire*, un Homme debout devant une table, occupé à faire l'opération la plus difficile dont il ſoit parlé dans ce *Mémoire* *. Il retourne un Polype. Sa main gauche eſt ouverte, & il retourne le Polype qui eſt ſur le bord, avec une ſoie de ſanglier qu'il tient dans la droite. Le ſoleil, qui entre dans la chambre par la fenêtre qui eſt à la droite de cet Homme, donne ſur le Polype, & le rend plus diſtinct pour celui qui fait l'opération, & pour celui qui conſidére ce Polype avec le ſecours d'une loupe. On a tâché de repréſenter, dans les deux grands poudriers placés ſur la tablette de la fenêtre qui eſt entiérement ouverte, des groupes de Polypes, tels que celui qui eſt de grandeur naturelle dans la Planche IX. Il y a, d'un côté du poudrier qui occupe le milieu de cette tablette, un verre enfermé dans l'Etui de carton, dont il eſt parlé à la fin du premier *Mémoire* †. On voit aſſés diſtinctement l'ouverture, faite en forme de chevron, qui eſt à un des côtés de cet Etui. C'eſt auprès de cette Ouverture que ſe rendent

* Pag. 253.
† Pag. 66.

dent les Polypes. Elle eſt dans cette Figure tournée du côté de la chambre : mais, il convient, pour faire l'Expérience qui prouve que les Polypes ont un penchant pour la lumiére ; il convient, dis-je, de la tourner vers le grand jour. La tablette de fenêtre où eſt cet Etui, eſt celle ſur laquelle j'ai tenu pendant longtems le premier verre garni de Polypes que j'ai eu, & dont il eſt parlé dans le premier *Mémoire* *.

* Pag. 7. & 11.

TABLE

DES

MEMOIRES.

PREMIER MEMOIRE.

OU l'on décrit les Polypes, leur Forme, leurs Mouvemens, & une partie de ce qu'on a pu découvrir ſur leur Structure. Pages 1–78.

SECOND MEMOIRE.

De la Nourriture des Polypes, de la Maniére dont ils ſaiſiſſent & avalent leur Proie, de la Cauſe de la Couleur des Polypes, & de ce qu'on a pu découvrir de plus ſur leur Structure. Du Tems, & des Moïens les plus propres, pour trouver des Polypes. Pag. 79–148.

TROISIEME MEMOIRE.

De la Génération des Polypes. Pag. 149–228.

QUATRIEME MEMOIRE.

Opérations faites ſur les Polypes, & les ſuccès qu'elles ont eus. Pag. 229–322.

MÉMOI-

Digitized by Google



MÉMOIRES POUR L'HISTOIRE DES POLYPES.

PREMIER MÉMOIRE.

Où l'on décrit les Polypes, leur Forme, leurs Mouvemens, & une partie de ce qu'on a pu découvrir ſur leur Structure.

DES Faits auſſi ſinguliers, auſſi contraires aux idées généralement reçues ſur la nature des Animaux, que le ſont ceux que m'a fait voir l'Inſecte dont je vais donner l'Hiſtoire, demandent, pour être admis, les preuves les plus évidentes. Il eſt arrivé plus d'une fois, que la précipitation, & l'amour

du merveilleux, ont induit les Naturaliſtes en erreur, & leur ont déguiſé des objets, très faciles d'ailleurs à reconnoître pour ce qu'ils étoient. Il ne ſuffit donc pas de dire qu'on a vu telle choſe. Ce n'eſt rien dire, ſi, en même tems, on n'indique comment on l'a vue, ſi on ne met ſes Lecteurs en état de juger de la maniére dont les Faits qu'on rapporte ont été obſervés.

J'AI autant & même plus beſoin que qui que ce ſoit, de ſuivre exactement cette règle. Les Faits que je dois rapporter ſont trop extraordinaires, pour que j'exige qu'on m'en croie ſur ma parole. J'expoſerai le plus clairement qu'il me ſera poſſible, tout ce qui m'y a conduit, & toutes les précautions que j'ai priſes pour éviter de me faire illuſion. J'introduirai, autant que je le pourrai, le Lecteur dans mon Cabinet, je lui ferai ſuivre mes Obſervations, & je mettrai ſous ſes yeux les moiens dont je me ſuis ſervi pour les faire. Il ſera lui même le témoin du ſuccès que j'ai eu.

MAIS je n'aurois pas été ſatisfait, ſi, en commençant cet Ouvrage, je n'euſſe pu établir la vérité des Faits remarquables d'Hiſtoire Naturelle qu'il doit renfermer, que ſur mes propres Obſervations. Ils ont beſoin de plus d'un témoin oculaire pour être crus. C'eſt ce que j'ai ſenti dès que je les ai vus. J'avois d'abord de la peine à en croire mes propres yeux; & je devois, à plus forte raiſon, penſer que d'autres auroient de la peine à les en croire.

JE n'ai donc rien négligé pour faire voir à d'autres tout ce que j'ai vu. J'ai été en cela auſſi heureux qu'il eſt poſſible. Les perſonnes qui ont bien voulu juger de mes propres Obſervations, & celles qui les ont répétées

pétées en leur particulier, peuvent, ſans contredit, être miſes au nombre des meilleurs juges. Il y en a dont le nom, connu depuis longtems, peut former ſeul une Autorité.

Mais quoique j'euſſe, dans ce Païs, des témoins excellens à portée d'être inſtruits, j'aurois été blâmé avec raiſon, ſi j'avois tardé à m'appuier du témoignage du grand Obſervateur qui fait l'ornement de la France & de ſon Siécle. Si je n'avois pas eu déja le bonheur d'être en correſpondance avec lui, ç'auroit été une raiſon ſuffiſante de le prier de m'accorder cette faveur, pour le mettre en état de juger de mes Obſervations, & de voir par lui même. Je n'ai pas beſoin d'avertir que je parle de Mr. de Reaumur. Il n'y a perſonne qui ait quelque gout pour l'Hiſtoire Naturelle, qui ne faſſe ſes délices de ſes Ouvrages; & il n'y a aucun Obſervateur dont les recherches ayent eu quelque ſuccès, qui ne ſe faſſe un devoir & une gloire d'avouër, qu'il en eſt redevable au gout que ces Ouvrages lui ont inſpiré, & aux grandes leçons qu'il y a trouvées.

Après avoir fait la découverte de la premiére des propriétés ſinguliéres que m'ont fait voir les Inſectes dont je vais parler, un de mes premiers ſoins a donc été d'en faire part à Mr. de Reaumur; & j'ai continué de lui communiquer celles que j'ai faites dans la ſuite. Je lui ai outre cela envoié de ces Animaux; & ſur ceux là, & ſur d'autres qu'il a trouvés en abondance autour de Paris, il a tenté la plupart des Expériences que j'ai faites. Mr. de Reaumur a donné à ces Animaux le nom de *Polypes*. Je ferai

voir dans la ſuite, qu'il n'étoit pas poſſible d'en choiſir un plus convenable.

Tous ceux qui, de mon ſçu, ont répété mes Expériences, ont eu le même ſuccès que moi. Les Expériences dont il s'agit ſurtout ici, & qui ont été les plus répétées par d'autres, conſiſtent à couper les petits Animaux qui en ſont l'objet, *transverſalement*, & *ſuivant leur longueur*, en deux ou en pluſieurs parties. Le réſultat de ces Expériences eſt, que toutes les parties de ces Animaux deviennent chacune des Animaux parfaits, au moien d'une reproduction très ſenſible de ce qui manquoit pour faire un Polype complet.

Le Public eſt déja inſtruit en particulier du ſuccès des Expériences de Mr. de Reaumur. Voici comment il s'exprime dans la Préface du ſixième Tome de ſes Mémoires ſur l'Hiſtoire des Inſectes *. *J'avouë pourtant, que lorſque je vis pour la premiére fois deux Polypes ſe former peu à peu de celui que j'avois coupé en deux, j'eus de la peine à en croire mes yeux, & c'eſt un fait que je ne m'accoutume point à voir, après l'avoir vu & revu cent & cent fois.* Mr. de Reaumur a enſuite coupé des Polypes en pluſieurs parties, & chacune de ces parties eſt devenuë un Polype entier. Il a auſſi appris au Public, que cette reproduction qu'on admire dans les Polypes, n'a pas plutôt été connuë, que lui même, & d'autres Obſervateurs, l'ont bientôt remarquée dans diverſes eſpéces de Vers. En deux ans de tems, elle eſt devenuë un Phénomène commun : de ſorte que ces Faits, qui d'abord ont paru incroiables, ſe trouvent à préſent vérifiés à l'égard

* Page 55.

gard de divers Animaux, qui diffèrent non ſeulement dans l'eſpéce, mais même dans le genre; &, ſelon toutes les apparences, on découvrira encore cette propriété dans un grand nombre d'autres.

La Préface de Mr. de Reaumur que je viens de citer, ne renferme pas le ſeul témoignage qui ait déja été rendu publiquement à pluſieurs des Faits ſinguliers d'Hiſtoire Naturelle que je vais expoſer. Il s'en trouve encore un bien reſpectable dans le Nombre 469. * des Tranſactions Philoſophiques. Mr. Folkes, Préſident de la Société Roiale de Londres, aiant ſouhaité de voir par ſes propres yeux ce qu'il avoit appris des Polypes, je lui en envoiai dans le mois de Février 1743, qui arrivérent heureuſement. Il en coupa d'abord de différentes maniéres, & il vit en peu de tems, des morceaux de Polype devenir des Polypes complets. Mr. Folkes rend compte à la Société Roiale, dans l'Article des Tranſactions Philoſophiques dont je viens de parler, du ſuccès des Expériences qu'il a faites pendant les quinze premiers jours qu'il a obſervé des Polypes. Il ſuffit de lire cet Ecrit, pour être parfaitement inſtruit d'une bonne partie de leur Hiſtoire, & pour être convaincu de la réalité de la plupart des Faits ſinguliers qu'elle contient.

* Art. 6.

Ces Animaux n'ont pas été entiérement inconnus juſqu'à préſent. Les Tranſactions Philoſophiques pour l'année 1703. en font mention *. On y voit les Obſervations que Lecuwenhoek, & un Anglois Anonyme ont faites ſur ces Inſectes. Il y a beaucoup de rapport entre les Obſervations de ces deux Meſſieurs.

* N°. 283. Art. IV. & N°. 288. Art. I.

Ils ont tous deux apperçu une des propriétés les plus remarquables des Polypes, ſavoir leur maniére naturelle de ſe multiplier. Elle les a frappés, & certainement ils n'auroient pas manqué de l'approfondir davantage, s'ils avoient eu un nombre conſidérable de Polypes. Leeuwenhoek n'a pu en découvrir que quelques uns, & l'Anonyme Anglois qu'un ſeul. Ils ont décrit leur Figure extérieure, & quelques uns de leurs Mouvemens.

Mr. Bernard de Juſſieu connoit depuis longtems les Polypes, & en a même fait deſſiner, comme nous l'apprend Mr. de Reaumur *. Je ſai outre cela, qu'ils ont été vus avant moi par quelques autres perſonnes; & il eſt même à préſumer, qu'ils ſe ſeront rencontrés ſous les yeux d'un plus grand nombre de Curieux, lorſqu'ils faiſoient des recherches ſur les Plantes, ou ſur les Animaux aquatiques.

* Préf. du Tom. VI. de l'Hiſt. des Inſ. pag. 54.

Aucun de ceux dont je viens de parler, n'a apperçu cette reproduction remarquable qui ſe fait dans les différentes parties d'un Polype, après qu'on les a ſéparées, parceque cette découverte devoit être par ſa nature, non le fruit d'une longue patience, & d'une grande ſagacité, mais un préſent du hazard. C'eſt à cet heureux hazard que je dois cette découverte, que j'ai faite ſans y penſer, & même ſans avoir eu de ma vie aucune idée qui y eut le moindre rapport.

Toute découverte ſinguliére rend naturellement curieux ſur la maniére dont elle a été faite. C'eſt ce dont j'ai pû juger par les queſtions qui m'ont été faites par un nombre conſidérable de perſonnes. Elles m'ont d'abord demandé, comment je m'étois aviſé de

de couper des Polypes, & comment j'étois parvenu à voir cette reproduction, en vertu de laquelle pluſieurs parties d'un même Polype deviennent chacune un Animal parfait. C'eſt ce qui m'a déterminé à commencer la Rélation de mes Obſervations ſur les Polypes, par répondre à cette queſtion.

DÈS le premier Eté * que j'ai paſſé à Sorgvliet, * 1740.
Maiſon de Campagne de Mr. le Comte de Bentinck, ſituée à un quart de lieuë de la Haye, j'y ai trouvé des Polypes. Aiant remarqué divers petits Animaux ſur des Plantes que j'avois tirées d'un foſſé, je mis quelques unes de ces Plantes dans un grand verre plein d'eau, que je plaçai ſur la tablette intérieure d'une fenêtre; & je m'occupai enſuite à conſidérer les Inſectes qui y étoient renfermés. J'y en apperçus bientôt un grand nombre, fort communs à la vérité, mais dont la plupart m'étoient inconnus. Un ſpectacle auſſi nouveau que celui que m'offrirent ces petits Animaux, excita ma curioſité. En parcourant des yeux ce verre ſi peuplé d'Inſectes, je remarquai un Polype qui étoit fixé ſur la tige d'une Plante aquatique. Je n'y fis pas d'abord beaucoup d'attention: je ſuivois de petits Inſectes dont la vivacité étoit plus propre à attirer mon attention qu'un objet immobile, & qui, lorſqu'on ne le regardoit qu'en paſſant, ne pouvoit guéres qu'être pris pour une Plante, ſurtout par quelqu'un qui n'avoit aucune idée d'Animaux dont la figure approchât de celle de ces Polypes d'Eau douce, tels que ſont les Polypes de Mer.

J'AI dit que le Polype que j'avois remarqué étoit im-

immobile. Ce n'eſt pas qu'il ne put ſe mouvoir, mais je n'en ſavois rien alors.

AVANT que d'aller plus avant, je dois, pour pouvoir me faire entendre, décrire ici en général la figure de ces Animaux. Leur corps *a b* * eſt aſſez délié. D'une de ſes extrémités *a*, ſortent des cornes *a c*, qui ſervent de pieds & de bras, & qui ſont encore plus déliées que le corps. J'appelle l'extrémité *a* antérieure, parceque c'eſt là qu'eſt la tête du Polype, & je donne le nom de poſtérieure à l'extrémité oppoſée *b*. Lorſque je parlerai des parties formées par la coupe transverſale d'un Polype, j'appellerai premiére partie, celle où ſera la tête, ſeconde partie la ſuivante, & ainſi de ſuite.

* PL. I. Fig. I.

JE n'ai pas d'abord trouvé les trois eſpéces de Polypes à bras en forme de cornes dont je ferai mention dans cet Ouvrage. C'eſt la plus petite que j'ai connuë la premiére *. Les Polypes de cette eſpéce ſont d'un aſſez beau verd. C'eſt d'eux qu'il s'agit à préſent. Il y en avoit pluſieurs dans le grand verre dont j'ai parlé, & dans un autre où je mis auſſi des Plantes aquatiques.

* Fig. I.

LES premiéres fois que je conſiderai ces petits corps, je les pris pour des Plantes paraſites, qui croiſſoient ſur les autres Plantes. Ils étoient dans l'attitude de ceux qui ſont repréſentés dans la Fig. 1. de la premiére Planche.

CE fut la figure de ces Polypes, leur couleur verte, & leur immobilité, qui me firent naitre cette idée de Plante. C'eſt auſſi la premiére qu'ils ont réveillée dans

dans l'eſprit de pluſieurs perſonnes, qui les ont vus pour la premiére fois dans leur attitude la plus commune. Quelques uns, en les voiant, ont dit que c'étoit des brins d'herbes: D'autres les ont comparés à cette aigrette qui garnit la graine de la Dent de lion.

Le mouvement des bras des Polypes eſt le premier que j'aie remarqué. Ils les courboient & les contournoient lentement en différens ſens. Dans l'idée que j'avois que les Polypes étoient des Plantes, je ne pouvois guéres penſer que ce mouvement, que j'obſervois dans ces fils déliés qu'ils avoient à une de leurs extrémités, leur fût propre; & cependant il paroiſſoit tel, & nullement l'effet de l'agitation de l'eau. Je ſoupçonnai pourtant, que celui que faiſoient, en nageant, les petits Inſectes qui étoient dans le même verre, agitoit aſſez l'eau, pour qu'elle pût communiquer un mouvement ſenſible aux bras des Polypes: mais, plus je conſiderai dans la ſuite le mouvement de ces bras, plus il me parut devoir venir d'une cauſe intérieure, & non d'une impulſion étrangère aux Polypes.

Je remuai un jour tant ſoit peu le verre dans lequel ils étoient, pour voir quel effet le mouvement que l'eau recevroit par là, produiroit ſur leurs bras. Je ne m'attendois nullement à celui qu'il produiſit. Au lieu de voir, comme je m'y attendois, les bras & le corps même des Polypes ſimplement agités dans l'eau, & entrainés par ſon mouvement, je les vis ſe contracter ſubitement, & ſi fort, que le corps des Polypes ne parut qu'un grain de matiére verte, & que les bras diſparurent entiérement à mes yeux. J'en fus ſur-

pris, & cette ſurpriſe ne ſervit qu'à exciter ma curioſité, & à faire redoubler mon attention. Comme je parcourois ſans ceſſe de l'œuil, aidé d'une loupe, pluſieurs des Polypes que j'avois fait contracter, j'en vis bientôt qui commençoient à s'étendre: leurs bras redevinrent ſenſibles; & peu à peu ces Polypes reprirent leur premiére forme.

CETTE contraction des Polypes, & tous les mouvemens que je leur voiois faire lorſqu'ils s'étendoient de nouveau, réveillérent vivement dans mon eſprit l'idée d'un Animal. Je les comparai d'abord aux Limaçons, & à d'autres Inſectes qui ſe contractent & s'étendent.

ON s'étonnera peut-être, de ce que je ne décidai pas abſolument que les Polypes étoient des Animaux. J'avouë que leur figure & leur couleur firent encore quelqu'impreſſion ſur moi. Je penſai qu'il n'étoit pas impoſſible qu'ils ne fuſſent des Plantes ſenſitives; & je ne trouvai rien de plus extraordinaire dans leur contraction & dans leur extenſion, que dans les mouvemens qui ſe font remarquer lorſqu'on touche la Plante à laquelle ce nom a été donné. Cette idée me retint donc dans quelque doute, & je ne voulus rien décider, juſqu'à ce que de nouvelles Obſervations m'y déterminaſſent.

JE trouvai, au bout de quelques jours, pluſieurs Polypes fixés contre les côtés du verre, à un endroit où je n'en avois encore point vus, & où certainement il n'y en avoit point eu d'abord. Je m'apperçus bientôt comment ils y étoient venus. Pluſieurs marchérent ſur les parois du verre pendant que je les obſervois.

vois. Je décrirai ailleurs leur maniére de marcher, & me contenterai de dire ici, qu'ils marchent à peu près comme les Chenilles appellées arpenteuſes; & comme divers Inſectes aquatiques, qui fixent ſucceſſivement leur bout antérieur & leur bout poſtérieur; le poſtérieur après l'avoir approché de l'antérieur, & l'antérieur après l'avoir éloigné du poſtérieur.

LA vue de ce mouvement progreſſif des Polypes acheva de me perſuader qu'ils étoient des Animaux; & lorſque j'en fus convaincu, je ceſſai de les obſerver. J'avois trouvé ce que je cherchois; car juſqu'alors je ne m'étois propoſé autre choſe, que de ſavoir ſi c'étoient des Animaux. Preſque tout le mois de Septembre 1740. ſe paſſa, ſans que je leur donnaſſe la moindre attention. J'étois alors occupé par d'autres Inſectes que j'obſervois depuis longtems. Mais vers la fin de ce mois de Septembre, les Polypes attirérent de nouveau mon attention, & ſi fort, que depuis je n'ai ceſſé de les obſerver.

ON doit ſe rappeller que mon verre étoit placé ſur la tablette intérieure d'une fenêtre. Je remarquai un jour, qu'un grand nombre de Polypes étoit raſſemblé ſur le côté du verre tourné vers le jour. Je fus d'abord curieux de ſavoir, ſi ce Fait n'étoit qu'accidentel, ou bien s'il réſultoit d'un penchant marqué que les Polypes euſſent pour l'endroit du verre le plus éclairé. Pour m'en aſſurer, je fis faire un demi tour au verre. Le grand nombre de Polypes ſe trouva alors ſur le côté le moins éclairé de ce verre, & le côté qui étoit tourné vers le jour, n'en avoit que quelques uns. Il s'agiſſoit donc de voir, ſi le grand nombre

de Polypes paſſeroit du côté le moins éclairé, ſur le côté le plus éclairé. Le jour après avoir tourné le verre, je trouvai que le côté le moins éclairé, celui ſur lequel j'avois laiſſé beaucoup de Polypes, en étoit preſque entiérement dépeuplé. Ils étoient diſperſés dans le verre, & en chemin pour ſe rendre ſur le côté du verre le plus éclairé; car le lendemain j'y en trouvai déja pluſieurs, & au bout de quelques jours, il y en eut autant qu'il y en avoit ſur l'autre, avant que j'euſſe fait faire un demi tour au verre. Je le tournai encore, & je réïterai par là la même Expérience, qui eut le même ſuccès. Après avoir vu la même choſe pluſieurs fois, je fus convaincu que les Polypes avoient un penchant particulier pour l'endroit du verre le plus éclairé. Je n'oſai pas décider ſi ce penchant ſe rapportoit directement à la lumiére, ou ſi quelqu'autre circonſtance les attiroit ſur le côté qui en étoit le plus éclairé. Je rapporterai dans la ſuite plus au long les Obſervations que j'ai faites ſur ce ſujet, qui me parut alors digne d'attention: & ce fut dès ce moment que je réſolus, non ſeulement de chercher des éclairciſſemens ſur cet article, mais même de tâcher d'approfondir en général l'Hiſtoire des Polypes.

Je ne tardai pas à appercevoir, que tous les individus de l'eſpéce de Polypes que j'obſervois, n'avoient pas un nombre égal de bras ou de pieds; & j'eus lieu de croire qu'il n'y avoit rien là que de naturel. Quoique je ne trouvaſſe aucune difficulté à admettre cette différence entre les individus d'une même eſpéce d'Animaux, je comparai cependant d'abord ces bras de Po-

Polypes aux branches & aux racines des Plantes, dont le nombre varie beaucoup entre les individus de la même eſpéce. Je penſai de nouveau à cette occaſion, que peut-être ces Corps organiſés que j'obſervois étoient des Plantes, & j'eus le bonheur de ne pas rejetter cette idée. Je dis que j'eus le bonheur de ne pas rejetter cette idée, parceque, quoiqu'elle fût la moins naturelle, elle me fit penſer à couper des Polypes. Je jugeai que, ſi les deux parties d'un même Polype vivoient après avoir été ſéparées, & devenoient chacune un Polype parfait, il ſeroit évident que ces corps organiſés étoient des Plantes. Comme cependant j'étois beaucoup plus porté à croire que c'étoient des Animaux, je ne comptois pas beaucoup ſur cette Expérience ; je m'attendois à voir mourir ces Polypes coupés.

Ce fut le 25 Novembre 1740. que je coupai le premier. J'en mis les deux parties dans un verre plat, qui ne contenoit de l'eau qu'à la hauteur de quatre à cinq lignes. De cette maniére il m'étoit facile d'obſerver ces portions de Polype avec une loupe aſſez forte.

J'indiquerai ailleurs les précautions que j'ai emploiées en faiſant mes Expériences ſur ces Polypes coupés, & la maniére dont je m'y ſuis pris pour les couper. Il ſuffira de dire ici, que je coupai transverſalement le Polype dont il s'agit, & un peu plus près du bout antérieur que du poſtérieur. La premiére partie étoit donc un peu plus courte que la ſeconde.

Dans l'inſtant que je coupai le Polype, ces deux parties ſe contractérent, enſorte qu'elles ne parurent d'abord au fond du verre dans lequel je les mis, que

comme deux petits grains de matiére verte. C'eſt, comme je l'ai déja dit, la couleur des Polypes que j'ai partagés les premiers. Ces deux parties s'étendirent le jour même que je les ſéparai. Elles étoient très faciles à diſtinguer l'une de l'autre. La premiére avoit ſon bout antérieur garni de ces fils déliés qui ſervent de pieds & de bras aux Polypes, & la ſeconde n'en avoit point.

L'EXTENSION de la premiére partie ne fut pas le ſeul ſigne de vie qu'elle donna le jour même qu'elle fut ſéparée de l'autre. Je lui vis remuer ſes bras, & le lendemain je trouvai, la premiére fois que je la vins obſerver, qu'elle avoit changé de place; & peu après je lui vis faire un pas. La ſeconde partie étoit étenduë comme le jour précédent, & à la même place. Je ſecouai un peu le verre, pour voir ſi elle étoit encore en vie. Ce mouvement la fit contracter; d'où je jugeai qu'elle vivoit. Peu de tems après elle s'étendit de nouveau. Je vis les jours ſuivans la même choſe.

JE ne regardai cependant le mouvement de ces deux moitiés du même Polype, que comme des ſignes d'un foible reſte de vie. C'eſt ce que je penſois ſurtout par rapport à la derniére partie: car pour l'autre, j'étois porté à croire, en ſuppoſant le Polype un Animal, que ſa tête étoit au bout antérieur, comme cela eſt en effet. Il me paroiſſoit aſſez naturel, que la moitié qui avoit la tête & une partie du corps pût encore vivre. Je penſai que l'opération que j'avois faite, n'étoit à ſon égard qu'une mutilation, qui n'avoit pas dérangé eſſentiellement en elle l'œconomie animale. Je comparai cette premiére partie à un

un Lézard qui a perdu ſa queuë, & qui n'en meurt pas. Au contraire, la ſeconde moitié, dans la ſuppoſition que le Polype étoit un Animal, ne me ſembloit être qu'une eſpéce de queuë, qui ne contenoit pas les viſcéres dont l'Animal a beſoin pour vivre. Je ne penſois pas qu'elle pût vivre longtems ſéparée du reſte du corps. Qui ſe ſeroit figuré qu'il lui fût revenu une tête! J'obſervois donc cette ſeconde moitié, pour ſavoir combien de tems elle conſerveroit ces reſtes de vie, & nullement dans l'eſpérance d'être ſpectateur de cette merveilleuſe reproduction.

J'OBSERVOIS à la loupe, pluſieurs fois chaque jour, ces portions de Polype. Le quatriéme Décembre, c'eſt à dire, le neuviéme jour après avoir coupé le Polype, il me ſembla le matin appercevoir ſur les bords du bout antérieur de la ſeconde partie, de celle qui n'avoit ni tête ni bras; il me ſembla, dis-je, appercevoir trois petites pointes qui ſortoient de ces bords. Elles me firent ſur le champ penſer aux cornes qui ſervent de pieds & de bras aux Polypes. Ces pointes étoient préciſément où auroient dû être les bras, ſi cette ſeconde partie avoit été un Polype complet. Je ne voulus pas cependant déja décider, que c'en fût en effet qui commençaſſent à pouſſer. Pendant toute la journée j'apperçus toûjours ces pointes: Cela m'animoit extrémement, & j'attendois avec impatience le moment où je ſaurois clairement ce qu'elles étoient. Enfin le lendemain elles ſe trouverent aſſez grandes, pour qu'il n'y eût plus lieu de douter qu'elles ne fuſſent véritablement des bras qui croiſſoient à l'extrémité antérieure de cette ſeconde

de partie. Le jour ſuivant deux nouveaux bras commencérent à ſortir ; & quelques jours après il en vint encore trois. Cette ſeconde partie en eut alors huit, qui furent tous en peu de tems auſſi longs que ceux de la premiére partie, c'eſt à dire, que ceux qu'avoit le Polype avant qu'il fût coupé.

Je ne trouvai plus alors de différence entre cette ſeconde moitié, & un Polype qui n'avoit jamais été coupé. C'eſt ce que j'avois remarqué, à l'égard de la premiére, dès le lendemain de l'opération. Toutes deux paroiſſoient ſenſiblement, lorſque je les obſervois à la loupe avec toute l'attention dont j'étois capable, elles paroiſſoient, dis-je, ſenſiblement être chacune un Polype complet, & elles en faiſoient toutes les fonctions qui m'étoient connues : Elles s'étendoient, ſe contractoient, & marchoient.

Mon Expérience eut donc beaucoup plus de ſuccès que je n'en attendois. Mais, ſuivant l'intention de cette Expérience, j'aurois dû conclure poſitivement, que les Polypes étoient des Plantes, & des Plantes qui venoient de *bouture*. Cependant je fus fort éloigné d'oſer le décider. Plus j'avois obſervé des Polypes entiers, & même ces deux parties dans leſquelles s'étoit faite la reproduction dont je viens de parler, plus leur mouvement avoit réveillé dans mon eſprit l'idée d'un Animal. Ce mouvement paroiſſoit réſulter d'une ſpontanéité, qui a toûjours été cenſée étrangère aux Plantes, & que nous connoiſſons dans les Animaux par une infinité d'exemples. Tout ce que j'avois fait pour me tirer du doute, n'avoit ſervi qu'à m'y jetter davantage. Je reſolus donc de re-

redoubler mon attention, & de tâcher de découvrir dans les Polypes quelque propriété plus caractériſtique.

Tous ceux qui ſe ſont appliqués à comparer les Plantes & les Animaux, & qui ont pu juger des grands rapports qui ſe trouvent entre ces deux claſſes de corps organiſés, ont ſenti la difficulté qu'il y a à marquer préciſément les Caractères propres qui les diſtinguent l'une de l'autre. Les reflexions que j'entendois faire, & que je faiſois ſur cette matiére, ne ſervoient pas peu à me confirmer dans le doute où j'étois à l'égard des Polypes, & à m'engager à chercher en eux de nouvelles propriétés propres à m'en tirer. Une autre choſe, que j'avois appriſe depuis peu, y contribua auſſi beaucoup. C'eſt la découverte faite ſur les Pucerons.

Mr. de Reaumur a ſoupçonné, il y a longtems, que ces petits Animaux pouvoient multiplier ſans s'être accouplés depuis leur naiſſance. Mr. Bonnet entreprit, dans le mois de Mai de l'année 1740., de s'aſſurer de ce Fait. On a vu dans le treiziéme Mémoire du ſixiéme Tome de l'Hiſtoire des Inſectes de Mr. de Reaumur, le ſuccès que l'attention & la ſagacité de Mr. Bonnet ont eu. Il a trouvé, & prouvé par des Expériences faites avec toutes les précautions requiſes, qu'un jeune Puceron multiplioit, quoique tenu, depuis le premier inſtant de ſa naiſſance, dans une parfaite ſolitude. Mr. Lyonet aiant entrepris, dans le mois de Juillet de la même année 1740, de faire ſur les Pucerons la même Expérience que Mr. Bonnet, eut le même ſuccès que lui. J'appris le ſuccès

de celle de Mr. Bonnet par une de ſes lettres, & Mr. Lyonet me montra, dans ſon Cabinet, ſes Pucerons ſolitaires qui multiplioient. J'eus le plaiſir de voir que ces deux Meſſieurs, qui avoient, à l'inſçu l'un de l'autre, à peu près dans le même tems, fait la même Expérience, mais ſur des Pucerons d'eſpéce différente, étoient tous deux parvenus à découvrir un Fait d'Hiſtoire Naturelle des plus remarquables, & qui étoit directement contraire à la régle générale admiſe juſqu'alors ſur la génération des Animaux. Je fus curieux d'imiter l'Expérience de ces Meſſieurs; & dans le tems que mes premiers Polypes coupés me faiſoient voir la reproduction ſinguliére dont j'ai parlé, j'avois auſſi des Pucerons, mis en ſolitude dès le moment de leur naiſſance, qui multiplioient. Un Fait tel que celui que préſentoient ces Pucerons, ne pouvoit que m'inſpirer beaucoup de défiance pour les régles générales. C'eſt donc ce qui augmenta la défiance que j'avois en particulier pour celles qui rangeoient les deux propriétés que j'avois trouvées aux Polypes, ſous deux claſſes différentes de corps organiſés, ſous celle des Animaux & ſous celle des Plantes. Je ſentois vivement, que la Nature étoit trop vaſte, & trop peu connuë, pour qu'on pût décider ſans témerité, que telle ou telle propriété ne ſe trouvoit pas dans telle ou telle claſſe de corps organiſés. Je me tins dans la reſerve, & je me contentai de travailler à pouſſer mes recherches ſur les Polypes, ſans oſer décider encore s'ils étoient des Animaux ou des Plantes.

J'IGNOROIS alors la maniére dont les Polypes ſe mul-

multiplient, & je penſai que peut-être elle pourroit me fournir le Caractère diſtinctif que je cherchois, celui qui me mettroit en état de juger s'ils étoient des Animaux ou des Plantes. J'avois un grand verre fort peuplé de Polypes verds, & je paſſois ſouvent des heures entiéres à les conſiderer les uns après les autres. Enfin j'en découvris un qui commençoit à produire un petit. Les Obſervations que je fis ſur ce Polype, me mirent, au bout de quelques jours, aſſez en état de juger de la maniére dont ces corps organiſés multiplient, pour reconnoitre qu'elle a un très grand rapport avec celle dont les Plantes multiplient par *rejettons*. C'étoit un nouveau Caractère de Plante qu'ils venoient de me faire voir. Il me reſtoit cependant beaucoup de penchant à les croire des Animaux; ou plutôt, ils me paroiſſoient être des Animaux-Plantes: il me ſembloit qu'ils tenoient une eſpéce de milieu entre ces deux claſſes de corps organiſés.

Le nouveau Caractère que je venois de découvrir dans les Polypes, me laiſſa donc dans le doute où j'étois depuis longtems. Quelqu'impatient que je fuſſe de ſavoir préciſément dans quelle claſſe de corps organiſés ils devoient être rangés, je goutois cependant quelque plaiſir dans ce doute. Il m'avoit déja conduit à la connoiſſance de deux propriétés des Polypes très ſinguliéres, & il m'animoit à en chercher d'autres, en piquant de plus en plus ma curioſité.

Je venois, en ce tems-là, d'envoyer des Polypes à Mr. de Reaumur pour la ſeconde fois, ceux que je lui avois envoiés la premiére étant morts. Ce grand Obſervateur me manda la nouvelle de leur heureuſe

arrivée à Paris, que j'attendois avec impatience, & il accompagna cette nouvelle, d'une déciſion qui ſuffiſoit ſeule pour me tirer de doute. Après avoir examiné les Polypes, il n'héſita pas à les ranger dans la claſſe des Animaux, & il leur donna le nom qu'ils portent à préſent, à cauſe de leur reſſemblance avec les Polypes de mer.

Ce fut dans le mois de Mars 1741 que Mr. de Reaumur fixa mon doute; & au mois d'Avril ſuivant, je découvris aux Polypes une propriété, qui auroit fait ſur moi le même effet, ſi cela avoit été néceſſaire.

Je trouvai dans ce tems-là une nouvelle eſpéce de Polypes *, du genre de ceux que j'obſervois depuis longtems. Peu de jours après que j'eus trouvé ces nouveaux Polypes, je les vis manger, je leur vis avaler des Vers autant & même plus longs qu'eux, je vis qu'ils les digeroient, & qu'ils s'en nourriſſoient. Cela étoit certainement bien propre à perſuader qu'ils étoient des Animaux.

* Pl. I. Fig. 2.

Après avoir donné l'Hiſtoire de la découverte de la premiére ſingularité que j'ai trouvée dans les Polypes, je vai rapporter, dans l'ordre qui m'a paru le plus naturel, les Obſervations que j'ai faites ſur ces Animaux, depuis plus de trois années que je les étudie.

J'AI dit ci-deſſus, que les premiers Polypes que j'ai vus, étoient fixés ſur des Plantes aquatiques que j'avois tirées d'un foſſé, & miſes dans un grand verre plein d'eau. Il y avoit de la Lentille, une tige d'une ſorte de Prêle, & une Plante de Nénufar. C'étoit prin-

principalement ſur ces Plantes que je cherchois des Polypes au commencement. Mais j'appris dans la ſuite, qu'ils ſe placent indifféremment ſur tous les corps qui ſont dans l'eau. J'en ai trouvé ſur toutes les Plantes aquatiques, ſur le fond des foſſés, & ſuſpendus à la ſuperficie de l'eau ; j'en ai vu ſur des branches d'arbres, des planches, des feuilles pourries, des brins de paille, & des pierres: enfin, j'en ai même vu pluſieurs ſur le corps de divers Animaux, par exemple, ſur la coquille des Limaçons, & ſur le foureau des Teignes aquatiques.

Il faut avoir l'œuil bien exercé à découvrir des Polypes, & ſavoir choiſir une place & une ſituation bien convenables, pour les diſtinguer ſur les différens corps dont je viens de faire mention, lorſqu'ils ſont encore dans les foſſés. La maniére la plus commode eſt, de tirer de l'eau ces différens corps, & de les mettre dans des verres pleins d'eau. On voit alors facilement les Polypes qui y ſont attachés.

Il eſt très utile, pour apprendre à connoitre un Animal, de l'obſerver dans ſes circonſtances naturelles, je veux dire, au milieu de tout ce qui l'environne dans les endroits dans leſquels on le trouve. C'eſt pourquoi il eſt bon de faire enſorte que le vaſe, dans lequel on tient cet Animal, ſoit pour lui un ſéjour à peu près ſemblable à l'endroit où il a été pris. Cet expédient peut hâter conſidérablement les découvertes qu'on ſe propoſe de faire, & il peut même en occaſionner qu'on n'auroit pas faites ſans cela.

J'ai non ſeulement eu recours à cet expédient, pour approfondir l'Hiſtoire des Polypes, mais j'ai

même eu ſoin de me rendre ſouvent en Eté au bord du foſſé dans lequel je les ai trouvés, à l'heure que le Soleil donnoit ſur le fond de l'eau; je choiſiſſois des endroits où l'eau fût claire, & où le bord eût une pente douce. Je voiois diſtinctement les Polypes au fond de l'eau, & ſur tous les corps qui étoient dans l'eau & à ſa ſuperficie. J'ai par ce moien acquis des idées, que je n'aurois jamais euës ſans cette précaution.

L'ATTITUDE la plus commune dans laquelle on trouve les Polypes, ſoit dans leur ſéjour ordinaire, ſoit dans les vaſes où on les tient, eſt celle qui eſt repréſentée dans les Figures 1. & 2. de la Pl. I. L'extrémité poſtérieure *b*, du corps du Polype *a b*, eſt fixée
* PL. I. Fig. 1. † Fig. 2. contre une Plante *e f* *, ou contre le brin de bois *g h* †, le corps *a b* & les bras *a c* ſont étendus dans l'eau.

LA figure qu'a le plus ordinairement le corps des Polypes dans cette attitude, n'eſt pas parfaitement la même pour les trois eſpéces que je connois. Le
* Fig. 1. corps des Polypes verds *, dont j'ai ſurtout parlé juſqu'à préſent, va un peu en diminuant du bout antérieur au bout poſtérieur. La diminution eſt presqu'inſenſible. Il en eſt de même de ceux de l'eſpéce repréſentée dans la Figure 2. Mais ceux de la troiſié-
* Fig. 3. me eſpéce * diffèrent des deux précédentes à cet égard. Leur corps ne va en diminuant inſenſiblement,
* *a*. † *d*. que de l'extrémité antérieure *, juſqu'à la moitié †, &
* Fig. 4. *d*. quelquefois juſqu'aux deux tiers * de la longueur du corps. Il devient à cet endroit beaucoup plus délié, & de ce point, juſqu'à l'extrémité poſtérieure, il
* Fig. 3. & 4. ne diminuë plus. Cette partie *d b* *, plus mince que le

le reſte du corps, a l'air d'une queuë, & peut ſervir de Caractère diſtinctif à cette eſpéce.

Les pieds ou bras des Polypes, ſont, comme je l'ai déja dit, à leur extrémité antérieure. Chaque bras ſe meut en tout ſens; ce qui fait qu'il peut ſe mettre dans la même direction que le corps des Polypes, ou former avec lui toute ſorte d'angles. Au reſte, le mouvement de chaque bras eſt indépendant de celui des autres. Lorſque tous les bras ſont avec le corps un même angle, & qu'en s'éloignant du point de leur origine, ils conſervent la même direction, ils forment une figure fort réguliére. Cette figure varie, ſuivant que varie l'angle que ſont les bras avec le corps du Polype. Ceux des Polypes verds ſont ſouvent avec leur corps un angle droit, ou à peu près *. Alors ces bras, partant à égale diſtance du bout antérieur, comme d'un centre commun, & conſervant chacun ſa direction, paroiſſent être tous les raions d'un même cercle *. Mais quand les bras viennent à ſe rapprocher en avant, à faire un angle obtus avec le corps *, ils forment alors une figure d'entonnoir plus ou moins ouvert.

* PL. I. Fig. 1. *i.* & *k.*

* *i.*

* Fig. 1. *e.*

Ce ne ſont guéres que les Polypes verds * qui font voir un port ſi régulier dans leurs bras. Comme ils les ont courts, ils peuvent plus facilement les tenir en ligne droite. Ceux des deux autres eſpéces que je connois *, qui ont les bras beaucoup plus longs, ne leur donnent, lorſqu'ils ſont étendus, une direction en ligne droite, que depuis leur origine juſqu'à une certaine diſtance. Le reſte des bras a une au-

* Fig. 1.

* Fig. 2. & 3.

autre direction, quelquefois uniforme dans tous, & ſouvent très variée.

J'AI déja dit que tous les individus de l'eſpéce des Polypes verds n'ont pas un nombre égal de bras. Il en eſt de même des autres eſpéces que j'ai obſervées après ceux là. Dans les trois eſpéces de Polypes que je connois, le plus petit nombre de bras eſt communément de ſix, & le plus grand de douze ou treize. Cependant j'en ai vu quelques uns de la ſeconde eſpéce qui en avoient dix-huit *.

* PL. X. Fig. 3.

IL ſe préſente ici une queſtion qui m'eſt d'abord venuë dans l'eſprit lorſque je faiſois ces Obſervations. Eſt-ce naturellement que les individus de chaque eſpéce de Polypes n'ont pas un nombre de bras égal; ou bien cela vient-il de ce que ceux qui en ont le moins, ont perdu par accident quelques uns de leurs bras?

J'AI déja répondu en paſſant à cette queſtion, j'ai rapporté ci-deſſus, que lors même que je ne connoiſſois encore que peu les Polypes, il m'avoit paru qu'il leur étoit naturel de n'avoir pas tous un nombre égal de ces cornes, qui, depuis qu'elles ont été mieux connuës, ont reçu le nom de pieds & de bras. Après avoir obſervé pendant quelque tems des Polypes, & ſurtout après en avoir vu naître & croître, je m'apperçus qu'il n'en étoit pas de leurs bras, comme des parties analogues de tant d'autres Animaux que nous connoiſſons. Les bras & les pieds de ces derniers paroiſſent tous enſemble, dès le moment qu'ils commencent à ſe développer. Les bras des Polypes, au con-

contraire, ne pouſſent que ſucceſſivement. Il leur en vient même de nouveaux longtems après leur naiſſance. Ce Fait nous découvre d'une maniére bien ſenſible, une raiſon de l'inégalité du nombre des bras qui ſe trouve entre différens individus de la même eſpéce de Polypes. Je ne m'en ſuis pas tenu là. Il ſe pouvoit que, quoique les bras des Polypes ne pouſſaſſent pas tous en même tems, ils parvinſſent enfin tous au même nombre, qui fût le nombre naturel de leurs bras. Mais mes Obſervations m'ont appris préciſément le contraire. Je n'ai trouvé aucune règle dans l'accroiſſement du nombre des bras des Polypes, & je ne les ai point vus parvenir au même nombre.

J'EN reviens à préſent au corps des Polypes, qui eſt repréſenté étendu dans les Figures 1. 2. 3. & 4. de la Planche I. Il eſt, comme celui de pluſieurs Animaux très connus, ſuſceptible de différens degrés d'extenſion & de contraction. Le corps d'un Polype peut ſe contracter au point qu'il n'ait qu'une ligne de longueur, ou environ *. Par exemple, le Polype repréſenté dans la Figure 3. de la Planche I., peut, en ſe contractant, devenir comme celui de la Figure 6. La grandeur d'un Polype contracté varie ſuivant l'eſpéce, & ſuivant la taille de chaque Polype en particulier. Son corps, ſoit en ſe contractant, ſoit en s'étendant, peut s'arrêter à tous les degrés imaginables, depuis la plus grande extenſion, juſqu'à la plus grande contraction. Un Polype peut, par conſéquent, varier extrêmement la longueur de ſon corps. S'il étoit néceſſaire qu'il l'étendit autant qu'il eſt poſſible, ou bien juſqu'à un cer-

* PL. I. Fig. 5. & 6.

tain degré, pour faire tel ou tel mouvement, comme, en effet, cela ſe voit dans d'autres Animaux, on pourroit, en déſignant la longueur qu'il a dans cette circonſtance, marquer une longueur préciſe: mais, pourvu que le corps d'un Polype ne ſoit pas fort contracté, il peut, en quelque degré d'extenſion qu'il ſoit, exécuter les différens mouvemens & les différentes manœuvres dont il eſt capable. On ne peut donc déſigner qu'à peu près la longueur du corps des Polypes, & d'autant plus, que celle des différens individus de chaque eſpéce eſt ſujette encore à cette variété qui réſulte du plus ou du moins d'accroiſſement, que l'on connoit par expérience, & dans les Animaux, & dans les Plantes.

La plupart des Polypes verds que j'ai vus, avoient, lorſqu'ils étoient étendus, entre cinq ou ſix lignes de longueur. Celle de ceux de la ſeconde & de la troiſiéme eſpéce eſt ordinairement entre huit & douze lignes; mais j'en ai vu quelquefois de ces deux eſpéces dont le corps avoit un pouce & demi *.

* PL. X. Fig. 3.

Il n'eſt pas beſoin d'avertir, que le corps des Polypes devient plus mince, à meſure qu'il s'étend, & qu'il l'eſt moins, à meſure qu'il eſt plus contracté. Les Figures 1. 2. 3. de la Pl. I. repréſentent l'épaiſſeur la plus ordinaire des Polypes des trois eſpéces dont j'ai parlé, lorſqu'ils ſont dans un degré d'extenſion ordinaire. Je parle de ceux qui ſont déja parvenus à une bonne taille.

Comme entre les Animaux qui peuvent allonger & accourcir leur corps, il y en a beaucoup qui ont des anneaux, il étoit naturel de chercher d'abord ſi les

les Polypes en avoient. Je l'ai fait; mais, ni la loupe, ni le microſcope, n'ont pu m'en faire voir, dans quelqu'état que je les aie obſervés, étendus ou contractés. Il m'a paru que leur maniére de s'étendre & de ſe contracter a plus de rapport à celle des Limaçons & des Limaces, qu'à celle des Vers & des autres Inſectes qui ont des anneaux ſenſibles. La Figure 1. de la Pl. V. repréſente parfaitement un Polype groſſi au microſcope. L'Obſervateur qui l'a deſſiné n'auroit pas manqué de repréſenter des anneaux, s'il en avoit découvert; & ils ne ſauroient lui avoir échapé.

Je ne m'arrêterai point à expliquer, par quel méchaniſme le corps des Polypes s'étend & ſe contracte. Je riſquerois de ne donner que des conjectures.

On oblige les Polypes à ſe contracter plus ou moins, à proportion qu'on les touche, ou qu'on agite l'eau dans laquelle ils ſont, plus ou moins rudement. Tout Polype qu'on tire de l'eau, en ſort contracté. On le trouve ramaſſé en un petit volume, contre les corps ſur leſquels il eſt attaché *. Il a alors une figure ſi différente de celle qu'il a étant étendu, qu'on ne ſauroit le reconnoitre d'abord. Mais dès que l'œuil y eſt une fois accoutumé, il eſt facile de diſtinguer de tout autre corps un Polype qui eſt hors de l'eau. Cela eſt très commode, parceque, lorſqu'on cherche des Polypes, il n'eſt plus néceſſaire de mettre dans l'eau tous les corps ſur leſquels ils ſont, pour leur faire prendre une figure plus reconnoiſſable.

* PL. I. Fig. 7.

Le chaud & le froid ſont ſur les Polypes le même effet qu'ils produiſent ſur la plupart des Inſectes terreſtres & aquatiques. Le chaud les anime, & le froid les engourdit. Il faut cependant un degré de froid conſidérable pour réduire les Polypes à une parfaite inaction, il faut qu'il approche de fort près de celui de la congélation. Alors les Polypes ſont contractés plus ou moins, & reſtent tels. Mais à meſure que l'eau, dans laquelle ils ſont, acquiert quelques degrés de chaleur, ils s'étendent, & ils font tous les mouvemens dont ils ſont ſuſceptibles, proportionnellement à ce degré de chaleur. Il n'eſt pas néceſſaire que ce degré ſoit fort conſidérable pour que les Polypes s'étendent beaucoup ; il ſuffit que l'eau ſoit à peu près dans un degré tempéré, c'eſt-à-dire, qu'elle faſſe monter le Thermomètre de Farenheidt au quarante huitiéme degré. En Eté ils s'étendent encore davantage, & plus fréquemment : mais l'effet de quelques degrés de chaleur de plus ou de moins n'eſt pas aſſez ſenſible pour pouvoir être marqué avec préciſion.

Il en eſt de l'extenſion & de la contraction des bras des Polypes, comme de l'extenſion & de la contraction de leur corps. Ce qu'on peut dire de la longueur de ces bras, eſt équivoque juſqu'à un certain point, à cauſe de la faculté qu'ils ont auſſi, de s'arrêter à tous les degrés qui ſont entre la plus grande extenſion & la plus grande contraction. Mais, malgré cela, il eſt facile de juger, que les bras des Polypes de telle eſpéce, ſont plus longs que ceux d'une autre, au moins par rapport aux trois eſpéces que je connois.

Les

LES Polypes verds ſont ceux qui ont les bras les plus courts *. J'en ai rarement vu dont la longueur ſurpaſſât la moitié de celle de leur corps, c'eſt-à-dire, dont la longueur fût plus de trois lignes. Les bras d'un pouce de longueur ſont très communs dans les Polypes de la ſeconde eſpéce *. J'en ai vu pluſieurs les étendre juſqu'à deux & même trois pouces. * PL. I. Fig. 1. * Fig. 2.

J'AI dit ci-deſſus, que les Polypes de la troiſiéme eſpéce étoient faciles à diſtinguer par leur queuë *; mais la longueur de leurs bras fournit encore un Caractère très remarquable, & très propre à les diſtinguer des autres eſpéces. C'eſt ce qui fait que je les appellerai ſouvent *Polypes à longs bras.* * Fig. 3. *b. d.*

JE donne aux eſpéces de Polypes dont je parle, les noms de premiére, ſeconde, & troiſiéme eſpéce, ſelon l'ordre du tems dans lequel je les ai trouvées. J'ai découvert la premiére eſpéce, ou celle des Polypes verds *, au mois de Juin 1740., la ſeconde † au mois d'Avril 1741., & la troiſiéme, ou celle des Polypes à longs bras *, au mois de Juillet de la même année. * Fig. 1. † Fig. 2. * Fig. 3.

LORSQUE je tirai ces derniers de l'eau, je les pris pour des Polypes de la ſeconde eſpéce. Je les mis en grande quantité à la hâte dans un verre plein d'eau, de ſept pouces de hauteur, & de cinq de diamètre, que je le plaçai ſur la tablette d'une fenêtre. Je n'eus occaſion de conſiderer ces Polypes avec attention, que le lendemain. Ce fut pour moi une grande ſurpriſe, de trouver le verre, dans lequel ils étoient, rempli de fils fort longs, & qui me parurent auſſi déliés que des fils d'Araignée. Je me mis d'abord à étudier ce que ces fils pouvoient être, ſans ſoupçonner ce qu'ils é-

toient en effet. Je vis bientôt avec étonnement, & avec un vrai plaiſir, que ces fils ſi longs & ſi déliés partoient du bout antérieur des Polypes, en un mot, que c'étoient des bras. Comme il y avoit beaucoup de Polypes dans le verre, il étoit très garni de ces bras, dont les uns étoient à peu près diſpoſés en ligne droite, & les autres ſerpentoient & faiſoient toute ſorte de tours & de détours. Ils vont en diminuant depuis leur origine juſqu'à leur extrêmité, comme ceux des autres eſpéces. Ceux ci ne ſont pas plus épais à leur origine, que ceux des Polypes de la ſeconde eſpéce, & lorſqu'ils ſont étendus, ils ſurpaſſent autant en fineſſe ces derniers vers leur extrémité, qu'ils les ſurpaſſent en longueur. J'ai vu des Polypes de la troiſiéme eſpéce, dont les bras avoient huit pouces & demi de longueur. On peut juger par la Figure 3. de la Pl. I., qui repréſente ces bras au naturel, de l'effet qu'ils font lorſqu'ils ſont bien étendus.

On comprend facilement que, pour voir ces bras s'étendre au point dont je viens de parler, il faut que les Polypes ſoient dans de grands verres. J'en ai mis dans un verre dans lequel ils pouvoient les étendre en droite ligne, juſqu'à la longueur de dix pouces, mais je ne les ai vus atteindre qu'à celle de huit pouces & demi *. Je ne veux pourtant pas décider qu'ils ne puiſſent s'étendre davantage. Je les ai comparés à des fils d'Araignée par rapport à leur fineſſe. S'ils ne ſont pas, près de leur extrêmité, auſſi déliés que ces fils, il s'en faut très peu. Il n'a pas été poſſible de les repréſenter auſſi fins qu'ils ſont, dans les Figures qui ſont jointes à cet Ouvrage, ni d'exprimer d'une

* PL. I. Fig. 3.

ne maniére fort ſenſible, dans celles qui repréſentent les Polypes dans leur grandeur naturelle, comment ces bras diminuent depuis leur origine juſqu'à leur extrémité. C'eſt ce qui ſe voit diſtinctement dans le Polype groſſi au microſcope *. J'aurai dans la ſuite occaſion de revenir à ces longs bras, qui m'ont fourni pluſieurs ſpectacles très amuſans & très curieux, & qui ont excité l'admiration de tous ceux qui les ont vus.

* PL. V. Fig. 1.

La premiére fois que je vis des Polypes verds ſe contracter, leurs bras diſparurent entiérement. Je crus d'abord qu'ils étoient rentrés dans le corps des Polypes, comme les cornes des Limaçons rentrent dans leur corps. Mais après avoir obſervé attentivement à la loupe le bout antérieur du Polype, j'apperçus ſes bras, & je vis qu'ils n'étoient point rentrés dans le corps, mais qu'ils étoient ſeulement fort contractés. Je les ai diſtingués enſuite à la vuë ſimple, quoiqu'ils ne fuſſent pas plus contractés que la premiére fois : mais mon œuil étoit alors accoutumé à les voir.

Les bras des Polypes de la ſeconde & de la troiſiéme eſpéce, ont, lorſqu'ils ſont fort contractés, entre une & deux lignes de longueur *.

* PL. I. Fig. 5. & 6.

Il arrive ordinairement, que le même mouvement, le même attouchement qui force le corps d'un Polype à ſe contracter, produit le même effet ſur les bras. Ils ſe contractent auſſi d'eux mêmes, pour exécuter toutes les manœuvres dont je parlerai dans la ſuite, à l'occaſion de leur mouvement progreſſif, & de la ma-

maniére dont ils ſaiſiſſent & retiennent leur proie, & dont ils la portent à la bouche.

Il n'y a pas toûjours une proportion réglée entre la contraction & l'extenſion du corps & des bras des Polypes. Quand on force le corps à ſe contracter, en le touchant un peu rudement, ce corps & les bras ſe contractent conſiderablement: mais dans d'autres circonſtances, le corps ſe contracte conſiderablement, ſans que la même choſe ait lieu à l'égard des bras, & réciproquement. Ils n'obſervent pas non plus une proportion réglée en s'étendant de nouveau.

Les bras du même Polype peuvent s'étendre & ſe contracter en tout ou en partie, indépendamment les uns des autres. Les uns ſont ſouvent fort longs, pendant que les autres ſont très courts *.

* PL. I. Fig. 4.

Les Polypes verds ſe contractent avec promptitude, lorſqu'ils y ſont forcés par quelque cauſe étrangère. Ceux des deux autres eſpéces ſe contractent moins vite. Mais les uns & les autres exécutent ce mouvement avec aſſez de lenteur, lorſqu'ils le font d'eux mêmes. Ils s'étendent toûjours lentement. Il y a cependant du plus & du moins. Ce que je viens de dire eſt relatif au corps & aux bras des Polypes.

J'en viens à préſent à une autre propriété qui ſe rencontre dans le corps & dans les bras des Polypes, & dont j'ai déja dit un mot en paſſant: je veux parler de leur inflexion. Le corps & les bras des Polypes ſont, en effet, ſuſceptibles d'inflexion par tout, en tout ſens, & dans tous les degrés poſſibles. La Figure 1. de la Pl. II. repréſente quelques unes de ces circon-

conſtances. On trouve des Polypes dans cette attitude. Le corps & les bras peuvent auſſi ſe contourner *. On remarque dans les bras des Polypes de la ſeconde & de la troiſiéme eſpéce, un endroit où ils ſe courbent ordinairement. C'eſt à quelques lignes de diſtance de leur origine. Chaque bras d'un même Polype eſt ſuſceptible de toute ſorte d'inflexions, indépendemment de celle des autres.

* PL. II. Fig. 2. & PL. I. Fig. 4.

Les Polypes de la troiſiéme eſpéce laiſſent ordinairement pendre leurs bras en bas, & leur font ſouvent faire différens tours & détours *. J'ai ſouvent vu ceux qui étoient au bas de grands verres, diriger une partie de leurs bras vers le haut, quelques fois perpendiculairement, & d'autres fois, comme cela eſt exprimé dans la Fig. 3. de la Pl. II. Cette Figure repréſente très exactement un Polype que j'ai vu dans un de mes grands verres.

* PL. I. Fig. 3.

Il paroit par ce que je viens de dire des degrés d'extenſion, de contraction, & d'inflexion, dont le corps des Polypes, & leurs bras en général, & chacun d'eux en particulier ſont ſuſceptibles; il paroit, dis-je, combien eſt prodigieuſe la variété de figures & d'attitudes que ces Animaux peuvent prendre. Auſſi voit-on ſouvent prendre au même Polype dans un jour pluſieurs formes très différentes. Il ſeroit inutile de les décrire ici. Les Figures qui ſe trouvent jointes à cet Ouvrage en fourniſſent aſſez d'exemples.

Je dois encore ajouter, que les Polypes peuvent renfler leur corps, tantôt à un endroit, tantôt à l'autre, & ſouvent à pluſieurs endroits à la fois. J'en ai vu qui avoient le corps tout garni de plis, il étoit diſ-

posé en forme de courcaillet. Ces plis pourroient être pris pour des anneaux, si l'on n'observoit les Polypes que dans cette seule circonstance.

Le mouvement progressif des Polypes s'opére au moien de la faculté qu'ils ont de s'étendre, de se contracter & de se courber en tout sens. Soit le Polype *a b* *, fixé par son bout postérieur *b*, & dont le corps *a b* est étendu dans l'eau, de même que les bras: s'il veut avancer, il rapproche en se courbant, du corps sur lequel il doit marcher, son bout antérieur *a*; il fixe ensuite contre ce corps quelques fois simplement ce bout antérieur, d'autres fois seulement quelques bras, & d'autres fois enfin, & ces bras & le bout antérieur *a* *. Quand le bout antérieur du Polype est bien attaché, il détache le bout postérieur *b*, il le rapproche du bout antérieur *a*, & il l'attache en *b* *. Ensuite il détache encore son bout antérieur *a*, & il l'étend de nouveau *. Voilà en général la description du pas d'un Polype.

* PL. III. Fig. 1.
* Fig. 2.
* Fig. 3.
* Fig. 4.

On peut juger par là, que cette maniére de marcher a un grand rapport avec celle de divers Animaux terrestres & aquatiques: par exemple, avec celle des Chenilles appellées arpenteuses, & de quelques espéces de Vers aquatiques assez communs. Les Chenilles dont je viens de parler, & qui sont représentées dans les Figures 13, 15, & 16, de la Planche I. du second Mémoire du Tome premier de l'Ouvrage de Mr. de Reaumur, n'emploient guéres que l'inflexion pour rapprocher leur bout postérieur de l'antérieur; aulieu que ces Insectes aquatiques dont je viens de parler, emploient l'inflexion & la contraction. C'est

aussi

auſſi ce que ſont les Polypes, & ſans qu'il y ait toûjours la même proportion entre le degré d'inflexion & celui de contraction. Quelquefois ils ſe contractent beaucoup plus qu'ils ne ſe courbent, & réciproquement. Il y a à cet égard une grande variété: ce qui en met beaucoup dans les différens pas que font les Polypes. Outre cela, ils ne rapprochent point toûjours également leur bout poſtérieur de l'antérieur.

Ils exécutent les mouvemens qu'ils font pour marcher avec beaucoup de lenteur. Ils s'arrêtent ſouvent au milieu d'un pas, & diſpoſent & contournent leur corps * & leurs bras de toutes ſortes de maniéres. Les Polypes font quelquefois des pas aſſez extraordinaires. Je n'en décrirai que deux qui m'ont frappé, parcequ'ils m'ont paru aſſez éloignés de leur maniére de marcher la plus commune. * PL. II. Fig. 2.

Soit le Polype *a b* * fixé par ſon bout poſtérieur *b*, & dont le corps & les bras ſoient étendus dans l'eau. Pour faire un des pas extraordinaires dont il s'agit, il approchera d'abord ſon bout antérieur *a*, du corps ſur lequel il marche, & l'y attachera en *a* *. Il détachera enſuite ſon bout poſtérieur *b*, & dreſſera ſon corps perpendiculairement, le bout poſtérieur en haut *. Après cela il recourbera ſon corps de l'autre côté, & fixera le bout poſtérieur en *b* *. Il détachera enſuite le bout antérieur *a*, & il dreſſera de nouveau ſon corps, le bout antérieur en haut *. Voilà un pas, ou plutôt une culbute, qui ſe fait à la vérité très lentement. Un ſauteur agile en feroit un grand nombre, pendant qu'un Polype en fait une. * PL. III. Fig. 5. * Fig. 6. * Fig. 7. * Fig. 8. * Fig. 9. *a*.

VOICI quel eſt l'autre pas dont j'ai parlé. Soit le Polype *a b* *, fixé par le bout poſtérieur *b* contre les parois d'un verre, & dont le corps & la plupart des bras ſoient étendus en avant. Un de ſes bras *a c*, eſt fixé contre le verre en *c*. Quand le Polype eſt dans cette attitude, il détache le bout poſtérieur *b*, contracte un peu le corps, ce qui fait que le bout poſtérieur eſt un peu rapproché du point *c*. Ce bout là eſt fixé d'abord contre le verre en *d*, après quoi le Polype réïtére la même manœuvre, & fixe ſon bout poſtérieur au point *e*. J'ai vu quelquefois le bout poſtérieur ſe détacher & s'attacher ſucceſſivement, après que le corps s'étoit un peu contracté, trois & quatre fois de ſuite.

* PL. III. Fig. 10.

TOUT ce que j'ai dit du mouvement progreſſif des Polypes, ſe rapporte également aux trois eſpéces qui me ſont connuës. Dès qu'on prend goût à obſerver des Inſectes, on ne peut que voir avec plaiſir exécuter aux Polypes tous les mouvemens dont je viens de parler.

LES Polypes parcourent en marchant le fond de l'eau, ils montent le long de ſes bords, ou des Plantes aquatiques; ſouvent ils parviennent juſqu'à la ſuperficie de l'eau, & s'y tiennent ſuſpendus par leur bout poſtérieur *. J'en ai même vu qui y étoient pendus par un ſeul bras *, mais c'eſt là une attitude extraordinaire, au lieu que l'autre eſt fort commune. Les Polypes marchent à la ſuperficie de l'eau, comme ſur les corps dont j'ai parlé juſqu'à préſent. Ils ſont en deſſous de cette ſuperficie. On peut leur voir faire dans un verre les mouvemens qu'ils font dans

* PL. I. Fig. 4. *b*.
* PL. II. Fig. 4. *c*.

dans les grandes eaux: c'eſt même ce qui en donne les premiéres idées. Ils paſſent de deſſus les Plantes, ou de deſſus les autres corps auxquels ils ſont attachés lorſqu'on les tire de l'eau, ſur le fond ou ſur les cotés du verre dans lequel on les met. Ils montent le long des côtés, juſqu'à la ſuperficie de l'eau, paſſent ſous cette ſuperficie, s'y arrêtent, ou la traverſent en marchant, & vont ſur l'autre côté du verre, qu'ils parcourent enſuite.

Comme les Polypes font leurs pas très lentement, & mettent ſouvent un intervalle aſſez conſidérable entre chaque pas, ils emploient beaucoup de tems pour parcourir un petit eſpace. A juger par le grand nombre que j'ai tenu dans des verres, ſept ou huit pouces de chemin ſont une bonne journée d'Eté pour les Polypes. Lorſqu'il fait moins chaud, ils ſont encore plus lents, & par conſéquent ils avancent moins. Des trois eſpéces que je connois, les Polypes verds ſont les plus vifs. Quoiqu'ils faſſent leurs mouvemens avec lenteur, on peut dire qu'ils les font vite, en comparaiſon des Polypes des deux autres eſpéces.

Pour juger comment un Polype ſe ſoutient à la ſuperficie de l'eau, il ſuffit d'examiner à la loupe avec attention l'extrémité poſtérieure d'un de ces Animaux qui y ſont ſuſpendus *. Cette extrémité eſt hors de l'eau, elle eſt à ſec au fond d'un petit creux *, dont elle même forme le fond, & dont l'eau forme les bords: & pour ſe perſuader que cette circonſtance eſt abſolument néceſſaire pour que le Polype puiſſe être ſoutenu à la ſuperficie de l'eau, il n'y a

* PL. I. Fig. 4. *b.*

* *b.* & PL. III. Fig. 11. *b* & *c.*

qu'à humecter avec une goute d'eau ſon extrémité qui eſt à ſec, & ſur le champ il tombera à fond. Un Polype ſe ſoutient à la ſuperficie de l'eau, préciſément par le même moien qu'on emploie pour y faire ſoutenir une épingle. On la poſe avec précaution ſur cette ſuperficie pour qu'elle ne ſe mouille pas, & alors elle s'y ſoutient. Le côté de l'épingle qui ne touche pas l'eau eſt à ſec, au fond d'un creux formé par l'eau même, & qui eſt toûjours plus grand & plus profond, à proportion que l'épingle eſt plus peſante.

Lorsqu'un Polype veut paſſer de deſſus le côté d'un verre à la ſuperficie de l'eau, il ſuffit donc qu'il faſſe ſortir tant ſoit peu hors de l'eau la partie par laquelle il doit s'y ſoutenir, & qu'il lui donne le tems de ſe ſécher. C'eſt auſſi ce qu'il fait, & ce qu'il eſt très aiſé d'obſerver, ſi l'on en cherche l'occaſion. Si, par exemple, un Polype eſt fixé contre le côté d'un verre près de la ſuperficie de l'eau *, il éleve, pour y paſſer, ſon extrémité antérieure * vers cette ſuperficie; il l'en fait ſortir, & la laiſſe ſécher pendant un inſtant. Il détache alors ſon bout poſtérieur * du verre, le rapproche de la ſuperficie de l'eau, & l'en fait ſortir: dans un moment il eſt ſec, & en état de ſoutenir le Polype, qui retire ſous l'eau ſon bout antérieur. Il ſe trouve alors ſuſpendu à la ſuperficie de l'eau *. Souvent il étend d'abord ſon corps & ſes bras.

* PL. III. Fig. 11. *ef.*
* *e.*
* *f.*
* *ed.*

Ce que je viens de dire peut ſuffire, pour faire comprendre comment les Polypes marchent ſous la ſuperficie de l'eau, & comment ils la quittent pour paſſer

paſſer ſur les côtés d'un vaſe, ou ſur les corps qui ſont dans l'eau.

Dans le cours des Expériences que j'ai faites ſur les Polypes, il a ſouvent été néceſſaire, que ceux ſur leſquels je les faiſois fuſſent ſuſpendus à la ſuperficie de l'eau. On n'eſt pas toûjours ſûr qu'ils s'y rendront d'eux mêmes. J'ai donc cherché le moien de les y faire ſoutenir quand je voudrois. J'ai d'abord tenté inutilement quelques expédiens, & je ne ſuis parvenu au bon, que lorſque j'ai eu une idée nette de la maniére dont les Polypes ſe ſoutiennent à la ſuperficie de l'eau. Dès que j'ai vu que leur bout poſtérieur étoit à ſec hors de l'eau, j'ai entrepris de mettre auſſi à ſec le bout poſtérieur des Polypes que je voulois avoir à la ſuperficie de l'eau, & je ſuis par ce moien parvenu à les y faire ſoutenir.

Pour cet effet, je commence par les mettre dans un verre peu profond, & j'attens qu'ils ſe ſoient bien étendus. Enſuite je les tire de l'eau. Je me ſers pour cela d'un pinceau. C'eſt un inſtrument très-commode, & dont on a continuellement beſoin pour manier les Polypes. Je mets le bout du pinceau ſous le Polype, je le pouſſe peu à peu juſqu'à la ſuperficie de l'eau; & je l'enléve ſur ce pinceau, auquel il reſte attaché. Il arrive ordinairement, qu'en touchant & en pouſſant le Polype avec le pinceau, on le fait contracter, au moins en partie, & qu'il achéve de ſe contracter dans le moment qu'il ſort de l'eau. Cependant il eſt à ſouhaiter qu'il ne ſoit pas extrémement contracté. On peut venir à bout de prévenir cette trop grande contraction, prémiérement, en attendant

que

que le Polype ſoit bien étendu, avant que d'entreprendre de le tirer de l'eau. En ſecond lieu, en exécutant avec lenteur & avec délicateſſe ce qu'il faut faire pour placer le Polype ſur le pinceau. Je dois encore avertir que le Polype, en ſortant de l'eau, doit être couché ſur le pinceau, de maniére que ſon extrémité antérieure, réponde au bout du pinceau. On en ſentira la raiſon. Il faut laiſſer un moment, une minute ſi l'on veut, le Polype hors de l'eau ſur le pinceau, que l'on prend enſuite dans une main, & dans l'autre une plume taillée en pointe. J'enfonce peu à peu dans l'eau la pointe du pinceau, & avec elle le bout antérieur du Polype, qui eſt appliqué deſſus; & juſqu'à ce qu'il ne reſte hors de l'eau qu'une partie de ſon bout poſtérieur, d'environ demi ligne de longueur, je continuë à enfoncer le pinceau. Dans ce moment j'éloigne, avec la pointe de la plume que j'ai dans l'autre main, la partie du Polype qui eſt déja dans l'eau, & qui ſouvent, en flottant, s'eſt déja détachée du pinceau; je l'éloigne, dis-je, du pinceau, & par ce moien, & en ſouflant contre le Polype, je fais détacher du pinceau ſon extrémité poſtérieure, qui le touchoit encore, & qui ſe trouvoit hors de l'eau. Dès qu'elle eſt détachée, je retire le pinceau, & je laiſſe le Polype tranquille. Le bout qui eſt hors de l'eau y reſte ordinairement, le corps s'étend dans l'eau, & le Polype ſe trouve ſuſpendu à ſa ſuperficie. Cela ne réüſſit pas toûjours. Pluſieurs accidens peuvent faire manquer le ſuccès de cette tentative. On en eſt quitte pour recommencer.

Si un Polype eſt déja ſuſpendu à la ſuperficie de l'eau,

l'eau, & qu'on veuille le changer d'eau, ce qui eſt ſouvent très néceſſaire, il eſt dans ce cas là facile de le faire ſuſpendre à la ſuperficie de la nouvelle eau dans laquelle on veut le mettre, & qui doit être dans un autre verre. Il faut tâcher de placer le pinceau parallèlement au Polype, & de l'en approcher, juſqu'à ce qu'il le touche. Le Polype s'applique contre le pinceau, on le tire de l'eau, & ſon bout poſtérieur, qui étoit ſec, reſte tel, enſorte qu'on peut ſur le champ le mettre dans la nouvelle eau, en ſe ſervant des précautions que je viens d'indiquer tout à l'heure.

QUELQUE longue que ſoit la deſcription de cette manœuvre que j'emploie pour faire ſuſpendre les Polypes à la ſuperficie de l'eau, j'ai cru devoir la décrire en faveur de ceux qui voudront répéter mes Expériences, & en faire de nouvelles. Je leur épargne, par ce moien, la peine & le tems qu'ils devroient mettre à chercher des expédiens, & ils ne ſeront pas moins en état d'en trouver de meilleurs.

JE n'ai jamais vu nager des Polypes, & il paroit qu'ils ne le peuvent pas. J'en ai détaché, des corps ſur leſquels ils étoient fixés, dans toutes ſortes de circonſtances, dans différens degrés d'extenſion & de contraction; j'ai fait quitter à d'autres la ſuperficie de l'eau, à laquelle ils étoient ſuſpendus; je les ai mis au milieu de l'eau, & aucun n'a fait le moindre mouvement pour nager: ils ſont tous tombés au fond de l'eau, plus ou moins vite, à proportion qu'ils étoient plus ou moins étendus ou contractés.

J'AI donné les noms de pieds & de bras, à ces fils

qui ſortent de l'extrémité antérieure des Polypes. On a vu par ce que j'ai dit ſur leur mouvement progreſſif, qu'en effet ces parties leur ſervent de pieds. Lorſque je parlerai de la maniére dont les Polypes ſaiſiſſent & retiennent leur proie, il ſera facile de juger que ſurtout le nom de bras leur convient. J'indiquerai ici encore une autre fonction de ces bras. Les Polypes s'en ſervent quelquefois pour ſe cramponner fortement contre les corps ſur leſquels ils ſont fixés. Ordinairement ils n'y ſont attachés que par leur bout poſtérieur; ce qui leur ſuffit pour n'être pas entrainés par un mouvement de l'eau, même conſiderable. J'ai obſervé pluſieurs fois des Polypes, qui non ſeulement étoient fixés au fond de mes verres par leur bout poſtérieur, mais dont deux ou trois bras, outre cela, dirigés vers différens côtés, étoient tendus & fixés contre le verre. Le Polype attaché de cette ſorte ne pouvoit être balotté par le mouvement de l'eau. Il ſe peut qu'une pareille attitude ſoit quelquefois utile à ces Animaux lorſqu'ils ſont au fond des foſſés. Mais il y a une circonſtance dans laquelle il doit leur importer davantage de ſe ſervir de leurs bras en guiſe d'ancres & de cables, pour n'être pas entrainés par le mouvement de l'eau. C'eſt lorſqu'ils ſont ſuſpendus à ſa ſuperficie. Ils ſont alors expoſés à tous les mouvemens de l'eau. Suppoſé donc qu'un Polype, & ſurtout un Polype à longs bras, ſoit ſuſpendu à la ſuperficie de l'eau, & qu'il lui convienne de n'être pas entrainé par le mouvement de cette eau, il pourroit jetter l'ancre au moien de ſes bras, il pourroit en fixer l'extrémité contre le fond

fond de l'eau, ou contre les Plantes & les autres choſes qui ſont dans cette eau. S'il attachoit trois ou quatre bras de différens côtés, il ſeroit préciſément dans le cas d'un Vaiſſeau affourché ſur ſes ancres. Je ne donne point ceci comme un uſage évidemment certain de ces bras. Ce n'eſt qu'une conjecture, qui a été occaſionnée par un Fait que j'ai vu.

DEUX Polypes à longs bras * étoient ſuſpendus à la ſuperficie de l'eau d'un de mes verres. Je les trouvai un jour dans une attitude à peu près telle que celle que je viens de ſuppoſer. L'un * avoit deux de ſes bras * fixés par leur extrémité contre le fond du verre, de deux côtés différens *, & l'autre † avoit un bras * fixé auſſi contre le fond du verre, & un autre bras * attaché par ſon extrémité † au côté du verre, aſſez près du fond. J'agitai un peu l'eau en ſouflant. Les vagues que mon ſoufle y occaſionna, n'entrainerent pas entiérement les Polypes, ils furent retenus dans un certain eſpace par leurs ancres, par leurs bras, qui étoient fort tendus, & qui étoient fermement attachés au verre. Je fus obligé de ſecouer le vaſe avec force pour les obliger à ſe détacher.

* PL. III. Fig. 11. *a b* & *d e*.

* *d e*.

* *d i* & *d k*.

* *i* & *k*. † *a b*.

* *a g*.

* *a b*. † *b*.

ON a déja pu juger par tout ce que j'ai dit, que les Polypes peuvent s'attacher fortement contre les corps ſur leſquels ils s'arrêtent. J'ai fait quelques Expériences qui pourront donner une idée de cette adhéſion. Les précautions néceſſaires pour conſerver les Polypes, fourniront ſouvent occaſion à ceux qui voudront en nourrir, de voir les Faits dont je veux parler. Pour conſerver ces Animaux en ſanté, il faut les changer d'eau aſſez ſouvent, ſurtout après qu'ils

ont mangé: c'eſt ce que l'on comprendra mieux par ce que je dirai dans la ſuite. Si le Polype qu'on veut changer d'eau eſt fixé contre les parois d'un poudrier, & que ce poudrier, n'ait pas beſoin d'être nettoié, il ſuffira de jetter l'eau qui eſt dedans. Quelque rudement qu'on la verſe, elle n'entrainera point le Polype, il reſtera attaché au verre. On jugera encore mieux de la force avec laquelle il tient contre ce verre, en y mettant de nouvelle eau. L'effort de l'eau qui tombe dans le verre en aſſez grande quantité, de pluſieurs pouces de hauteur, & l'agitation où celle qui tombe tient l'eau qui eſt déja dans le poudrier, ne ſuffiſent pas ordinairement pour détacher le Polype. Son bout antérieur eſt ſimplement emporté de tous côtés par cette eau agitée, mais le bout poſtérieur ne quitte point le verre. Il eſt aiſé de concevoir que, pour réſiſter à un pareil effort, il doit être attaché avec aſſez de force.

CETTE adhéſion eſt volontaire. On a vu ci deſſus, qu'un Polype attache & détache ſucceſſivement, en marchant, les deux extrémités de ſon corps & ſes bras. Il eſt donc le maitre de vaincre cette force avec laquelle il eſt attaché. Il s'agit de ſavoir s'il la ſurmonte par un effort, ou par quelqu'autre moien. Les Polypes ſont des Animaux trop petits, pour qu'on puiſſe faire ſur eux des Expériences bien ſûres à cet égard.

MR. de Reaumur en a fait, avec ſa ſagacité ordinaire, ſur l'adhéſion de l'Oeuil de bouc. Après en avoir aſſigné les principales cauſes, il applique ce qu'il a dit de l'adhéſion de ce Coquillage, à celle des jambes

des

des Etoiles & des Orties de mer. Mr. de Reaumur a trouvé, que c'eſt ſurtout au moien d'une matiére viſqueuſe que ces Animaux s'attachent contre les corps, que l'effet de cette colle, combiné avec l'engrainement des parties de la peau de l'Animal, dans les irrégularitez des corps ſur leſquels il s'attache, produit cette adhéſion de l'Oeuil de bouc. Ce Naturaliſte a découvert, que lorſque cet Animal veut ſe détacher, il mouille la baſe de ſon corps avec de l'eau qu'il en fait ſortir, & que cette eau délaiant la colle qui le tenoit attaché, ſupplée à l'effort néceſſaire pour vaincre cette adhéſion. „ La baſe de l'Animal, dit Mr. de Reau-
„ mur *, en parlant de l'Oeuil de bouc, paroit rem-
„ plie d'une infinité de petits grains, elle eſt comme
„ chagrinée; une partie de ces grains ſont de petites
„ cellules pleines d'eau. On n'en peut douter, puiſ-
„ qu'ils la laiſſent échapper lorſqu'on les ouvre en fai-
„ ſant une plaie à la baſe, quelque légere que ſoit cet-
„ te plaie. Une autre partie des mêmes grains con-
„ tient la colle, ou la glu dont il s'agit, ou, ſi l'on
„ veut, quelques autres vaiſſeaux la portent par tou-
„ te la baſe. L'Animal veut-il s'attacher, il exprime,
„ il fait ſortir la glu des vaiſſeaux qui la contenoient,
„ & preſſe ſa baſe ainſi humectée contre quelque
„ pierre que la mer a laiſſée à découvert pendant ſon
„ reflux. Veut-il quitter la même pierre, il n'a pas
„ beſoin d'emploier une force égale à celle d'un poids
„ de trente livres, comme nous l'ayons fait voir; il
„ n'a qu'à preſſer les cellules qui contiennent l'eau;
„ l'eau s'échappe, délaie la colle, & l'Animal a la li-
„ berté d'aller chercher des alimens convenables.

* Mém. de l'Acad. pour l'année 1711. pag. 113.

Il eſt très apparent, que ce que Mr. de Reaumur dit des cauſes de l'adhéſion de l'Oeuil de bouc, convient auſſi à celle des Polypes. Quelque polis que ſoient les corps ſur leſquels ils s'attachent, le verre par exemple, ils ont encore aſſez d'irrégularités, pour que le Polype puiſſe, par la preſſion, y engrainer des parties de ſa peau extrémement petites, & cet effet, joint avec celui de la matiére viſqueuſe, peut ſervir à expliquer leur adhéſion, quoique cependant je ne voudrois pas répondre qu'elle n'eût encore d'autres cauſes.

Il paroit certain que les Polypes ont de la matiére viſqueuſe. Lorſqu'on les met à ſec ſur la main, & qu'on les manie, ils ne ſemblent compoſés d'autre choſe que d'une pareille matiére; il ſemble que l'on manie un peu de glaire.

Il eſt certain que le corps des Polypes eſt chagriné, & même bien garni de petits grains; mais je ne voudrois pas décider que l'uſage de ces grains, ou leur ſeul uſage, conſiſtât à fournir aux Polypes de la matiére viſqueuſe ou de l'eau, ſuivant qu'ils veulent s'attacher ou ſe détacher, ou lorſqu'ils veulent ſaiſir ce que leurs bras rencontrent, ou le lâcher quand ils le tiennent.

J'ai déja déſigné pluſieurs fois les Polypes de la premiére eſpéce par leur couleur, je les ai appellés les Polypes verds: Ceux des deux autres eſpéces ſont ordinairement d'un brun rougeâtre, lorſqu'on les tire des foſſés où ils ſe ſont nourris. Les Polypes à longs bras approchent quelquefois d'un rouge couleur de chair.

Il eſt impoſſible de déſigner d'une maniére préciſe

ſe la couleur des Polypes de ces deux derniéres eſpéces, parcequ'elle varie beaucoup. Tous ceux que l'on tire à la fois des foſſés, ſont bien éloignés d'avoir la même nuance de couleur. Il s'en rencontre qui ont différentes nuances de brun & de rougeâtre, & quelquefois même il y en a qui ont une toute autre couleur. J'ai fait ſur ce ſujet des Expériences très déciſives; mais la grande liaiſon qu'elles ont avec ce qui regarde la nourriture des Polypes, m'oblige, pour ne pas répéter les mêmes Faits, à en renvoier l'expoſition juſqu'à ce que je ſois parvenu à cet article.

La nuance de la couleur des Polypes change ſuivant leur degré d'extenſion & de contraction. Elle devient plus claire à meſure qu'ils s'étendent, & elle eſt beaucoup plus foncée lorſqu'ils ſont fort contractés. Cela regarde les trois eſpéces de Polypes que je connois.

L'Observation ſuivante ſe rapporte auſſi à ces trois eſpéces de Polypes. Ils peuvent perdre leur couleur, & devenir blancs, & puis ils peuvent la reprendre. Ils perdent & reprennent leur couleur peu à peu, & c'eſt même de là que réſultent, en partie, ces différentes nuances que l'on découvre dans les différens individus de la même eſpéce, & dans le même individu en différens tems. Cette différence de nuance, dont je parle à préſent, eſt indépendante de celle qui réſulte des différens degrés de contraction & d'extenſion qui ſe rencontrent dans les Polypes.

Lorsque l'on conſidére un Polype à la loupe & au microſcope, la ſuperficie de ſon corps paroit chagri-

grinée comme ſi elle étoit garnie de petits grains *. Elle paroit ainſi, lorſque le corps eſt contracté, & lorſqu'il eſt étendu. Le plus & le moins peut varier ſuivant ces circonſtances, & ſuivant d'autres.

* PL. V. Fig. 1.

La couleur qui ſe fait remarquer dans les Polypes n'eſt point ſur leur ſuperficie. On peut à l'œuil, mais ſurtout avec le ſecours d'une loupe, ou de la lentille d'un microſcope, s'appercevoir qu'ils ſont recouverts de quelque choſe de tranſparent, & que ce n'eſt que là deſſous qu'eſt ce qui donne aux Polypes leur couleur. Cette enveloppe tranſparente eſt bien clairement repréſentée dans la Fig. 1. de la Pl. V. Je dois cependant avertir ici, qu'il eſt bon qu'on ne ſe faſſe pas une idée de cette enveloppe tranſparente des Polypes, comme ſi c'étoit une peau diſtincte, & ſéparée de ce qui eſt deſſous.

Le bout antérieur des Polypes ne paroit pas toujours conformé de la même maniére. J'ai déja dit, & les Figures que j'ai citées font voir, que leurs bras ſortent des bords de ce bout antérieur. C'eſt ce qui eſt au milieu de l'origine de ces bras dont je veux parler, c'eſt cette partie qui ne paroit pas toujours conformée de la même maniére. Elle eſt très ſouvent allongée, & elle a alors la figure d'un petit mamelon conique *. Le cone qu'elle forme paroit quelques fois tronqué †. D'autres fois on ne découvre aucun mamelon; l'intervalle qui eſt entre l'origine des bras eſt tout uni ‡. Enfin, il eſt creux en d'autres circonſtances, le bout antérieur du Polype eſt ouvert, & un peu évaſé *. Ce n'eſt pas ſeulement dans cette derniére circonſtance que ce bout eſt ouvert. Lorſqu'on

* PL. I. Fig. 3. *a*, & PL. IV. Fig. 4.

† PL. V. Fig. 1. *a*.

‡ PL. II. Fig. 2. *a*, & PL. IV. Fig. 5.

* PL. I. Fig. 1. *i*, Fig. 2. *e*, & PL. IV. Fig. 6.

qu'on l'obſerve à la loupe, quand il eſt plat, ou quand il eſt formé en cone tronqué, on y découvre quelques fois un petit trou. Il eſt repréſenté en grand dans la Figure 1. de la Pl. V. *. * a.

JE n'entrerai point à préſent dans le détail de l'uſage de ce bout antérieur des Polypes, qui, comme on le voit, peut s'ouvrir & ſe fermer. Mon but n'eſt que d'en donner ici une deſcription générale. J'avertirai ſeulement que l'ouverture qui eſt à cette extrémité antérieure ſert de bouche aux Polypes. C'eſt donc de leurs lévres que ſortent les bras *, & c'eſt de la forme que prennent ces lévres en s'étendant & en ſe contractant, que dépendent les différences que j'ai remarquées dans le bout antérieur, ou, pour parler autrement, dans la tête des Polypes: car après avoir dit ce que je viens de dire, je puis lui donner ce nom. * PL. IV. Fig. 4. 5. 6.

L'OCCASION ſe préſente ici naturellement, de comparer nos Polypes d'eau douce avec les Polypes de mer, & de juſtifier, par le rapport que leur ſtructure extérieure a avec celle de ces Animaux marins, le nom qui leur a été donné. Les pieds ou bras des Polypes marins ſont placés à leur tête & autour de leur bouche, & l'on eſt à préſent en état de juger, que telle eſt auſſi la ſituation des pieds ou bras des Polypes d'eau douce. Les uns & les autres ſe ſervent de ces parties pour marcher, & je ferai bientôt voir que, de même que les Polypes marins, ceux d'eau douce s'en ſervent auſſi pour arrêter leur proie, & pour la porter à leur bouche.

LA bouche de nos Polypes s'ouvre dans leur eſto-

mac, dans un ſac qui va de cette bouche, de l'extrémité antérieure du Polype, juſqu'à ſon extrémité poſtérieure. C'eſt ce dont on peut juger à l'œuil ſimple, mais ſurtout avec le ſecours d'une loupe. Il faut pour cela expoſer le Polype au grand jour, ou à la lumiére d'une bougie. La couleur du Polype ne lui ôte pas un certain degré de tranſparence, au moien duquel on diſtingue clairement qu'il eſt percé d'un bout à l'autre. Ce vuide intérieur eſt repréſenté dans le Polype groſſi au microſcope *.

* PL. V. Fig. 1. *a b.*

Je ne me ſuis pas contenté, pour m'aſſurer que les Polypes étoient percés d'un bout à l'autre, de les obſerver en dehors. J'ai cherché à voir cette ouverture par dedans; & pour cet effet j'ai coupé un Polype transverſalement en trois parties. Chacune de ces parties s'eſt contractée, & s'eſt trouvée fort courte. Je les ai toutes trois dreſſées ſur le fond d'un verre plat & plein d'eau, & j'ai vu alors très clairement qu'elles étoient percées d'un bout à l'autre. En regardant par le bout qui étoit en haut, je voiois par l'autre bout le fond du verre ſur lequel chaque partie repoſoit *; preuve certaine qu'elles étoient percées d'un bout à l'autre: Et ſi chacune de ces trois parties étoit percée d'un bout à l'autre, il s'enſuit bien évidemment, que le Polype qui en étoit compoſé, étoit percé d'un bout à l'autre. La bouche étoit à l'extrémité antérieure de la premiére de ces trois parties *: elle étoit alors fort ouverte. L'extrémité poſtérieure du Polype ſe trouvoit à un bout de la troiſiéme partie *. Puiſque cette partie étoit percée d'un bout à l'autre, il s'enſuit clairement, que le bout poſté-

* PL. IV.* Fig. 1, 2, 3.

* Fig. 1. *a.*

* Fig. 3. *b.*

poſtérieur des Polypes peut auſſi s'ouvrir. On n'a pas autant d'occaſions de le voir ouvert que la bouche. Pluſieurs Faits que je rapporterai dans la ſuite pourront encore ſervir à prouver que les Polypes ſont percés d'un bout à l'autre.

Il eſt facile de comprendre, combien & comment les différentes formes que peut prendre un Polype en s'étendant & en ſe contractant, en ſe courbant & en ſe renflant en différens endroits, peuvent faire varier la figure de ce canal, qui paſſe d'une extrémité de leur corps à l'autre. Il eſt quelques fois cylindrique, & d'autres fois plus étroit ou plus large en de certains endroits qu'en d'autres *. Dans les Polypes à longs bras, qui ſe rétréciſſent conſidérablement, environ aux deux tiers de leur longueur, ce canal ſe rétrécit à proportion *.

* PL. V. Fig. 1.

* Fig. 1.

J'ai donné le nom d'eſtomac à cette ouverture qui régne d'un bout à l'autre du corps des Polypes; parceque c'eſt en effet là que ſont portés les alimens, & qu'ils y ſont digerés. Il eſt ſouvent plein d'eau, qui peut y entrer facilement, la bouche étant preſque toujours ouverte.

J'ai trouvé quelquefois des Polypes qui avoient une bulle d'air dans leur eſtomac. La premiére fois que je vis une de ces bulles, je doutai ſi c'en étoit bien une. Il y avoit un moien facile de s'en aſſurer. Tout Polype qui n'eſt pas attaché quelque part, tombe au fond de l'eau, par ſon propre poids. Celui dans l'eſtomac duquel je croiois voir une bulle d'air, étoit fixé contre le côté d'un poudrier. Je n'avois qu'à le détacher. S'il n'avoit point de bulle d'air dans

le corps, il devoit aller à fond après avoir été détaché, & s'il avoit une bulle d'air, il devoit être élevé à la ſuperficie de l'eau par l'effet de cette bulle d'air, comme cela arrive à tous les Polypes qui en ont une en dehors à leur extrémité poſtérieure. Je détachai donc mon Polype, & d'abord il fut enlevé à la ſuperficie de l'eau.

La peau qui enferme l'eſtomac des Polypes, qui forme ce ſac ouvert par les deux bouts, eſt la peau même des Polypes. Tout l'Animal ne conſiſte que dans une ſeule peau, diſpoſée en forme de tuiau, ou de boiau, ouvert par ſes deux extrémités. Lorſqu'on ouvre d'autres Animaux, des Chenilles, diverſes eſpéces de Vers, on leur trouve différens vaiſſeaux; mais en ouvrant les Polypes, on n'en trouve abſolument qu'un, auſſi long que le Polype, ou plutôt, comme je l'ai déja dit, tout cet Animal ne paroit former qu'un vaiſſeau, dont la ſuperficie extérieure eſt la ſuperficie même de l'Animal.

J'ai dit qu'on ne trouvoit dans les Polypes qu'un ſeul vaiſſeau; j'ai ſeulement entendu par là, que je n'en ai pu découvrir aucun autre. Il ſe peut qu'il y en ait dans cette peau dont j'ai parlé, qui ont échappé à mes Obſervations, & qui ſont peut-être ſi petits qu'ils ne peuvent être apperçus.

Il eſt clair que ce canal qui régne depuis la bouche des Polypes juſqu'à leur extrémité poſtérieure, eſt le canal des alimens *, que c'eſt l'eſtomac, dans lequel ils commencent à être préparés pour ſervir à la nutrition. C'eſt ce que j'aurai bientôt occaſion de faire voir. Il doit y avoir dans la peau qui forme cet

* PL. V. Fig. 1. *a b.*

cet eſtomac, des parties qui reçoivent enſuite le ſuc nourricier; & il doit encore s'y trouver tous les organes requis pour opérer la nutrition & l'accroiſſement des Polypes; ſans parler de tous ceux qui ſont néceſſaires pour produire leurs mouvemens. Mais la nature & la diſpoſition de ces parties doivent être bien difficiles à découvrir, dans un Animal auſſi petit & auſſi molaſſe que l'eſt un Polype.

On pourroit, par analogie, ſuppoſer dans la peau des Polypes telles ou telles parties; mais j'ai peine à croire que ces ſuppoſitions, fondées ſur la ſimple analogie, fuſſent fort ſatisfaiſantes. Un Animal qui a diverſes propriétés directement contraires à l'analogie tirée de tant d'autres Animaux, ne peut-il pas auſſi différer de ces Animaux à l'égard de la nature des parties imperceptibles qui les compoſent, & de l'œconomie animale qui réſulte de leur ſtructure & de leurs opérations? Cela me paroit même plus que vraiſemblable.

J'ai expoſé, de toute ſorte de maniéres, la peau des Polypes au microſcope, pour tâcher de découvrir de quoi elle eſt compoſée. Un de mes premiers ſoins a été, d'examiner les bords, les lévres de la peau d'un Polype coupé transverſalement. J'ai placé, pour cet effet, une portion de Polype ſur un morceau de verre. Je l'ai ſituée de maniére, que je pouvois regarder directement ſur la tranche de la peau, ſur la coupe du Polype *. Il m'a paru que ce que j'ai appellé la ſuperficie tranſparente du Polype, l'enveloppe de la partie colorée, étoit fort uni au reſte, & lui reſſembloit parfaitement, par rapport à la compoſition de

* PL. IV. Fig. 2. *a.*

ſes parties. Ces parties dont je veux parler, & dont il ſera fait ſouvent mention dans la ſuite, ſont de petits grains, dont les bords d'un morceau de peau de Polype paroiſſent garnis, quand on les obſerve à la loupe & au microſcope. Cette peau, dans toute ſon épaiſſeur, eſt pleine de ces petits grains.

Ce ſont ces mêmes grains qu'on remarque quand on obſerve la ſuperficie extérieure d'un Polype, ce ſont eux qui la font paroître chagrinée.

Je n'ai pu qu'être curieux de ſavoir, s'il y avoit de pareils grains ſur la ſuperficie intérieure de la peau des Polypes, ſur les parois de leur eſtomac. J'en ai donc ouvert pluſieurs. Voici comment je m'y prens.

Je mets un Polype ſur ma main, & je l'y fais contracter le plus qu'il eſt poſſible; après quoi j'introduis dans ſa bouche une pointe de ciſeaux très fins, & je la fais ſortir par le bout poſtérieur. Je ferme enſuite les ciſeaux, c'eſt-à-dire, je coupe un côté de la peau du Polype ſuivant toute ſa longueur, j'ouvre d'un bout à l'autre le canal qu'elle forme, & en abaiſſant après cela de côté & d'autre cette peau que j'ai ſéparée, je découvre la ſuperficie intérieure de la peau du Polype, les parois de ſon eſtomac. Le Polype lui même n'eſt plus qu'une peau ſimple, étenduë ſur ma main, contre laquelle eſt appliquée la ſuperficie extérieure de cette peau, & dont l'intérieure eſt en deſſus *. Il m'eſt alors facile de conſidérer à mon aiſe, avec une forte loupe, cette ſuperficie intérieure de la peau du Polype; & ſi je veux l'expoſer au microſcope, je n'ai qu'à la tranſporter ſur une lame de verre. Une loupe d'un foier très court, & de fortes len-

* PL. IV. Fig. 7.

lentilles du microſcope, m'ont fait auſſi découvrir ſur cette ſuperficie intérieure de la peau des Polypes *, une grande quantité de ces mêmes grains que j'avois déja vus ſur leur ſuperficie extérieure, & ſur la tranche d'un morceau de peau. Mais la ſuperficie intérieure m'a paru encore plus chagrinée que l'extérieure, & beaucoup moins unie : & au lieu d'être tranſparente, comme l'autre, elle a une teinte de la couleur du Polype.

* PL. IV. Fig. 7. *a.*

J'AI comparé ces deux ſuperficies dans un grand nombre de Polypes que j'ai ouverts exprès, ou pour faire d'autres Expériences. On verra dans la ſuite, qu'il ne m'a pas été indifférent d'avoir fait cette comparaiſon. J'aurai occaſion de déſigner plus particuliérement en quoi ces ſuperficies ſe reſſemblent, & en quoi elles diffèrent, en continuant à expoſer ce que j'ai pû découvrir ſur la ſtructure de cette peau des Polypes.

IL m'a ſemblé qu'elle étoit toute compoſée de ces petits grains qu'on voit diſtinctement ſur ſes deux ſuperficies, & ſur les bords des Polypes qu'on a coupés *. Pour examiner cela en détail, j'ai mis ſur une lame de verre, un morceau de peau dans une goutte d'eau, & je l'ai enſuite expoſé à la loupe & au microſcope *. J'ai déja dit qu'on voioit, autour des bords d'un morceau de peau de Polype, une grande quantité de grains. J'en ai fait ſortir un plus grand nombre *, en le preſſant avec la pointe d'une plume, en le frottant contre le verre, & en tâchant de le faire déchirer. Les grains ſe répandoient de toute part dans l'eau, & s'y trouvoient enſuite par monceaux *.

* Fig. 2. *a.* & Fig. 7. *b.*

* Fig. 8. *a.*

* *b*, *c*, *d.*

* *e*, *f.*

Lorſ-

Lorſque je panchois un peu la lame de verre ſur laquelle étoient ces grains, il ſe formoit de petits courans qui les entrainoient *. Ces courans ſe formoient le long des bords du morceau de peau de Polype * dont les grains étoient ſortis, & ils en détachoient de nouveaux. Ce que j'ai vu alors m'a donné occaſion de juger, que ces grains ne ſont pas fort attachés les uns aux autres. Le courant d'eau les ſépare ſouvent, & les entraine chacun à part.

* PL. IV. Fig. 8. *b, c, d.*
* *a.*

J'AI cherché, avec tout le ſoin poſſible, s'ils étoient logés dans des vaiſſeaux, mais je n'ai rien pû découvrir. Il faut cependant qu'il y ait quelque choſe qui tienne ces grains raſſemblés, qui faſſe que l'eau ne ſépare pas ceux d'un Polype entier, comme elle ſépare ceux des morceaux de Polype qu'on déchire dans une goutte d'eau.

CE que je vai dire de la matiére glaireuſe des Polypes, indiquera peut-être une cauſe de l'union de ces grains. Pour cet effet, je reviens aux morceaux de peau de Polypes, placés dans une goutte d'eau, ſur une lame de verre. Quand j'en ai agité & déchiré dans cette goutte d'eau, pendant que je les obſervois avec une loupe d'un foier fort court, j'ai vu pluſieurs grains qui paroiſſoient engagés en commun dans une matiére glaireuſe.

IL eſt certain que les Polypes ſont glaireux; & c'eſt ce dont on ſe convaincra facilement par ſes propres yeux, pour peu qu'on les obſerve avec attention. Quand on éléve la pointe de la plume * qui eſt dans un morceau de peau de Polype *; elle entraine quelques fois un fil de matiére glaireuſe, qui

* Fig. 9. *a.*
* *b.*

ſou-

ſouvent eſt garni de grains. J'ai vu commodément filer cette matiére glaireuſe d'un morceau de Polype, placé devant une forte lentille du microſcope, en appuiant ſur cette peau de Polype la pointe d'une plume, qui étoit fendüe comme le ſont celles dont on ſe ſert pour écrire. La fente de la plume s'ouvroit, lorſque je l'appuiois, & je voiois alors un fil de glaire, plus ou moins épais *, qui traverſoit cette ouverture. Ces fils ſont ordinairement garnis de grains: mais à force d'agiter & de ſecouër un petit morceau de peau dans une goutte d'eau, j'ai fait ſéparer de la glaire la plupart des grains; enſorte qu'elle eſt reſtée à peu près ſeule au bout de la plume. Pendant cette opération, je conſidérois continuellement l'objet avec une forte loupe.

* PL. IV. Fig. 9. c.

Il n'y a donc pas lieu de douter, que ces grains des Polypes ne ſoient mêlés avec une matiére glaireuſe, qui contribuë à les tenir réunis. Je donnerai bientôt, en parlant de la ſtructure des bras des Polypes, des preuves de la ténacité de cette matiére. Il m'a ſemblé qu'il y en avoit toujours plus à la ſuperficie extérieure des Polypes, qu'à l'intérieure. C'eſt ce qui fait paroitre cette ſuperficie extérieure plus unie que l'autre. Souvent même les Polypes paroiſſent enveloppés de cette matiére, qui leur ſert en quelque maniére de peau.

Si on expoſe un Polype entier au microſcope, ſans lui avoir fait aucune bleſſure, on ne laiſſe pas d'ordinaire de voir, en quelques endroits de la ſuperficie, des grains qui s'en ſont détachés. Cela ſe remarque aux Polypes les plus ſains: mais lorſque ces

grains ſe détachent en grande quantité, c'eſt le ſymptome d'une maladie très dangereuſe. La ſuperficie du Polype qui en eſt attaqué, devient de plus en plus irréguliére, elle n'eſt plus terminée comme auparavant, il en ſort des grains de tous côtez, le Polype ſe contracte, ſe renfle, de même que ſes bras *, il prend un œuil blanchâtre, enfin il perd ſa forme, & il ne ſe trouve plus, à la place où il étoit, qu'un amas de grains *. On diroit que la matiére glaireuſe, qui réuniſſoit ces grains, a perdu ſa ténacité, & que dès lors ils ſe ſont ſéparez. Pour bien voir les effets de cette maladie que je viens de décrire, il faut l'obſerver dans un Polype de la ſeconde ou de la troiſiéme eſpéce, & en choiſir un des plus grands.

* PL. IV. Fig. 10. *a.*

* *b.*

Je dois faire encore ici une remarque très importante ſur les grains dont la peau des Polypes eſt garnie. Lorſqu'en déchirant un petit morceau de cette peau, qui eſt dans une goutte d'eau, ſur une lame de verre, on en a fait ſortir une grande quantité, les uns ſont réunis en petits monceaux, en différens endroits de cette goutte, & les autres ſont ſeuls. Ces monceaux de grains, obſervés au microſcope, paroiſſent être de la couleur du Polype dont ils ont été tirés. C'eſt ce qui eſt très ſenſible dans les monceaux de grains des Polypes verds, parceque leur couleur verte eſt plus vive & plus frappante que celle du brun rougeâtre des autres Polypes. Cependant on ne laiſſe pas de remarquer diſtinctement, que les monceaux de grains de ces derniers ſont colorés. Mais lorſque les grains des uns & des autres ne ſont pas réunis, ils ſont d'un blanc tranſparent: Par exemple, lorſqu'on

qu'on ſépare ceux qui paroiſſoient colorés quand ils étoient réunis en monceaux, ils paroiſſent tranſparens.

Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce Fait. Les petites parties d'un corps coloré, lorſqu'elles ſont ſéparées, ne paroiſſent pas d'une couleur auſſi vive que lorſqu'elles ſont réunies. J'indiquerai dans la ſuite des Faits qui, peut-être, pourront ſervir à rendre raiſon, pourquoi cela eſt encore plus remarquable dans les grains des Polypes, que dans les grains de beaucoup d'autres matiéres colorées.

Puisque les grains d'un Polype, quand ils ſont réunis, ont la couleur même de ce Polype, il eſt clair que ſa couleur dépend de celle de ſes grains, & que c'eſt dans ces grains qu'elle réſide. Mais j'ai dit ci deſſus*, que les Polypes pouvoient perdre leur couleur & devenir blancs; perdent-ils donc alors leurs grains, & eſt-ce de la perte de ces grains que reſulte celle de la couleur? La queſtion eſt certainement intéreſſante, & l'on ſent que la réponſe doit donner des éclairciſſemens ſur la nature des grains des Polypes. Il n'y avoit, pour éclaircir cette queſtion, qu'à obſerver avec ſoin, ſi les Polypes, qui ont perdu leur couleur en tout ou en partie, ont encore des grains; ou au moins, s'il ne leur en reſte que très peu, s'ils ont diminué proportionnellement à la diminution de leur couleur. C'eſt ce que j'ai fait. J'ai obſervé pluſieurs Polypes blancs, & pour faire des Obſervations plus ſûres, j'en ai en même tems examiné de colorés. J'ai trouvé dans les Polypes blancs des grains en abondance, & beaucoup plus, ce me ſemble, qu'ils n'auroient dû en avoir, ſi la quantité de ces grains avoit

* Pag. 47.

diminué proportionnellement à la couleur. On peut donc conclure de là, que les Polypes ne perdent pas leurs grains à proportion de leur couleur, & par conſéquent, que ce ſont les grains eux-mêmes qui perdent cette couleur, qui ceſſent d'être colorés. Voici un Fait qui achevera de le prouver. C'eſt que de petits monceaux de grains, tirés d'un Polype qui a perdu ſa couleur, ne ſont point colorés, au lieu que tous les monceaux de grains d'un Polype coloré, le ſont eux mêmes toûjours à proportion du degré de couleur qu'avoit le Polype, & de la quantité de grains qui ſont raſſemblés.

Je me ſuis fort étendu ſur le ſujet de ces grains, parceque l'étude que j'en ai faite m'a fourni les ſeules idées que j'aie de l'organiſation des Polypes. Ces idées, quoique confuſes & imparfaites, m'ont paru intéreſſantes, & le paroitront peut-être à d'autres, quand ils auront vu ce que j'ai encore à dire là deſſus. Je ſuis, par exemple, parvenu à découvrir la cauſe de la couleur de ces grains des Polypes, mais je ſuis obligé de renvoier tout ce détail, juſqu'à ce que j'aie expoſé une partie des Faits rélatifs à la nourriture des Polypes & à ſes effets. Quand on viendra à la ſuite des Obſervations qui regardent ces grains, il importera beaucoup qu'on ſe rappelle ce que j'en ai dit juſqu'à préſent.

La ſtructure des bras des Polypes a beaucoup de rapport avec celle de leur corps. Lorſqu'on obſerve ces bras à la loupe ou au microſcope, contractés ou étendus, on trouve que leur ſuperficie extérieure eſt chagrinée, de même que celle du corps des Polypes *.

* PL. V. Fig. 1.

Un

Un bras fort contracté paroît extrémement chagriné, & même beaucoup plus que le corps d'un Polype. Il l'eſt moins, à meſure qu'il s'étend; & lorſqu'il eſt aſſez étendu, il ne paroit pas chagriné par-tout. On remarque même alors dans le bras une différence conſidérable. Ce dont je veux parler, s'apperçoit dans les Polypes de la ſeconde & de la troiſiéme eſpéce, mais ſurtout dans ceux de la troiſiéme, parceque leurs bras s'étendent conſidérablement. Ce ſont ces derniers que je m'attacheraí à décrire ici.

La ſuperficie d'un bras qui, lorſqu'il eſt contracté, paroit très chagrinée par-tout, très garnie de petits grains, change continuellement, à meſure qu'il s'étend, & plus ſenſiblement près de l'extrémité du bras qu'à ſon origine *. * PL. V. Fig. 1.

Je ſuppoſe qu'on obſerve un bras pendant qu'il s'étend. Peu à peu on voit ces grains, dont ſa ſuperficie eſt garnie, & qui, lorſqu'il étoit fort contracté, ſe touchoient, ou à peu près; on voit, dis-je, ces grains laiſſer entr'eux des intervalles *. Quand le bras eſt parvenu à un certain degré d'extenſion, ſa ſuperficie n'eſt plus que parſemée de boutons *, qui, continuant à s'éloigner les uns des autres au moien de l'extenſion du bras, ſe trouvent enfin rangés à la file *, & ſéparés par un fil tranſparent *. Ces boutons ſe forment par la réunion de pluſieurs grains. Ils paroiſſent, au premier coup d'œuil, comme autant de boutons enfilés à un fil, & qui ne ſe touchent pas. Mais lorſqu'on obſerve avec plus d'attention, on s'apperçoit que ce fil ne paſſe point par le milieu de ces boutons *.

* Fig. 2.
* Fig. 3.
* Fig. 4.
* *i i i.*
* Fig. 4.

CES différens états du bras d'un Polype, que je viens de décrire comme ſe ſuccedant à meſure qu'il s'étend, peuvent s'obſerver en même tems, dans le même bras, en différens endroits *. Il ne s'étend pas également par-tout. Son bout s'étend d'ordinaire le premier, & laiſſe voir ces boutons, dont j'ai parlé, bien ſéparés, lorſqu'on ne s'apperçoit preſque pas qu'ils ſe ſoient éloignés près de ſon origine. On peut juger de ce que je dis ici, en parcourant de l'œuil, d'un bout à l'autre, les bras du Polype repréſenté en grand dans la Figure 1. de la Pl. V.; mais ſurtout en faiſant attention aux portions de bras extrémement groſſies au microſcope. La Figure 2. repréſente un bras étendu, tel qu'il eſt près de ſon origine. Les grains ſont peu ſéparés. Ils le ſont davantage dans la Figure 3. C'eſt celle du milieu du bras d'un Polype étendu. Enfin la Figure 4. fait voir ces grains rangez à la file, tels qu'ils ſont ſurtout près de l'extrémité du bras d'un Polype.

* PL. V. Fig. 1.

SOUVENT cette extrémité eſt terminée par un bouton *.

* Fig. 1.

LES eſpéces de poils, deſſinés dant les Fig. 3. & 4. de la Pl. V *. ſe remarquent dans un bras de Polype étendu, lorſqu'on l'expoſe à une forte lentille du microſcope. Ils paroiſſent tranſparens.

* *e, e, e.*

VOICI de quelle maniére je m'y prends, pour obſerver avec des verres les bras des Polypes, & ſurtout de ceux de la troiſiéme eſpéce.

ON peut facilement obſerver un bras, ſoit étendu, ſoit contracté, avec une loupe, à travers les côtés du poudrier dans lequel il eſt. Il ſuffit, pour s'en procurer

rer l'occaſion, d'avoir pluſieurs Polypes dans un verre: il s'en trouve toûjours quelques uns dont les bras ſont aſſez près des côtés du poudrier pour être à portée d'une loupe d'un foier de cinq à ſix lignes. Mais il faut tirer ces bras de l'eau, pour les expoſer au microſcope. A la vérité, il n'y a pas de difficulté quand il ne s'agit que d'obſerver un bras contracté. En mettant le Polype hors de l'eau, ſes bras ſe contractent; on en coupe un, & on le place ſur une lame de verre qui puiſſe s'ajuſter au microſcope. Ce qui demande le plus de ſoins, c'eſt de mettre ſur cette lame un bras étendu. Pour cet effet, je choiſis un Polype qui ſoit fixé contre le côté du poudrier en haut, fort près de la ſuperficie de l'eau. Dans le moment que quelqu'un de ſes bras eſt bien étendu, je prens d'une main une plume, au bout de laquelle eſt un pinceau, & de l'autre main une lame de verre, longue de deux ou trois pouces, & large de cinq ou ſix lignes: je la tiens entre deux doigts par une de ſes extrémités. Alors je vai rencontrer avec la pointe du pinceau, le bout du bras étendu que je veux obſerver. Ce bout s'attache au pinceau, je le mets tout doucement hors de l'eau: le réſte du bras le ſuit. J'ai de cette maniére une partie du bras hors de l'eau. Si elle n'eſt pas aſſez étenduë, je la puis faire étendre en la tirant. Le Polype étant attaché contre le verre, reſte à ſa place lorſqu'on tire ſon bras, & il faut alors que ce bras s'étende, qu'il prête ou qu'il ſe rompe. Il prête, & aſſez pour que, ſi l'on s'y prend délicatement, on puiſſe le faire beaucoup étendre. Il ne reſte plus, pour le mettre ſur la lame de verre,

que

que de la paſſer ſous ce bras, & de les approcher l'un de l'autre, juſqu'à ce qu'ils ſe rencontrent. Alors, en faiſant un petit mouvement de la main qui tient la lame, je fais rompre le bras des deux côtés du bord de cette lame. Il en reſte une partie au bout du pinceau, une autre au Polype, & celle du milieu ſe trouve appliquée contre la lame de verre. On peut l'expoſer à toutes ſortes de microſcopes. Elle ne change point lorſqu'elle eſt ſéche; au moins elle reſte pendant pluſieurs jours, telle qu'on l'a vuë d'abord après l'avoir tirée de l'eau.

Il faut examiner avec attention le bras d'un Polype pour lui trouver de la couleur, ſans quoi l'on jugera qu'il eſt blanc. Mais en l'obſervant à la loupe & au microſcope, ſurtout lorſqu'il eſt contracté, on découvre, depuis ſon origine juſqu'à une certaine diſtance, une teinte de la même couleur qui ſe fait remarquer dans le Polype auquel il appartient.

Puisque les bras des Polypes ſont colorez & ont la même couleur que le corps, nous ſommes conduits naturellement à un autre rapport qui eſt entre ces bras & ce corps. Nous avons vu que la couleur du corps des Polypes conſiſte dans celle des grains dont il eſt garni; il eſt donc bien naturel de penſer que leurs bras ont auſſi de pareils grains, & il ſuffit, pour s'en convaincre, d'en déchirer ſur une lame de verre, & de les obſerver au microſcope. Ce ſont auſſi ces grains qui font paroitre la ſuperficie des bras chagrinée, & ce ſont eux qui, à meſure que les bras s'étendent, forment, en ſe réuniſſant, ces petits boutons dont j'ai parlé. Ces boutons contiennent pluſieurs de ces grains *.

* PL. V. Fig. 2. 3. & 4.

On

On voit très diſtinctement dans un bras étendu, cette matiére dans laquelle ſont les grains, & que j'ai appellée glaireuſe, en parlant du corps des Polypes. Lorſqu'un bras eſt aſſez étendu, pour que ſes boutons ſoient à la file, & à quelque diſtance les uns des autres, ce fil * qui les ſépare n'eſt compoſé que de cette matiére. Il eſt facile de juger de ſa tranſparence, en l'examinant à la loupe ou au microſcope, & pour ſe former une idée de ſa ténacité, il ſuffit de penſer à la réſiſtance que peut faire un bras de Polype ſans ſe rompre. On aura dans la ſuite pluſieurs occaſions de juger de la force de ces bras.

* PL. V. Fig. 4. *i, i, i.*

Ce que je viens de dire des bras des Polypes, peut ſervir à éclaircir un peu l'idée encore fort confuſe que nous avons de la ſtructure de ces Animaux. On comprend bien, que c'eſt auſſi dans cette matiére glaireuſe qu'eſt la force des Polypes, & que doivent être toutes les parties qui ſervent à opérer leur mouvement de contraction, d'extenſion, d'inflexion &c.

Reste encore à ſavoir, par rapport aux bras des Polypes, s'ils ſont percez en dedans, comme le corps. J'oſe l'aſſurer, & je compte d'en donner une preuve évidente. Le Fait, dont cette preuve dépend, ſe préſentera naturellement dans une autre occaſion. Il prouvera en même tems que ce vuide, qui eſt en dedans des bras des Polypes, communique avec leur eſtomac.

Il ne m'a pas été poſſible d'ouvrir des bras, pour voir leur ſuperficie intérieure, comme j'ai vu celle du corps. Il eſt à préſumer qu'il y a un très grand rapport entre ces ſuperficies.

TOUT ce que j'ai dit juſqu'à préſent, doit ſervir à faciliter l'intelligence de ce que je dirai dans la ſuite ſur d'autres articles de l'Hiſtoire des Polypes, par exemple, ſur la maniére dont ils ſe nourriſſent: & les Faits relatifs à cet article là, me fourniront l'occaſion d'approfondir un peu plus le ſujet de leur ſtructure.

J'AI déja fait mention, au commencement de ce Mémoire, du penchant qu'ont les Polypes pour la lumiére *. On a vu qu'ils ſe rendent toûjours ſur le côté du verre le plus éclairé. Je ne me ſuis pas contenté de les faire ſimplement raſſembler ſur ce côté du verre le plus éclairé. J'ai enfermé un grand verre, bien peuplé de Polypes verds, dans un étui de carton, tel que celui d'un manchon, qui avoit à un de ſes côtés une ouverture faite en forme de chevron. Cette ouverture répondoit au milieu du côté du verre qui étoit dans l'étui. Lorſque j'ai expoſé ce verre, de maniére que l'ouverture du carton fut tournée vers le jour, il eſt toûjours arrivé que les Polypes ſont venus ſe ranger ſur le côté du verre qui répondoit à cette ouverture, de ſorte que leur aſſemblage avoit la forme d'un chevron; & étoit vis à vis de celui qui étoit coupé dans le carton. J'ai tourné très ſouvent le verre dans ſon étui, & toûjours j'ai vu, au bout de quelques jours, les Polypes rangés en chevron près de l'ouverture. Pour varier davantage l'Expérience, j'ai diſpoſé le carton de maniére, que le chevron fut tantôt droit & tantôt renverſé; & ſuivant cela, l'aſſemblage des Polypes a eu la forme d'un chevron droit ou renverſé.

* Pag. 11.

ON

On pourroit ſoupçonner, que ce n'eſt pas la lumiére que les Polypes cherchent, mais le plus grand air, & l'air le plus chaud: mais quoique j'aie placé l'ouverture de l'étui, dans lequel étoit le verre, de maniére qu'elle fut plutôt expoſée à l'air le plus froid qu'à l'air le plus chaud, les Polypes ne ſe ſont pas moins raſſemblés vis à vis de cette ouverture. Si c'étoit le plus grand air qu'ils cherchent, ils ſe réuniroient tous à la ſuperficie de l'eau.

Il paroit donc certain, que c'eſt en effet la lumiére qui attire ces Animaux ſur le côté du verre le plus éclairé. Ce n'eſt pas là un Fait nouveau. On connoit depuis longtems différens Animaux terreſtres & aquatiques qui ſe rendent vers la lumiére. Pluſieurs eſpéces de Mouches, & pluſieurs Papillons nocturnes en fourniſſent des exemples continuels dans les ſoirées d'Eté: & peu de gens ignorent, que la lumiére d'une chandelle & d'un flambeau, eſt un piége dont on ſe ſert pour attirer & pour prendre divers Animaux aquatiques. C'eſt, par exemple, de cette maniére qu'on pêche les Polypes marins ſur les côtes de la mer Adriatique. Ils viennent à la lumiére que les pêcheurs font luire le ſoir ſur la ſuperficie de l'eau.

Il y a même différentes eſpéces de petits Inſectes aquatiques, qui paroiſſent avoir un penchant marqué pour la lumiére, & j'en connois entr'autres une qui, par ſa ſtructure, doit même être rangée dans la Claſſe des Polypes.

J'ai été curieux de ſuivre exactement la route des Polypes verds, qui ſe rendoient vis à vis de l'ouverture de l'étui dont je viens de parler. Il eſt ſouvent

arrivé, lorſque j'ai mis le verre dans cet étui, que plus de cent de ces Polypes étoient fixés ſur le fond. La plupart ſont venus monter le long du côté du verre oppoſé à l'ouverture, de là ils ſe ſont rendus à la ſuperficie de l'eau, ils l'ont traverſée, & ſont paſſés enſuite ſur le côté le plus près du jour, qu'ils ont parcouru, juſqu'à ce qu'ils ſe ſoient trouvés vis à vis de l'ouverture. Si les Polypes ſavoient nager, le plus court ſeroit de traverſer l'eau à la nage, pour ſe rendre vis à vis de cette ouverture, mais ne le pouvant pas, ils ſont obligés de parcourir les parois du verre, & la ſuperficie de l'eau. Il eſt à remarquer, qu'en faiſant ce tour qui les conduit à l'endroit le plus éclairé, ils paſſent par des endroits obſcurs, tels que ſont, par exemple, ceux du verre ſur leſquels la lumiére qui paſſe par l'ouverture ne donne pas. Cette remarque m'a fait penſer à examiner, s'ils continuent, même pendant les ténébres, à ſuivre la route qui doit les mener vers l'endroit le plus éclairé. J'ai marqué pendant trois ſoirs de ſuite, entre huit & neuf heures, la place de vingt Polypes verds, qui montoient le long du côté du verre oppoſé au jour, pour ſe rendre, par la ſuperficie de l'eau, ſur le côté le plus éclairé, j'ai mis un petit morceau de papier contre le verre, à côté du bout poſtérieur de chacun de ces Polypes. Afin d'être bien aſſuré, qu'ils n'avoient pû profiter de plus foibles raions de lumiére, j'ai même, pendant la nuit, fermé l'ouverture très exactement, enſorte que, quand même je ne les ſerois pas venu obſerver avant le jour, j'étois ſûr qu'ils n'avoient pu appercevoir aucune lumiére. C'eſt en hyver que j'ai fait cette Expérien-

périence. Je ſuis venu chaque matin conſidérer mes voiageurs, & aucune des trois fois que j'ai marqué leur place, il n'y en a pas eu plus de quatre qui y ſoient reſtés. Quelques-uns avoient fait plus d'un pouce de chemin. Ceux qui le ſoir étoient près de la ſuperficie de l'eau, étoient paſſés à cette ſuperficie, & les autres étoient montés le long du côté ſur lequel ils étoient le ſoir, lorſque je marquai leur place.

J'AI tenu le même verre dont je viens de parler, dans un étui qui n'avoit aucune ouverture: & je n'ai jamais vu que les Polypes ſe raſſemblaſſent nulle part.

COMME les Polypes verds ſont plus vifs que ceux des deux autres eſpéces, il eſt plus facile de faire ſur eux les Expériences dont je viens de parler. Il n'y a cependant rien de plus facile, que de s'aſſurer que les autres cherchent auſſi la lumiére. Il ſuffit pour cela, d'en tenir, pendant quelque tems de ſuite, un certain nombre dans un même verre, ſans le changer de place.

EXPLICATION DES FIGURES DU PREMIER MÉMOIRE.

PLANCHE I.

LA Figure 1, repréſente trois Polypes verds de grandeur naturelle, fixés par leur bout poſtérieur ſur une Plante de Lentille *ef.* Le Polype *ab* eſt vu de côté, ſes bras font un angle obtus avec le corps: *kd* eſt auſſi vu de côté, mais ſes bras font un angle

droit avec le corps: *i g* préſente ſon bout antérieur, & fait voir ſa bouche *i* ouverte.

La Figure 2, montre deux Polypes de la ſeconde eſpéce, attachés par leur bout poſtérieur à un morceau de bois *g h*. Le Polype *a b*, eſt vu de côté, & le Polype *d e*, a le corps recourbé en avant, & fait voir ſa bouche *e* ouverte.

La Figure 3, eſt celle d'un Polype de la troiſiéme eſpéce, de grandeur naturelle, & dont les bras pendent en bas, & ſont fort étendus. J'en ai vu ſouvent qui l'étoient pour le moins autant que ceux qui ſont repréſentés dans cette Figure. *a* la tête du Polype, qui eſt terminée par un mamélon conique; c'eſt la forme que prennent ſouvent les lévres des Polypes: *d* l'endroit où le Polype ſe retrécit: *d b* ſa partie poſtérieure, beaucoup plus étroite que le reſte du corps, & qui paroit être une ſorte de queuë.

La Figure 4, fait voir un Polype de la troiſiéme eſpéce, ſuſpendu à la ſuperficie de l'eau par ſon bout poſtérieur. *b* Le petit creux formé à la ſuperficie de l'eau, & au fond duquel eſt l'extrémité du bout poſtérieur du Polype: *d* l'endroit où le Polype ſe retrécit. Les bras de ce Polype ſont fort inégaux: il a été repréſenté ainſi, afin de faire voir, que ces bras ne s'étendent pas toûjours tous également; c'eſt même ce qui eſt aſſez rare. Il y en a deux dans cette Figure qui ſont contournés près de leur origine.

Dans la Figure 5, on voit un Polype de la ſeconde eſpéce, dont le corps & les bras ſont fort contractés.

La Figure 6, eſt celle d'un Polype à longs bras, dont

dont le corps & les bras ſont auſſi fort contractés. On diſtingue dans cet état la partie poſtérieure du Polype, qui eſt marquée *d b* dans la Figure 3, & qui eſt toûjours plus étroite que le reſte, ſoit que le Polype ſoit étendu, ou contracté.

La Figure 7, repréſente une feuille de Nénufar hors de l'eau, & renverſée. Trois Polypes aſſez grands ſe voient ſur ſa ſuperficie inférieure, tels que ces Animaux paroiſſent quand ils ſont hors de l'eau.

Planche II.

La Figure 1, fait voir un Polype de la troiſiéme eſpéce, dont le corps & les bras forment différentes inflexions. Elles peuvent ſervir d'exemple de quelques unes; il ne ſeroit pas poſſible de les repréſenter toutes. La plupart des Figures qui ſont jointes à cet Ouvrage, en fourniſſent auſſi des exemples.

La Figure 2, montre un Polype de la ſeconde eſpéce, fixé par ſon bout poſtérieur *b*, à un brin de bois, & dont le corps eſt contourné en forme de cornet de poſtillon. On en voit quelquefois qui prennent cette forme, & un nombre conſiderable d'autres qui y ont du rapport. *a* la tête du Polype: ſes lévres ne ſont pas étenduës, & ne forment pas un mamélon; elles ſont réunies & applaties, enſorte qu'on ne remarque ni élevation, ni creux.

La Figure 3, repréſente un Polype de la troiſiéme eſpéce, fixé par ſon bout poſtérieur *b*, ſur le milieu du fond d'un grand poudrier. Son corps *a b* eſt dreſſé ſur ce fond, deux de ſes bras s'élévent ſurtout vers le

le haut du verre, mais leur partie antérieure retombe vers le fond. Les autres bras ſont dirigés de côté & d'autre du corps, & leur extrémité retombe ſur le fond du verre. Cette Figure repréſente un Polype que j'ai vu, & dans lequel ces différentes attitudes étoient réunies dans le même inſtant.

La Figure 4, eſt celle d'un Polype de la troiſiéme eſpéce, qui eſt ſuſpendu à la ſuperficie de l'eau par un de ſes bras en *c*. J'en ai vu qui étoient préciſement dans la ſituation dans laquelle celui-là eſt repréſenté.

Planche III.

Les Figures 1, 2, 3, & 4, repréſentent le même Polype, mais dans les différentes attitudes où il ſe met pour faire un pas ordinaire. La Figure 1, le fait voir fixé ſur un corps quelconque, par ſon bout poſtérieur *b*, ſon corps *a b* eſt dreſſé en partie ſur ce corps. Dans la Figure 2, le Polype *a b* de la Figure 1, a recourbé ſon corps, & fixé en *a* ſon bout antérieur. Après que le bout antérieur a été bien attaché, le bout poſtérieur *b* s'eſt détaché, & enſuite s'eſt rapproché du bout antérieur *a*: c'eſt ce qui ſe voit dans la Figure 3. Le corps du Polype eſt dans cette attitude beaucoup plus récourbé que dans la précédente; ſes deux extrémités ſe touchent preſque. Il arrive ſouvent, que le bout poſtérieur *b* ne ſe rapproche pas autant du bout antérieur *a*, que cela eſt repréſenté dans cette Figure 3. La Figure 4 repréſente le Polype de la Figure 3, dont le bout antérieur *a* s'eſt détaché; après quoi le corps s'eſt redreſſé en partie,

&

& étendu en avant. C'eſt par là que le Polype finit ſon pas. Enſuite il reſte tranquille, plus ou moins étendu, ou bien il en recommence un autre. Il exécute très lentement les mouvemens que nous venons de décrire, & ſouvent il met entre deux des intervalles conſidérables.

Les Figures 5, 6, 7, 8, & 9 repréſentent le même Polype, dans les différentes attitudes qu'il prend pour faire un pas extraordinaire. La Figure 5 fait voir ce Polype, fixé ſur un corps quelconque, par ſon bout poſtérieur *b*, & ſur lequel il eſt dreſſé à peu près perpendiculairement. On voit, dans la Figure 6, le même Polype dont le corps s'eſt recourbé, & le bout antérieur s'eſt fixé en *a*. Il a enſuite détaché ſon bout poſtérieur *b*, & redreſſé ſon corps: c'eſt ce qui eſt repréſenté dans la Figure 7. Le Polype eſt dreſſé ſur le corps ſur lequel il eſt attaché, le bout poſtérieur *b* en haut. Ce bout poſtérieur *b*, ſe rabaiſſe enſuite, & le Polype ſe recourbe dans le ſens contraire à celui qui eſt repréſenté dans la Figure 6. La Figure 8 le repréſente dans cette ſituation; ſon bout poſtérieur *b* eſt de nouveau fixé. Après quoi le bout antérieur *a* ſe détache, le Polype ſe redreſſe, & il ſe trouve tel qu'il eſt repréſenté dans la Figure 9, fixé par ſon bout poſtérieur *b*, & le bout antérieur *a* en haut.

La Figure 10 ſert encore à faire voir un pas extraordinaire de Polype. Le Polype qui eſt repréſenté dans cette Figure eſt fixé en *b*, par ſon bout poſtérieur, contre les parois d'un verre. Le bras *a c* eſt auſſi fixé en *c*, contre ces parois du verre. Dans cette circonſtance le Polype, pour avancer vers *c*, détache ſon

bout poſtérieur de *b*, contracte un peu ſon corps, & attache de nouveau ſon bout poſtérieur en *d*. Un moment après il détache encore ſon bout poſtérieur, & il le fixe en *e*. Il eſt alors avancé de toute la diſtance qu'il y a entre *b* & *e*.

La Figure 11. fait voir un Verre rempli d'eau juſqu'en *l m*. Il renferme les trois Polypes *e f*, *d c*, *a b*. On doit ſuppoſer que le Polype *e f*, étoit d'abord ſimplement fixé en *f*, par ſon bout poſtérieur, & ſon corps & ſes bras étendus dans l'eau. Pour paſſer à la ſuperficie de l'eau, il a avancé ſon bout antérieur *e*, & l'a fait tant ſoit peu ſortir hors de l'eau en *e*. Après que ce bout s'eſt ſéché, le Polype détache ſon bout poſtérieur *f*, il recourbe ſon corps *e f*, rapproche ce bout poſtérieur de la ſuperficie de l'eau, & en fait ſortir l'extrémité : cela étant fait, il peut retirer ſous l'eau ſon bout antérieur, & étendre ſon corps & ſes bras; il ſera ſuſpendu à la ſuperficie de l'eau par le bout poſtérieur, comme le ſont les Polypes *d c* & *a b*: *c* & *b*, les petits creux que forme à la ſuperficie de l'eau l'extrémité poſtérieure de ces Polypes. Les bras *d i* & *d k*, du Polype *d c*, ſont attachés fortement, par leur extrémité, contre les parois du verre en *i*, & en *k*, & les bras *a g* & *a h*, du Polype *a b*, ſont auſſi fortement attachés en *g*, & en *h*, par leur extrémité, contre les parois du verre. J'ai vu dans un même verre deux Polypes ſitués préciſement comme ces deux là. Ils étoient en quelque maniére affourchés ſur leurs bras, comme un Vaiſſeau l'eſt ſur ſes ancres. Ces quatre bras, qui ſervoient de cables & d'ancres, étoient ten-

tendus & en droite ligne, tels que ſont repréſentés dans cette Figure *d i* & *d k*, *a g* & *a h*.

PLANCHE IV.

LES Figures 1, 2 & 3, ſont celles des portions d'un même Polype, coupé transverſalement en trois. On voit par chacune de ces parties le jour, comme on le verroit par un tuiau droit & ouvert à ſes deux extrémités. Puiſque chacune des trois parties d'un Polype coupé transverſalement, eſt percée d'un bout à l'autre, cela prouve que tout le Polype eſt percé d'un bout à l'autre. La Figure 1 fait voir la premiére partie du Polype, appuiée ſur ſon bout antérieur *a*. La bouche, qui eſt à cette extrémité, eſt fort ouverte, & les bras ſont fort contractés. La Figure 2 montre la ſeconde partie; *a* la tranche de la peau du Polype, l'épaiſſeur de cette peau. La Figure 3 fait voir la troiſiéme ou derniére partie du Polype, appuiée ſur ſon bout poſtérieur *b*.

LES Figures 4, 5, & 6, repréſentent trois têtes de Polypes groſſies au microſcope, pour faire voir plus diſtinctement les différentes formes que peuvent prendre les lévres d'un Polype, & qu'elles peuvent donner par là à ſon extrémité antérieure. On a repréſenté dans ces Figures les bras coupés fort près de leur origine, afin qu'ils n'empéchaſſent pas de voir la bouche. Ces reſtes de bras paroiſſent ouverts à leur extrémité antérieure, non que je les aie jamais vu tels, mais ils doivent cependant l'être, l'inſtant après que la ſection a été faite. Ce que je dis ici, eſt fondé ſur

ce que je prouverai ; c'eſt que les bras des Polypes ont la forme d'un tuiau, ſont vuides en dedans. La Figure 4 repréſente une bouche de Polype dont les lévres ſont étenduës en avant, & formées en mamélon conique : c'eſt ce qui eſt repréſenté de grandeur naturelle Pl. I. Fig. 3. *a.* La Figure 5 eſt celle d'une tête de Polype dont les lévres ſont applaties : c'eſt ce qu'on voit de grandeur naturelle Pl. II. Fig. 2. *a.* La Figure 6 montre un Polype dont le bout antérieur eſt ouvert & évaſé : c'eſt ce qu'on voit de grandeur naturelle Pl. I. Fig. 1. *i.* Fig. 2. *e.* Pl. III. Fig. 1.

La Figure 7 repréſente un Polype groſſi au microſcope, qui eſt ouvert ſuivant ſa longueur d'un bout à l'autre : *a*, les parois de ſon eſtomac, la ſuperficie intérieure de ſa peau ; *b*, la tranche de cette peau.

La Figure 8 fait voir un morceau de peau *a*, groſſi au microſcope. On doit ſuppoſer qu'il eſt ſur une lame de verre, dans une goutte d'eau : *b*, *d*, *c*, grains qui ſont ſortis de ce morceau de peau, & qui ſont entrainés par les courans que forme l'eau, quand on panche la lame de verre ; *e*, *f*, amas de grains.

On voit dans la Figure 9 une plume *a*, dont la pointe eſt appuiée ſur un morceau de peau *b*. Cette pointe eſt fenduë comme celle d'une plume dont on ſe ſert pour écrire. La fente eſt ouverte, & l'on voit un fil de matiére glaireuſe *c*, qui la traverſe.

La Figure 10 repréſente un Polype *a*, fort malade ; il perd entiérement ſa forme en mourant, & on n'apperçoit plus, à la place où il étoit, qu'un amas de grains *b*, repréſenté ici en grand.

PLAN-

PLANCHE V.

LA Figure 1 repréſente un Polype de la troiſiéme eſpéce, groſſi au microſcope, & fixé par ſon bout poſtérieur *b*, contre un morceau de bois. Le canal *a b*, qui régne de la bouche, du bout antérieur *a*, juſqu'au bout poſtérieur *b*, ſe voit très diſtinctement. Les Polypes ont rarement un col auſſi marqué que celui qui eſt ici deſſiné. C'eſt ce qu'on a cependant occaſion de voir, quand on en obſerve pluſieurs & ſouvent. Les bras ne ſont pas à beaucoup près auſſi longs qu'ils devroient l'être, pour repréſenter des bras de ſept ou huit pouces de long, groſſis au microſcope à proportion de ce que le corps a été groſſi. Il faut donc ſuppoſer que ces bras ne ſont pas fort allongés. J'ai ſouvent vu des Polypes dont les bras étoient à peu près diſpoſés comme ceux de cette Figure. La gravure repréſente parfaitement la maniére dont la ſuperficie du corps & des bras paroit chagrinée.

LA Figure 2 montre un morceau de bras de Polype, tel qu'il eſt à ſon origine, lorſqu'il eſt étendu en partie, groſſi avec une forte lentille du microſcope. Je n'ai jamais vu le bout *o* ouvert comme il eſt repréſenté dans cette Figure, mais on le verroit ſans doute ouvert, ſi, d'abord après avoir coupé le bras, on pouvoit en obſerver la coupe au microſcope. Le vuide qui eſt en dedans du bras d'un Polype près de ſon origine, eſt repréſenté très exactement dans cette Figure, comme on le voit au microſcope: on peut même l'appercevoir à la loupe. Il eſt plus large au bout, *o*, qu'à l'autre extrémité, parceque *o* marque l'origi-

ne du bras, & qu'en effet le vuide qui eſt en dedans va toûjours en diminuant de ce point là. Les grains qui rendent la peau du Polype chagrinée ſont aſſez près les uns des autres.

Ils ſont un peu plus éloignés dans la Figure 3, qui repréſente une portion de bras, plus étenduë que celle de la Figure 2. *e, e, e,* Eſpéce de poils tranſparens qu'on découvre ſur les bras des Polypes, quand on les obſerve étendus, avec une forte lentille du microſcope. La Figure 4 eſt celle du bout d'un bras fort étendu. Les grains ſont à la file, ils paroiſſent attachés à un fil tranſparent, & laiſſent entr'eux des intervalles *i, i, i: e, e, e,* poils qu'on découvre au microſcope.

SECOND





Digitized by Google

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.



J. v. Sichy sculp. 1763.

Digitized by Google

Pl. 3. Mem. 1.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 7.

Fig. 6.

Fig. 9.

Fig. 8.

Fig. 10.



J. v. Schley sculp. 1743.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 9.



Fig. 8.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 1.

Fig. 4.

Fig. 3.

J. v. Schley sculp. 1743.

Digitized by Google



MÉMOIRES POUR L'HISTOIRE DES POLYPES.

SECOND MÉMOIRE.

De la Nourriture des Polypes, de la Maniére dont ils ſaiſiſſent & avalent leur Proie, de la Cauſe de la Couleur des Polypes, & de ce qu'on a pu découvrir de plus ſur leur Structure. Du Tems, & des Moïens les plus propres pour trouver des Polypes.

ON a vu dans le Mémoire précédent, que ce ſont les Polypes verds que j'ai trouvés les premiers. Je les ai obſervés pendant plus de ſix mois; & quelques ſoins que je me ſois donnés pour découvrir comment ils

ſe nourriſſent, je n'ai pu en venir à bout. Lorſque j'ai eu lieu d'être perſuadé qu'ils étoient des Animaux, & que leur Structure m'a été un peu connuë, j'ai ſoupçonné que cette ouverture qui ſe faiſoit remarquer à leur extrémité antérieure, étoit leur bouche: mais tous ceux que j'avois ſont péris, avant que j'aie pu pouſſer plus loin mes Recherches; & tous les ſoins que j'ai pris pour en trouver d'autres, depuis le mois d'Avril 1741 juſqu'à préſent *, ont été inutiles.

* Janvier 1744.

Je fus, dès le milieu de ce mois-là, dédommagé de la perte de mes Polypes verds. J'avois mis dans pluſieurs verres des Plantes aquatiques, ſur leſquelles je me flattois d'en trouver; mais au lieu de Polypes de cette eſpéce, j'en découvris ſur ces Plantes de rougeatres, qui étoient beaucoup plus grands. Ce ſont ceux de la ſeconde eſpéce *. Je m'aſſurai bientôt qu'ils avoient les propriétés ſinguliéres que j'avois remarquées dans les Polypes verds; & je fis, avec ſuccès, ſur eux des Expériences, que j'aurois à peine ôſé entreprendre ſur ceux de la premiére eſpéce, à cauſe de leur petiteſſe.

* Pl. I. Fig. 2.

Peu de tems après avoir découvert les Polypes de la ſeconde eſpéce, j'appris comment ils ſe nourriſſoient. L'eau, dans laquelle je les trouvai, étoit alors fort peuplée d'une ſorte de *Mille-pieds* * aſſez déliés, & qui n'ont guéres que ſept à huit lignes de longueur. Ils ſont remarquables par une trompe ou dard charnu qu'ils portent en devant de leur tête *, & qu'on ne trouve pas aux Mille-pieds des autres eſpéces. C'eſt pour cela que Mr. de Reaumur leur a donné le nom de *Mille-pieds à dard*. Ils ſe ſoutiennent dans l'eau, & y nagent, au moien des infléxions qu'ils font

* Pl. VI. Fig. 1.

* d.

ſont faire à leur corps avec aſſez de viteſſe. Ils ſe repoſent, & ils rampent, ſur tous les corps qu'ils rencontrent. On en trouve ſouvent en grande quantité ſur les Plantes aquatiques. Celles ſur leſquelles étoient les premiers Polypes de la ſeconde eſpéce que j'ai vus, étoient fort garnies de ces Mille-pieds à dard. Je tirai donc ces Polypes & ces Mille-pieds enſemble de l'eau, & je les mis dans les mêmes verres ſans deſſein.

QUELQUES jours après, je remarquai, en obſervant le bout antérieur d'un Polype *, qu'un Mille-pieds étoit paſſé en partie dans le corps de ce Polype par ce bout antérieur, & que l'autre partie étoit encore en dehors *. Je ne ſçus pas d'abord ce que je devois penſer de ce que je voïois: je n'oſai décider ſi le Polype dévoroit le Mille-pieds, ou ſi le Mille-pieds s'introduiſoit volontairement dans les inteſtins du Polype pour s'en nourrir, ou pour y loger des œufs, ou des petits. Ce ne fut qu'à regret que je m'éloignai, pendant quelques heures, de cet objet qui avoit ſi fort excité ma curioſité. L'impatience de ſavoir ce que ſeroit devenu le Mille-pieds, me ramena dans mon Cabinet le plutôt qu'il me fut poſſible. Je n'apperçus plus, en dehors du bout antérieur du Polype, cette partie du Mille-pieds qui y étoit * lorſque je l'avois quitté; & j'eus lieu de croire qu'elle étoit paſſée dans ſon corps. Ce corps me paroiſſoit renflé, & la tranſparence de ſa peau me permit de voir en dedans un petit amas de matiére, que je n'avois encore jamais vu dans le corps de ces Animaux. Je jugeai que le Mille-pieds étoit mort, & que même le Polype l'avoit en partie digéré. Pour

* PL. VI. Fig. 2. *a.*

* *m.*

* *m.*

m'aſſurer davantage de ce Fait, je mis quelques Polypes à part, dans de petits verres plats, avec des Mille-pieds. Dès la premiére fois que je vins les conſidérer, je trouvai un Polype qui avaloit en effet un Mille-pieds: & comme j'étois déja plus accoutumé à ces objets, je diſtinguai enſuite très clairement le Mille-pieds dans le corps du Polype. Je n'eus donc preſque plus lieu de douter, que les Polypes ne fuſſent des Animaux voraces.

Je me hatai d'autant plus de faire de nouvelles Expériences pour vérifier ce Fait, que j'étois très curieux de ſavoir comment les Polypes ſaiſiſſoient leur proie, & comment ils la portoient à la bouche. Je raſſemblai plus de cent Polypes dans un grand poudrier, je leur donnai le tems de ſe diſperſer ſur les côtés du verre; & dans un moment où la plupart avoient le corps & les bras étendus, j'y jettai une grande quantité de Mille-pieds. Ils ſe répandirent d'abord en nageant dans tout le verre. Je les ſuivois continuellement de l'œuil; j'en vis bientôt pluſieurs qui donnérent dans les bras de différens Polypes. Dès qu'ils les eurent touchés, ils en furent arrêtés, & de maniére, qu'ils ne faiſoient ordinairement que des efforts inutiles pour ſe mettre en liberté. Les uns n'étoient d'abord retenus que par un bras, & les autres l'étoient par pluſieurs. Les Polypes contractoient & recourboient enſuite ces bras, & ſouvent ils enveloppoient encore les Mille-pieds avec d'autres, pour les mieux aſſujettir. Ils les rapprochoient enfin de leur bout antérieur, qui commença à s'ouvrir, & par lequel ces Mille-pieds furent peu à peu introduits dans le corps des Polypes.

Aprés

APRÈS avoir vu ce que je viens de décrire en général, je fus fort éclairci ſur l'uſage de diverſes parties des Polypes, qui m'avoit été inconnu juſqu'alors. J'appris que ces fils déliés qu'ils ont à leur extrémité antérieure, & à qui j'avois déja vu faire les fonctions de pieds, leur ſervoient auſſi de bras. Il n'y avoit plus aucun lieu de douter, que l'ouverture que les Polypes avoient à une de leurs extrémités, & des bords de laquelle ſortoient les bras, ne fût leur bouche, & que le ſac auquel elle communiquoit, & qui régne depuis cette bouche, juſqu'à l'autre extrémité de leur corps, ne fût l'eſtomac. J'avois déja donné le nom de bout antérieur, à celui du corps des Polypes où ſont les bras; parceque j'avois remarqué, que c'étoit ce bout qui avançoit le premier lorsqu'ils marchoient; mais j'eus une nouvelle raiſon de l'appeller ainſi, lorsque je vis que la bouche étoit-là; & je n'héſitai pas même de le regarder comme la tête des Polypes.

APRÈS que j'eus découvert les Polypes de la troiſiéme eſpéce, & que je me fus apperçu de la longueur extraordinaire de leurs bras, je fus auſſi très curieux de leur voir arrêter des proies, & de les leur voir porter à la bouche. Ils s'y prennent, dans le fond, de la même maniére que les Polypes de la ſeconde eſpéce, mais la longueur de leurs bras rend leurs manœuvres encore plus remarquables. Je m'attacherai pour cette raiſon à décrire principalement ces manœuvres des Polypes à longs bras; &, lorsqu'on les connoitra, il ſera très facile de juger de celles des autres.

POUR voir les Polypes de la troiſiéme eſpéce ſaiſir

ſir des proies avec leurs bras fort étendus, il faut les mettre dans un verre qui ait ſept à huit pouces de hauteur. Si les Polypes ſont fixés au haut du verre, leurs bras pendent pour la plupart vers le fond; & c'eſt lorsqu'ils ſont dans cette attitude, qu'il convient ſurtout de leur donner à manger, pour voir leurs manœuvres plus en détail. Il importe donc de ſavoir faire enſorte que les Polypes ſoient placés au haut du verre. On peut, pour cet effet, les faire ſuſpendre à la ſuperficie de l'eau; mais cet expédient n'eſt pas toûjours le plus commode. Les Polypes qu'on nourrit ſont garnis d'ordinaire de petits Poux. Il convient, pour les en délivrer, de paſſer pluſieurs fois de ſuite ſur leur corps le bout d'un pinceau; & ſi les Polypes ne tiennent qu'à la ſuperficie de l'eau, il n'eſt preſque pas poſſible d'éviter de la leur faire quitter. J'ai donc, dans cette circonſtance, préféré un autre expédient. C'eſt de faire attacher des Polypes à une ficelle *, de placer l'endroit * auquel tiennent les Polypes un peu en deſſous de la ſuperficie de l'eau, & de laiſſer pendre les deux bouts * en dehors, de côté & d'autre du verre. On peut paſſer & repaſſer, même aſſez rudement, un pinceau ſur le corps des Polypes qui ſont fixés ſur ces petites cordes, ſans les en faire détacher; & quand on les veut changer d'eau, on n'a qu'à prendre la ficelle par ſes deux bouts, la tirer doucement de l'eau, & la mettre dans un autre verre préparé d'avance pour cela. Pour avoir des Polypes attachés à de la ficelle, il ſuffit d'en mettre en quantité dans un verre garni de Polypes. Il y en aura toûjours quelques-uns qui iront ſe fixer ſur cette ficelle.

* PL. VI. Fig. 3. *f b b k g.*

* *b.*

* *b f & k g.*

QUAND

QUAND les bras d'un Polype ſont bien étendus, je mets dans le verre un Mille-pieds ou un autre Ver, & je l'oblige peu à peu avec le bout d'un pinceau, à aller rencontrer l'extrémité du bras par lequel je veux le faire prendre. Il ſuffit qu'il le touche pour en être arrêté. Auſſitôt qu'un Mille-pieds ſe ſent pris, il ſe débat avec vivacité, & fait de grands efforts pour ſe dégager. Souvent il ſe met à nager *, & il entraine de côté & d'autre le bras par lequel il eſt arrêté *; comme un Poiſſon, pris à l'hameçon, entraine la ligne ſi on lui en laiſſe la liberté. Les prémiéres fois que j'ai été témoin de ce Fait, je m'attendois à tout moment de voir le bras du Polype rompu par les ſecouſſes vives & réïtérées que donnoit le Mille-pieds, & ce dernier emporter avec lui une partie de ce bras. Mais l'expérience m'a appris que, quelque déliés que ſoient les bras des Polypes, ils peuvent réſiſter à des efforts conſidérables. Je n'ai vu aucun Mille-pieds qui ſoit venu à bout de ſe mettre en liberté en les rompant. Il arrive même rarement qu'ils s'en détachent. Les mouvemens que le Mille-pieds ſe donne, obligent enfin le Polype à retirer ſon bras: Il le contracte d'abord en partie, & en le contractant il le diſpoſe ſouvent vers ſon origine en forme de tire-boure *, ce qui contribuë encore à le racourcir. Le Mille-pieds, qui continuë à ſe débattre, s'entortille lui même dans le bras qui le tient *, & ſouvent il rencontre d'autres bras, que les ſecouſſes qu'il donne au Polype forcent à ſe contracter, & à ſe rapprocher de ſa tête; ou que le Polype rapproche de lui-même de ſa proie, pour ſeconder le bras qui

* PL. VI. Fig. 3. *m n.*

* *a c.*

* *o i.*

* *m i n.*

qui l'a priſe. En un moment le Mille-pieds ſe trouve engagé dans la plupart de ces bras, qui, en ſe recourbant & en continuant à ſe contracter, le portent bientôt ſur la bouche, contre laquelle ils l'appuient & l'aſſujettiſſent.

On conçoit facilement, que les Mille-pieds rencontrent plus ſouvent, en nageant, d'autres endroits des bras des Polypes, que leur extrémité. Ces bras ſont, d'un bout à l'autre, pour ces Animaux, ce qu'un gluau eſt pour un Oiſeau. En quelqu'endroit qu'un Mille-pieds les touche, il eſt arrêté; & plus cet endroit eſt près de l'origine des bras, moins le Polype a de peine à rapprocher le Mille-pieds de ſa bouche. La proie s'engage alors encore plus promptement au milieu de tous les bras, en ſe débattant; & ils n'ont beſoin, pour la ramener près du bout antérieur du Polype, que de contracter & de recourber cette partie qui eſt entre leur origine & l'endroit où le Mille-pieds eſt engagé. Il arrive ſouvent, que l'autre partie des bras qui tiennent le Mille-pieds, c'eſt à dire, celle qui eſt entre l'endroit où il eſt engagé & l'extrémité, ſe contracte très peu, & continuë à pendre dans l'eau, tandis que l'autre eſt entortillée autour de la proie qu'elle a ſaiſie & ramenée ſur la bouche.

Jusqu'a préſent je me ſuis ſeulement attaché à repréſenter, comment les bras d'un Polype, qui pendent vers le fond de l'eau, arrêtent un Mille-pieds, & le tirent auprès de la bouche. On ſait que ces bras peuvent non ſeulement ſe ſituer de cette maniére, mais qu'ils peuvent ſe diriger de tous côtés *, & c'eſt

* *Mem.* I. *pag.* 33.

ce

ce qu'on voit très fréquemment dans les bras d'un même Polype *. Lorsqu'un Mille-pieds, & sur-tout un Ver plus grand & plus pesant que celui là, rencontre un bras dont la direction est à peu près parallèle au fond du vase dans lequel il est, il entraine souvent par son poids le bras & le corps même du Polype, & il leur fait prendre une situation perpendiculaire; & le cas se trouve alors précisément le même, que lorsque le Ver rencontre un bras dont la direction est perpendiculaire au fond du vase. D'autres fois le Polype ne donne pas à sa proie le tems d'entrainer en bas le bras qui l'a saisie: il retire d'abord ce bras, il engage l'Animal qu'il tient parmi les autres bras, & le porte à la bouche. Mais c'est ce qui ne s'exécute jamais plus vite, que lorsque la proie est saisie par un bras qui est dirigé vers le haut du vase, & s'éléve au dessus de la tête du Polype. Le poids du Ver, & le mouvement que lui donne le Polype en retirant son bras, le fait tomber plus vite que ce bras ne peut se retirer. Au lieu d'être attiré par ce bras, c'est le Ver qui l'entraine, comme une pierre jettée en l'air entraineroit, en retombant, une corde à laquelle elle seroit attachée. Le Ver se précipite sur d'autres bras, ou sur la tête même du Polype, où il est d'abord à portée d'être dévoré.

* PL. II. Fig. 3.

Il arrive quelquefois, qu'un Polype ne se sert absolument que d'un ou de deux bras, pour porter sa proie à la bouche, & pour la tenir assujettie pendant qu'il l'avale.

Lors même qu'un Polype n'a point de proie à manger, on voit souvent sa bouche ouverte; mais

cette ouverture eſt ordinairement ſi petite, qu'il eſt néceſſaire de ſe ſervir d'une loupe pour la découvrir: Au lieu que, dès que les bras ont ramené une proie ſur cette bouche, elle s'ouvre d'abord davantage, & toûjours à proportion de la groſſeur de l'Animal que le Polype doit faire paſſer dans ſon corps. Ses lévres ſe dilatent peú à peu, & s'ajuſtent préciſément à la figure de la proie.

Tous les Vers, que ſaiſiſſent les Polypes, ne ſe préſentent pas à leur bouche de la même maniére. Elle varie extrémement, ſuivant mille circonſtances, qu'il ſeroit inutile de ſpecifier, & que tous ceux qui obſerveront des Polypes, remarqueront facilement. Il arrive quelquefois que les Vers ſe préſentent par une de leurs extrémités. Dans ce cas, il n'eſt pas néceſſaire que le Polype ouvre conſiderablement la bouche: Auſſi ne l'ouvre-t-il préciſément que pour donner entrée au bout du Ver *. Quand il eſt engagé entre les lévres du Polype, ce dernier les étend en avant, & peu à peu il fait paſſer le Ver dans ſon corps. Il ne paroit pas que les bras contribuent à le faire entrer; & il eſt très vraiſemblable, que ce ſont les lévres du Polype qui l'attirent par une eſpece de ſuction. Ce qui me le perſuade, c'eſt que j'ai ſouvent vu une Mille-pieds, & d'autres Animaux, entre les lévres d'un Polype, ſans qu'aucun bras les touchât: j'ai même vu un Polype, auquel j'avois coupé les bras, avaler un Ver avec autant de facilité que les autres. La proie certainement ne faiſoit pas des efforts pour entrer dans l'eſtomac de ſon ennemi. Il eſt au contraire bien naturel de penſer, que tous les mouvemens

* PL. VI. Fig. 2.

mens qu'elle ſe donnoit, étoient des marques de ſa réſiſtance.

Si le Ver que le Polype avale n'eſt pas plus long que ſon eſtomac, il y reſte ſouvent étendu; mais, s'il eſt plus long, le bout, qui eſt entré le premier, ſe recourbe, & lorſque le Ver eſt entiérement avalé, il ſe trouve replié dans l'eſtomac *. * PL. VI. Fig. 5.

Quand c'eſt, non un bout du Ver, mais le milieu, ou quelqu'autre partie de ſon corps, qui ſe préſente devant la bouche du Polype, il ſaiſit cette partie avec ſes lévres, il les étend à droite & à gauche, & les applique contre le Ver *. Alors ſa bouche a la forme d'un bateau pointu par les deux bouts. Après cela le Polype rapproche un peu les deux pointes de ce bateau. Ce mouvement, & la ſuction, obligent le Ver à ſe replier, il eſt mis en double, & avalé dans cette ſituation *. * Fig. 4. * Fig. 6.

A meſure que l'eſtomac ſe remplit, la peau du Polype prête, la capacité de l'eſtomac s'augmente, le corps devient plus court, plus large, plus ramaſſé *: & lorſqu'il eſt plein, les bras ſont ordinairement aſſez contractés, le Polype eſt pendant, & ſans mouvement, il paroit dans une ſorte d'engourdiſſement, ſa figure eſt fort éloignée de celle qu'il a lorſqu'il eſt étendu *. A meſure que la digeſtion ſe fait, & que le Polype ſe vuide de ce qui ne peut ſervir à le nourrir, ſon corps s'étrécit & s'alonge: il reprend peu à peu ſa premiére forme; &, quand la digeſtion eſt finie, il paroit ordinairement de nouveau étendu, & ſouvent il ſe met bientôt en diſpoſition d'arrêter une proie. * Fig. 9. * PL. VII. Fig. 6.

Je n'entrerai pas à préſent dans un plus grand détail ſur la maniére dont un Polype avale ſa proie, & ſur l'état de ſon corps après qu'il l'a avalée, parceque j'aurai dans peu l'occaſion de citer des Faits qui me raméneront à ce ſujet.

Après avoir vu manger des Mille-pieds aux Polypes, & m'être aſſuré qu'ils étoient pour eux une nourriture très convenable, j'en raſſemblai en abondance, pour avoir de quoi nourrir pluſieurs Polypes que je tenois dans des verres. Les ſoins que je me donnai pour raſſembler ces Mille-pieds, me fournirent l'occaſion de les obſerver dans les foſſés mêmes dont je les tirois. Je vis des endroits de ces foſſés qui en fourmilloient. Ils rampoient ſur les Plantes, & ſur tous les corps qui étoient dans l'eau, ils les quittoient pour ſe mettre à nager, & pour paſſer d'une Plante à l'autre.

Je jugeai facilement alors des expédiens qu'emploient les Polypes pour ſe mettre à portée de leur nourriture; je compris, que c'étoit pour cela qu'ils montoient ſur les Plantes, & qu'ils ſe diſperſoient ſur leurs branches. En effet, dès qu'ils ſont parvenus à une place convenable, il leur ſuffit d'alonger leurs bras, & d'attendre que les Mille-pieds, qui vont & viennent dans l'eau, les rencontrent en nageant. Lorſque ces bras ſont bien étendus, ils occupent un eſpace conſiderable, dans lequel un Mille-pieds ne ſauroit paſſer, ſans courir grand riſque d'être pris. Si un Polype de la troiſiéme eſpéce dirige ſes bras de tous côtés autour de ſa tête, & s'il les étend conſiderablement, il peut donner un pied de diamétre au

pié-

piége qu'il tend pour arrêter ſa proie. Il eſt alors à peu près dans le cas de ces Araignées qui ſe placent au milieu de leur toile, & qui attendent que quelques moucherons donnent dedans. On pourroit auſſi comparer un Polype, à un Pêcheur à la ligne, mais c'eſt un Pêcheur qui ſe ſert en même tems de pluſieurs lignes. Pendant qu'il eſt occupé à retenir une proie avec quelques bras, & à la porter à la bouche *, les autres reſtent ſouvent étendus, & ſaiſiſſent celles qui ſe préſentent *.

* PL. VI. Fig. 3. *m i n.*

* *m c n & p.*

Il arrive fréquemment, que pluſieurs Mille-pieds ſont ſaiſis preſqu'en même tems, par les différens bras d'un même Polype *, & qu'ils en ſont dévorés les uns après les autres.

* Fig. 3.

Ce n'eſt pas ſimplement aux Mille-pieds que les Polypes en veulent lorſqu'ils étendent leurs bras. Ce ſont des piéges qu'ils dreſſent également à la plupart des petits Inſectes qui nagent dans les eaux. Ils arrêtent les premiers qui ſe préſentent.

Dès que j'eus remarqué avec quelle voracité les Polypes mangeoient les Mille-pieds, je jugeai qu'ils n'étoient pas la ſeule proie qui leur fût convenable. Je m'empreſſai d'autant plus à connoitre les Animaux dont ils pouvoient encore ſe nourrir, que j'avois de la peine à me pourvoir d'une quantité ſuffiſante de Mille-pieds, pour procurer une abondante nourriture aux Polypes que j'élevois. D'ailleurs, il falloit beaucoup de tems pour les raſſembler.

J'ouvris des Polypes, que j'avois tirés de l'eau raſſaſiés, & je fis ſortir de leur corps de petits Pucerons qui étoient encore fort réconnoiſſables. Il y en

avoit entr'autres d'une eſpece qui ſe multiplie extrémement, & qu'il eſt ſouvent facile de ſe procurer en grande quantité *. Celui qui eſt repréſenté dans cette Figure, & qui eſt marqué *p*, eſt de grandeur naturelle; mais pour bien juger de leur figure, il faut les obſerver avec une bonne loupe, ou avec une lentille du microſcope *. On les trouve exactement décrits dans Swammerdam *. Ils ſont remarquables par deux bras ramifiés qui s'élévent au deſſus de leur tête *, & qui leur ſervent de nageoires. Ils leur font faire divers mouvemens, trop longs à décrire. La forme de ces bras a déterminé Swammerdam à donner à ces Animaux le nom de Pucerons *branchus*. Ces Pucerons ſautillent continuellement dans l'eau. Ils ſont ordinairement rougeatres.

* Pl. VI. Fig. 3. *p*.

* Fig. 11.

* Pag. 86. &c. Edit. de Leyde 1737.

* *b*, *b*.

Je raſſemblai quelques-uns de ces Pucerons, & je les mis dans un poudrier où il y avoit des Polypes, qui en ſaiſirent bientôt en ma préſence. On diroit que le Puceron connoit d'abord le danger qu'il court lorſqu'il touche le bras d'un Polype. Il ſe débat ſur le champ avec une extrême vivacité. S'il eſt arrêté par le bout d'un bras, ou à peu près, il lui arrive ſouvent de l'entrainer *, comme j'ai dit que font les Mille-pieds. J'ai vu ſouvent des Pucerons qui parvenoient à ſe mettre en liberté. Il m'a paru qu'ils le pouvoient plus facilement que les Mille-pieds. Comme ils ſont fort petits, & ſur-tout que leur Corps n'eſt pas allongé, ils riſquent moins que les Vers de s'engager dans les bras des Polypes en ſe débattant.

* Fig. 3. *p*.

Les Polypes ne ſe ſervent quelquefois que d'un bras pour arrêter un Puceron, & pour le porter à la

la bouche. Ils font alors contourner d'ordinaire ce bras en forme de tire-boure, pour le racourcir. On doit remarquer, qu'ils ne le contournent pas juſqu'à ſon origine, mais qu'il reſte toûjours une portion de quelques lignes, qui eſt aſſez épaiſſe. C'eſt cette portion qui ſe recourbe, pour ramener contre la bouche, l'autre partie du bras qui tient le Puceron.

CET Animal eſt un peu plus long que large *. Lorſqu'il eſt appuié contre le bout antérieur d'un Polype, il paroit, comparé à ſa bouche, telle qu'elle eſt lorſqu'il ne dévore aucune proie, ce que ſeroit, par rapport à celle d'un homme, une poire auſſi groſſe que ſa tête. Un homme viendroit à bout de faire paſſer cette poire dans ſon corps par morceaux, en la briſant avec ſes dents. Mais le Polype n'a aucune dent, aucune partie dure, dans la bouche, qui puiſſe en faire les fonctions. Il ſupplée à cela par l'ouverture prodigieuſe qu'il peut lui donner; il avale le Puceron tout entier, de quelque façon qu'il ſe préſente. Peu après qu'il a été appliqué contre le bout antérieur du Polype, on voit la bouche de ce dernier s'élargir, & former inſenſiblement un creux, une eſpéce de calice, dans lequel la moitié du Puceron eſt logée *. Les lévres du Polype, en continuant à s'étendre, avancent enſuite par deſſus la moitié qui paroit en dehors de la bouche *, peu à peu elles la recouvrent abſolument; & quand elle eſt toute recouverte, ces lévres ſe trouvent entiérement rapprochées, & la bouche du Polype eſt de nouveau fermée. On voit alors diſtinctement le Puceron à travers la peau du Polype: il paroit en deſſous de ſa bouche,

* PL. VI. Fig. 3. *p.* & Fig. 11.

* Fig. 7. *a.*

* *p.*

&

& comme ſon diamètre eſt plus large que celui du corps du Polype, il l'oblige à ſe renfler à l'endroit où ſe trouve le Puceron. Ce premier Puceron eſt ſouvent ſuivi d'un autre, qui le force à entrer plus avant dans l'eſtomac. Un troiſiéme pouſſe à ſon tour le ſecond; &, de cette maniére, ſuivant la taille du Polype, on en voit paſſer dans ſon corps quatre & cinq à la file, qui ſe pouſſent les uns les autres. Quand ils ſont entrés, le corps du Polype eſt à peu près également épais par-tout; il a par-tout la largeur des Pucerons. Ce qui occaſionne quelque irrégularité, c'eſt que tous les Pucerons ne paſſant pas dans l'eſtomac préciſément dans la même ſituation, les uns y entrant ſuivant leur largeur, & d'autres ſuivant leur longueur, l'épaiſſeur du Polype varie, à proportion de la différence qu'il y a entre la largeur & la longueur des Pucerons. D'ailleurs, les deux extrémités du corps de ces petits Animaux ſe terminent en pointe *, & ſe font remarquer ſous la peau des Polypes: elles l'obligent à ſe ranger en pointe par deſſus elles, elles la pouſſent en avant. Cela vient de ce que tout l'extérieur du Puceron étant écailleux, la peau des Polypes, qui eſt partout extrémement molaſſe & flexible, eſt obligée de céder à la dureté des extrémités des Pucerons.

* PL. VI. Fig. II. *c*, *c*.

Le Polype, après avoir avalé quatre ou cinq Pucerons, ne s'arrête pas-là. S'il en a encore entre ſes bras, il continuë à en avaler; & ceux qui ſont déja dans ſon corps devant faire de la place aux autres, ne peuvent plus y reſter à la file. Les Pucerons ſont preſſés de nouveau, & forcent les parois de l'eſto-

tomac à s'étendre en large: ſa capacité augmente, & deux Pucerons peuvent ſouvent être placés, dans ſa largeur, à côté l'un de l'autre *; mais ils le ſont fort irréguliérement. Si le Polype eſt bien affamé, & s'il eſt d'une bonne taille, il peut avaler facilement une douzaine de Pucerons; &, lorſqu'ils ſont tous dans ſon corps, il eſt abſolument plein, depuis la bouche juſqu'à l'extrémité poſtérieure, ſi c'en eſt un de la ſeconde eſpéce*; & ſi c'en eſt un de la troiſiéme †, la partie du corps qui ſe rétrécit * & qui forme la queuë, reſte ordinairement vuide & rétrécie, mais quelquefois il arrive que cette queuë eſt forcée à s'élargir, & à recevoir quelques Pucerons. Quand le Polype n'a pas avalé autant de Pucerons qu'il en peut entrer dans ſon eſtomac, ſon corps eſt ſouvent fort mince près de la tête, & forme-là un col très remarquable *.

* PL. VI. Fig. 8.

* Fig. 8.
† Fig. 9.
* *b d.*

* Fig. 9. & 10. *c.*

Comme j'ai eu, pendant plus de deux ans, un nombre conſiderable de Polypes à nourrir, j'ai été obligé de me fournir avec ſoin des alimens qui leur étoient propres. Les Pucerons branchus m'ont été d'une très grande reſſource pendant quelques mois de l'année: je crois même pouvoir aſſurer, qu'il n'y a point d'Inſectes qui fourniſſent aux Polypes une plus abondante pature que ces Pucerons. Jamais on n'en voit tant que dans les jours chauds, & pendant leſquels le tems eſt calme. Des eſpaces conſiderables des foſſés en ſont alors teints d'une couleur rougeatre. J'en ai ſouvent vu des bandes, larges d'environ un pied, & longues de plus de cinquante. Les Pucerons étoient ſi ſerrés, qu'on ne voioit abſolument autre choſe. Il

m'a paru qu'ils étoient ſurtout raſſemblés dans les endroits où le Soleil donnoit. Peut-être que ſa lumiére a quelque attrait pour eux. C'eſt au moins ce qui eſt certain à l'égard de celle d'une chandéle. Voici l'Expérience qui me l'a perſuadé.

J'OBSERVOIS, à la lumiére d'une bougie, des Polypes auxquels j'avois donné pluſieurs Pucerons pendant la journée. Il en étoit reſté le ſoir une partie dans le verre que les Polypes n'avoient pu manger. Je m'apperçus qu'ils étoient pour la plupart réünis du côté de la bougie. Je la changeai de place; ils en changérent auſſi, & ſe rendirent du côté où je l'avois miſe. Après l'avoir changée pluſieurs fois de place, & avoir vu que les Pucerons ne manquoient jamais de s'en approcher, je la fis tourner, à la vérité un peu lentement, au tour du verre, ſans l'arrêter: ils la ſuivirent, & firent de cette maniére pluſieurs fois le tour du verre. J'ai eu pluſieurs occaſions de répéter cette Expérience.

SI l'on jette tout d'un coup un grand nombre de Pucerons dans un verre où ſont des Polypes affamés, leurs bras en ſont bientôt garnis. J'en ai vu qui avoient la longueur de quelques pouces, & qui étoient ſi garnis de Pucerons, d'une extrémité à l'autre, qu'ils en étoient entiérement couverts. Le mouvement de tous ces petits Animaux, qui font des efforts pour s'échaper, oblige les bras à ſe contracter. On ne voit bientôt qu'un amas confus de Pucerons, qui ſont raſſemblés près du bout antérieur du Polype *. Il les avale alors les uns après les autres, juſqu'à ce qu'il ſoit entiérement plein. S'il y en a après cela qui ſoient encore attachés à ſes bras, ils y reſtent ſou-

* PL. VII. Fig. 1. a.

ſouvent pendant du tems, quelques fois ils meurent, & d'autres fois ils s'échappent.

Si un Polype n'a pas d'abord pris aſſez de Pucerons pour ſe raſſaſier, ſes bras reſtent en partie étendus, & ſont encore prêts à ſaiſir une proie. Ils arrêtent, par exemple, les Pucerons qui ſe préſentent, ils les portent à la bouche, & le Polype les avale. De cette maniére, un Polype, placé dans un endroit où il eſt toûjours à même de ſaiſir une proie, ne ſera jamais à jeun. Bien entendu qu'il ne ſoit point dégouté: car l'on en voit ſouvent qui ceſſent de manger pendant quelque tems, & qui refuſent d'arrêter les proies qui ſe préſentent, quoiqu'ils aient l'eſtomac vuide. Quelques fois ce dégout eſt le commencement d'une maladie mortelle; & d'autres fois il eſt ſuivi d'un retour d'appetit.

Tant que j'ai pu me procurer abondamment des Pucerons pour nourrir mes Polypes, je les ai préférés à toute autre nourriture. Il n'y en a point qui ſoit plus facile à raſſembler. Je me ſers pour cela d'une eſpéce de cerceau de huit à dix pouces de diamètre, fait d'un cercle de fil d'archal, auquel eſt attachée une poche de toile claire. Je l'ajuſte au bout d'un baton, je le mets ſous l'eau, dans un endroit bien rempli de Pucerons, je le tiens un peu incliné, & je le promène dans l'eau, partout où je puis atteindre. Les Pucerons ſont raſſemblés dans le cerceau, je les tire enſuite de l'eau, & je les mets dans une petite quantité d'eau, qui en devient toute fourmillante; je vais enfin mettre, dans chacun de mes poudriers, quelques goutes de cette eau, & avec elles des centaines de Puce-

rons. Tout cela eſt fait en moins d'un quart d'heure.

DEPUIS le commencement de Juin 1741, juſqu'à la fin du mois de Septembre ſuivant, j'ai toûjours eu autant de Pucerons que j'en avois beſoin pour nourrir un grand nombre de Polypes ſur leſquels je faiſois des Expériences. Lorſque les Pucerons commencérent à me manquer, je fus d'abord en peine pour trouver de quoi nourrir mes Polypes. J'allois pluſieurs fois par jour au bord de cette eau qui m'avoit fourni des Pucerons pendant ſi longtems; je me baiſſois tout près de ſa ſuperficie, pour tacher d'en découvrir de jeunes, ſur leſquels je puſſe fonder mes eſpérances pour l'avenir. Mes recherches furent inutiles: mais en cherchant des Pucerons, je découvris, au fond de l'eau, des endroits tout heriſſés de Vers, dont un bout étoit en terre, & dont le reſte du corps ſortoit hors de terre, & faiſoit des ondulations continuelles*. Dès que je vis ces Vers, je me flattai qu'ils pourroient ſervir de nourriture à mes Polypes, & ſuppléer aux Pucerons, qui me manquoient, & aux Mille-pieds, que je ne trouvois alors qu'en très petite quantité, & avec beaucoup de peine. Je pris quelques-uns de ces Vers, & je les donnai à des Polypes, qui les mangérent.

* PL. VII. Fig. 2.

JE cherchai donc le moien de m'en procurer autant que j'en aurois beſoin. Il y en avoit en grande abondance au fond du foſſé dont j'ai parlé; mais la difficulté fut de les en tirer. Dès que je voulois les prendre, ils ſe retiroient entiérement ſous terre. Je pris le parti de mettre de cette terre dans des plats, & d'y chercher ces Vers: mais l'expédient étoit long & ennuiant. J'en trouvai enfin un fort court & fort commode.

J'AT-

J'ATTACHE au bout d'un baton, un cercle de fil de fer de deux à trois pouces de diamétre, je le mets dans l'eau, & je fais entrer un ſegment de ce cercle ſous terre, juſqu'à la profondeur d'un ou de deux pouces; je lui fais parcourir un petit eſpace, en le tenant toûjours dans la même ſituation. Le fil de fer rencontre les Vers ſous terre, il les entraine avec lui, & lorſqu'on le retire, il s'en trouve garni. Je trempe enſuite ce cercle de fil de fer dans un verre plein d'eau, je le ſecoüe, & tous les Vers tombent au fond. Il faut que le fond de l'eau, où l'on veut pêcher ces Vers avec l'inſtrument dont il s'agit, ſoit bien net. Quand il eſt couvert de feuilles & d'herbes, elles ſe mettent autour du fil de fer, & il n'a alors que peu ou point de priſe ſur les Vers; enſorte que l'on n'en tire qu'en petite quantité, & ſouvent point du tout, quoiqu'il y en ait beaucoup dans l'endroit où l'on pêche. Quelques coups de rateau ſuffiſent pour nettoier le terrein dans certains endroits; mais il y en a d'autres, d'où l'on ne pourroit enlever tout ce qui ſe met autour du fil de fer, & qui l'empêche d'avoir priſe ſur les Vers, ſans emporter ces Vers mêmes. Il eſt plus convenable de jetter alors ſur ce fond ſale quelques pouces de ſable. Les Vers, qui doivent être près de la ſuperficie de la terre, pour en faire ſortir une partie de leur corps, quittent la bouë, & paſſent dans ce ſable, ils ſe rendent près de cette nouvelle ſuperficie. J'y en ai pris en très grande quantité vingt quatre heures après avoir préparé le fond de l'eau comme je viens de dire.

ON doit, pour les donner aux Polypes, avoir ſoin

de les faire tomber ſur leurs bras. Ils ne peuvent pas aller ſe faire prendre en nageant, comme le font les Pucerons & les Mille-pieds. Auſſitôt qu'on les met dans l'eau, ils tombent au fond.

Il ſeroit inutile de décrire au long, comment les Polypes ſaiſiſſent, portent à leur bouche, & avalent les Vers dont il s'agit. Ils emploient pour cela les mêmes expédiens qu'ils mettent en uſage à l'égard des Mille-pieds & des Pucerons. Je ne ferai donc mention que de quelques Faits particuliers.

On peut donner à manger à un Polype, un Ver beaucoup plus long que lui, & pour le moins auſſi épais qu'eſt le corps de ce Polype lorſqu'il eſt étendu. Il trouve moien de loger ce Ver dans ſon eſtomac, à force d'étendre la peau de ſon corps, & de faire faire au Ver pluſieurs plis & replis. Ce Ver n'a rien de dur, rien qui réſiſte à la peau du Polype: il céde facilement, & ſe range dans l'eſtomac *. Avant même que d'y être entré, il eſt ſouvent déja roulé & replié en un paquet. Il prend cette forme en ſe débattant entre les bras du Polype; & ce dernier y contribuë auſſi, en tâchant de l'aſſujettir entre ſes bras. La bouche du Polype doit s'ouvrir extrémement, pour donner entrée à un Ver diſpoſé de cette maniére. On voit ſouvent un Ver, mis en trois ou quatre doubles, paſſer dans l'eſtomac d'un Polype. Quand il eſt ſimplement en double, & qu'il eſt recourbé à peu près dans le milieu, on remarque clairement les deux extrémités du Ver, qui pendent encore en dehors de la bouche, tandis que le milieu entre dans le corps *.

* PL. VI. Fig. 5.

* Fig. 6.

Ces Vers ont été une des plus grandes reſſources que

que j'aie euës pour nourrir les Polypes, & ſurtout pendant l'Hyver. J'en ai raſſemblé abondamment au mois d'Octobre, je les ai mis dans de grands vaſes pleins d'eau, avec trois ou quatre pouces de terre au fond. A meſure que j'en ai eu beſoin, j'en ai pêché dans ces vaſes, de la même maniére que je les pêche dans les foſſés. On comprend aiſément que, pour découvrir de ces Vers dont je parle, il faut ſonder le terrein qui eſt au fond des eaux, avec le fil de fer qui ſert à les pêcher. On retire ſouvent de deſſous terre, avec cet inſtrument, un Ver rouge, aſſez épais, & long de cinq à ſix lignes *. Il eſt du même genre que celui qui eſt décrit dans le premier Mémoire du Tome cinquiéme, pag. 29 &c. des Mémoires de Mr. de Reaumur ſur les Inſectes.

* PL. VII. Fig. 8. *c d.*

Les Polypes peuvent auſſi ſe nourrir de ce Ver, mais il eſt plus difficile à avaler & à digérer que ceux dont il a été queſtion ci-deſſus. Comme il eſt roide & fort, il n'eſt pas facile aux Polypes de l'obliger à ſe replier, & à ſe ranger dans leur eſtomac. Lorſqu'il y eſt introduit en double, il y occupe une très grande place, c'eſt-à-dire, qu'il force la peau des Polypes à s'étendre extrémement. Celle de ce Ver eſt un peu écailleuſe; & c'eſt ce qui le rend plus difficile à être digéré. Il faut que les Polypes aient bien faim pour en manger. Cet aliment ne leur eſt pas convenable en Hyver.

Je leur ai vu manger le Ver de tipule tranſparent, dont parle Mr. de Reaumur, à la page 40 & ſuivantes du Mémoire que je viens de citer.

Aiant pris au mois de Juin 1743 une grande quan-

quantité de petits Poiſſons ; longs d'environ quatre lignes, le premier uſage que j'en fis, fut d'eſſaier ſi les Polypes les mangeroient.

J'EN mis pluſieurs dans des verres où il y avoit beaucoup de Polypes. L'Expérience m'apprit bientôt, ce que j'avois d'abord ſoupçonné: c'eſt que la vivacité & la force de ces petits Poiſſons les mettroit en état de faire une grande réſiſtance, & je n'ôſai même preſque me flatter que les Polypes viendroient à bout d'en arrêter. Les Gardons, c'eſt l'eſpéce de Poiſſons dont je parle, les Gardons, dis-je, rencontrérent bientôt les bras des Polypes en nageant, & ce fut alors que commencérent des combats, qui ne finirent pas tous de la même maniére. Lorſque le Poiſſon ne rencontroit qu'un ſeul bras de Polype, il arrivoit ordinairement qu'il ſe dégageoit par une ſecouſſe vive ; & même aſſez fréquemment il rompoit le bras qui le tenoit ſaiſi, & en emportoit une partie avec ſoi. Le combat finiſſoit moins heureuſement pour le Poiſſon, lorſqu'il étoit d'abord arrêté par pluſieurs bras. Les efforts qu'il faiſoit pour ſe mettre en liberté, étoient la plupart du tems inutiles, & ne contribuoient même qu'à l'enlacer davantage dans les bras de ſon ennemi. Il étoit facile de remarquer, que le Polype en faiſoit de très grands pour retenir le Poiſſon. Les bras, qui l'envelopoient de tous côtés, étoient fort renflés, ce qui n'arrive guéres que lorſqu'ils font de grands efforts : ils étoient fortement appliqués autour du Poiſſon : en un mot, ce que dit Ovide du Polype marin, peut parfaitement s'appliquer au Polype d'eau douce dont il s'agit ici. On di-

diroit que c'eſt de ce dernier que ce Poëte parle, quand il dit: *

* Metam. liv. 4.

Utque ſub æquoribus deprenſum Polypus hoſtem
Continet, ex omni dimiſſis parte flagellis.

QUAND je vis un Polype qui avoit arrêté un Poiſſon, & qui l'approchoit de ſa bouche, je comptai bien qu'il feroit tout ſon poſſible pour l'avaler. Il s'agiſſoit de faire paſſer dans ſon corps un Poiſſon long de quatre lignes, aſſez épais, & qui ne pouvoit pas ſe replier pour ſe ranger dans l'eſtomac. Le Polype qui entreprenoit de l'avaler, ayant été obligé de ſe contracter, par les ſecouſſes que le Poiſſon lui avoit données en ſe débattant, n'avoit alors guères plus de deux à trois lignes de longueur. Malgré tout cela, la plûpart des Polypes qui ont arrêté un Gardon, ſont venus à bout de l'avaler. Quand un Polype à longs bras en avaloit un, cette portion étroite de ſon eſtomac, qui forme la queuë, étoit obligée de s'ouvrir, & recevoit une partie de la proie. Un Polype, qui avoit avalé un Poiſſon, étoit difficile à reconnoître. Je ſuppoſe, par exemple, qu'il ait avalé la queuë la première, on voioit alors les bras contractés à l'extrémité de la tête du Poiſſon *; c'eſt-là ce qui paroiſſoit le mieux. La peau du Polype * étoit ſi parfaitement tendue & appliquée ſur celle du Gardon, qu'on le voioit diſtinctement à travers *, & que ſouvent, ſi on n'avoit pas été au fait, on auroit pu croire qu'on ne voioit qu'un Poiſſon, qui avoit à l'extrémité antérieure des barbes de quelques lignes de longueur.

* PL. VII. Fig. 3. *a c, a c, a c.*

* *a b.*

* Fig. 3.

Ce Poiſſon, logé tout entier dans le corps d'un Polype, dont la peau étoit alors ſi mince, y a cependant été digéré. Il n'y eſt pas reſté un quart d'heure en vie: il a été ſucé, & a été enſuite rendu par la bouche du Polype, reconnoiſſable à la vérité, mais cependant aſſez défiguré. C'eſt ce que j'ai vu un grand nombre de fois.

Les Polypes mangent la plûpart des petits Inſectes qu'on trouve dans les eaux douces. Ils ſe nourriſſent très bien de Vers, & de Nymphes de Couſins, & d'autres petites Mouches. Enfin on peut leur donner même de beaucoup plus grands Animaux, en les coupant par petits morceaux. Je leur ai fait manger de cette manière des Limaces, & d'autres Inſectes aquatiques encore plus grands; je leur ai donné des Vers de terre, des entrailles de Poiſſon d'eau douce. Il y a plus, j'en ai nourri pendant du tems avec de la viande de boucherie, du bœuf, du mouton & du veau. J'ai vu ſenſiblement qu'ils en tiroient de la nourriture, je les ai vus croître pendant ce tems-là. Il eſt pourtant vrai qu'ils ne tirent pas de cette viande un ſuc nourricier, auſſi abondant que des Inſectes aquatiques qui leur conviennent le plus. On doit, pour la leur faire manger, la couper en très petits morceaux, parce qu'elle s'enfle dès qu'elle eſt dans l'eau.

Le plus grand ſoin que demandent les Polypes, eſt celui de leur trouver de la nourriture, & d'en avoir en toute ſaiſon de l'année. Dès qu'on n'eſt pas éloigné de quelques mares, ou de quelques foſſés, on peut facilement en Eté ſe procurer quelques-uns des Animaux dont j'ai parlé juſqu'à préſent; mais

la

la difficulté eſt plus grande en Hyver. Ma principale reſſource a été dans ces Vers qui ſe tiennent ordinairement ſous terre au fond de l'eau, & que j'ai conſervés dans des vaſes *. Dans la crainte où j'étois qu'ils ne me manquaſſent, j'ai cherché d'autres expédiens pour nourrir mes Polypes. J'ai mis au fond d'un vaſe de la terre tirée d'un foſſé, & j'ai compté que j'y mettrois avec cette terre un bon nombre de petits Inſectes, ou au moins les œufs dont ils devoient ſortir; c'eſt ce qui m'a très bien réuſſi. Dès la fin de Février 1742, mon vaſe a été peuplé de diverſes eſpèces de petits Animaux; mais il s'eſt ſurtout peu-à-peu rempli d'une ſorte de petit Inſecte qui eſt renfermé dans une coquille à deux battans. Il fait ſortir de cette coquille, lorſqu'il l'entrouvre, de petits pieds ou bras qu'il remue avec une grande viteſſe; & c'eſt par le moïen de ce mouvement qu'il nage. Ces Animaux ſe repoſent ſur tous les corps qu'ils rencontrent. Ils ſont à peu près de la grandeur d'un grain de ſable. Les Polypes, que j'ai mis dans ce vaſe, & dont je n'ai pris aucun ſoin, ſe ſont nourris de ces Inſectes, & ont multiplié. J'en ai, qui ſont depuis huit mois dans un verre dont le fond eſt garni de terre, priſe dans un foſſé. Ils s'y nourriſſent & y multiplient.

* PL. VII. Fig. 2.

En préparant en Eté des baquets, garnis au fond de terre tirée des foſſés, on peut en faire un ſéjour très convenable pour les Polypes. Outre les Inſectes dont les œufs ſe trouvent dans la terre des foſſés, on en voit bientôt dans l'eau de ces baquets, s'ils ſont expoſés à l'air, qui viennent des œufs qui ont été dé-

poſés ſur l'eau, par des Tipules & par des Couſins. On peut donc emploier avec ſuccès ces vaſes & ces baquets, & en s'épargnant la peine de nourrir les Polypes qu'on y conſerve, on ſe met à couvert d'une diſette qui peut déranger des Obſervations intéreſſantes.

Il eſt ſouvent convenable de ne point changer l'eau de ces vaſes dans leſquels on tient des Inſectes; mais quand on ne la change pas, & quand on ne nettoie pas le vaſe, il ſe remplit ſouvent d'une herbe fine comme des cheveux, dans laquelle les Polypes s'embarraſſent, ou bien il croît contre ſes parois de petites Plantes preſque imperceptibles, qui les obſcurciſſent ſi le vaſe eſt de verre, & qui empêchent qu'on ne puiſſe voir diſtinctement dedans. Il y a un moïen commode de prévenir ces inconvéniens. C'eſt de mettre dans chaque vaſe quelques Limaçons aquatiques, plus ou moins, à proportion de ſa grandeur. Ils mangeront ces Plantes, à meſure qu'elles pouſſeront. L'eau & les parois du vaſe reſteront alors nettes.

J'ai dit ci-deſſus qu'il ſuffiſoit qu'un Inſecte touchât le bras d'un Polype, pour qu'il en fût arrêté; c'eſt ce que j'ai eu occaſion d'obſerver très ſouvent. J'ai même vu un Mille-pied ne toucher le bras d'un Polype qu'avec un ſeul de ſes pieds, je l'ai vu ſe débattre vivement pendant pluſieurs ſecondes, ſans qu'il pût ſe détacher.

Quelle que ſoit la cauſe de ce Fait, elle n'eſt point néceſſaire, & dépend de la volonté du Polype. Il n'y a, pour ſe le perſuader, qu'à faire tomber ſur les bras des Polypes, lorſqu'ils ſont fort raſſaſiés, des

des Animaux qu'ils aiment beaucoup. Il arrive alors ſouvent qu'ils les laiſſent gliſſer ſur leurs bras ſans les retenir; au lieu que s'ils avoient eu faim, ils les auroient arrêtés au premier attouchement.

Lorsqu'on donne à un Polype affamé, des choſes qui ne peuvent lui ſervir d'aliment, quelquefois il les retient d'abord avec ſes bras, & puis il les laiſſe tomber; d'autresfois il ne les arrête point du tout.

S'il en étoit préciſément des bras des Polypes comme des gluaux, s'ils étoient enduits d'une colle qui ſervit à retenir les corps qu'ils touchent, & dont ils ne fuſſent pas les maîtres de ſuſpendre l'effet, ils devroient arrêter toujours également ceux qu'ils arrêtent quelquefois; & lorſque ces bras ſe touchent, ils devroient s'attacher très fortement. Il eſt cependant très facile d'obſerver qu'ils ſe touchent, & même qu'ils ſe replient les uns ſur les autres, ſans ſe coller enſemble. Je me ſuis plu quelquefois à ſaiſir le moment que tous les bras d'un Polype de la troiſiéme eſpèce étoient fort étendus, pour les embarraſſer les uns parmi les autres, & les réduire en un paquet, plus difficile à démêler qu'un écheveau de fil fort mêlé. Je croiois d'abord que le Polype ne viendroit jamais à bout de dénoüer ce Nœud Gordien, & que je ſerois obligé de le couper pour rendre la liberté à ſes bras; mais il en eſt toujours venu à bout. Quelques Polypes ont eu beſoin de deux ou trois jours pour les débarraſſer.

Il paroît donc, par tout ce que je viens de dire, que les Polypes ſont les maîtres de faire agir, ou de ne pas faire agir ce qui ſert à arrêter les Ani-

maux qui touchent leurs bras. C'eſt tout ce que je puis dire de précis ſur ce ſujet. Peut-être que la cauſe qui produit cet effet, eſt la méme que celle d'où réſulte l'adhéſion du corps & des bras des Polypes aux corps ſur leſquels ils ſe fixent.

On ſeroit d'abord porté à comparer ces boutons, qui ſe font ſenſiblement remarquer ſur les bras des Polypes, ſur-tout lorſqu'ils ſont étendus *, à ces boutons ou mamelons creux, dont ſont garnis les pieds des Polypes marins & les bras de la Séche. On peut en voir la deſcription dans les Auteurs qui parlent de ces Animaux, & en particulier celle des bras de la Séche dans Swammerdam *. Il eſt clair que ces parties ſervent à les attacher contre les corps qu'ils touchent, & il eſt très apparent, comme l'a penſé Swammerdam, que cela ſe fait par une eſpèce de ſuction. J'ai appliqué contre ma main le bras d'une Séche expirante, & j'ai éprouvé que ſes mamelons ſe cramponoient encore avec force ſur ma peau.

* PL. V. Fig. 2, 3, & 4.

* Bibl. Nat. pag. 877. & ſuiv.

La ſtructure des boutons des bras des Polypes d'eau douce ne m'a paru avoir aucun rapport avec celle des mamelons de la Séche, & du Polype de mer. J'ai fait voir dans le premier Mémoire que ces boutons étoient formés par la réunion de pluſieurs de ces grains, dont les bras & le corps des Polypes ſont remplis. Il ſe peut que le Polype, en appliquant fortement les bords de la partie du bras avec laquelle il touche l'Animal qu'il tient, & en retirant le milieu de cette partie, opére une eſpèce de ſuction qui ſert à retenir cet Animal. J'ai ſouvent remarqué que quand un Inſecte faiſoit beaucoup de réſiſtance, l'endroit

droit du bras du Polype qui le tenoit ſaiſi, ſe renfloit conſidérablement.

Les Animaux, qui peuvent ſervir de nourriture aux Polypes, ne ſont pas également répandus dans les foſſés. Les Polypes ſavent-ils choiſir les endroits qui en ſont les plus peuplés, ou ne dirigent-ils leurs pas de côté & d'autre que fortuitement? Tout ce que je puis dire là-deſſus, c'eſt que le penchant, qui les porte vers les endroits les plus éclairés, peut les conduire dans des endroits fort peuplés d'Animaux propres à les nourrir. Au moins eſt-il prouvé, par les Faits que j'ai rapportés ci-deſſus, que les Pucerons branchus, qui ſont une des principales nourritures des Polypes, cherchent la lumière & ſe rendent auſſi dans les endroits les plus éclairés.

Mais lorſque les Polypes ſont fixés dans quelque endroit, n'ont-ils d'autre reſſource que d'étendre leurs bras, & d'attendre qu'un Animal vienne les rencontrer; ou bien ont-ils un ſentiment propre à leur faire appercevoir leur proie, & lorſqu'ils l'ont apperçue, dirigent-ils leurs bras où elle eſt, pour s'en ſaiſir? J'ai fait des Expériences qui pourront peut-être donner quelque Eclairciſſement ſur ces Queſtions.

Il m'eſt arrivé pluſieurs fois qu'en donnant à manger à un Polype qui n'étoit éloigné d'un autre que de quelques lignes, ce dernier, ſans que la proie eût le moins du monde touché ſes bras, qui étoient dirigés d'un autre côté, ce dernier, dis-je, a d'abord recourbé ſon corps, & a ramené quelques bras vers cette proie.

Je voulois un jour donner à manger à un jeune

Po-

Polype qui étoit encore attaché à ſa mere. Je ſaiſis le moment que leurs têtes & leurs bras étoient tournés vers des endroits différens, je fis tomber alors un petit Ver ſur les bras du jeune Polype. Dans l'inſtant la mere tourna la tête, & ſe mit en devoir de ſaiſir ce Ver. Souvent en pareil cas je l'ai laiſſé prendre par la mere ; mais cette fois je retirai le petit Ver de l'eau, & puis je coupai entiérement les bras à la mere, je lui coupai la tête, & je redonnai enſuite le Ver au jeune Polype, comptant qu'il ne pouvoit plus lui être ravi. Après le lui avoir vu ſaiſir, je ceſſai de l'obſerver, & je revins le conſidérer environ au bout d'une demi-heure. Je vis alors une choſe à laquelle je ne m'attendois pas. La mere avoit les lèvres renverſées en dehors ſur le reſte de ſon corps, & le Ver, que je comptois de trouver dans l'eſtomac du jeune, étoit en train d'entrer dans celui de la mere, je ne dirai pas par ſa bouche, mais par l'ouverture que formoient, à l'extrémité de ce tronc ſans tête, les bords renverſés du bout antérieur de cet Animal ainſi mutilé. Je ne diſcontinuai pas de l'obſerver, juſqu'à ce que j'euſſe vu le Ver entiérement avalé.

Ces Faits, que je viens de rapporter, me firent ſoupçonner que les Polypes avoient un ſentiment qui leur faiſoit appercevoir leur proie ; & cela me rendit plus attentif à remarquer tout ce qui pouvoit confirmer, ou détruire ce ſoupçon.

J'ai vu diverſes fois des Polypes fixés ſur des branches de Prêle, qui étoient dans mes poudriers, ramener leurs bras vers des Mille-pieds qui rampoient ſur ces Plantes, & les ſaiſir. J'ai

J'AI mis au fond de grands verres, au haut deſquels étoient fixés quelques Polypes à longs bras; j'ai mis, dis-je, au fond de ces verres un Ver qui ne pouvoit pas nager ; j'ai même fait enſorte qu'il ne bougeât pas de la place où je l'avois mis. Mon intention étoit de voir ſi les Polypes, qui en étoient éloignés de cinq à ſix pouces, le viendroient chercher avec leurs bras. C'eſt ce qui eſt arrivé ſouvent.

LORSQU'ON obſerve un Animal, il eſt bien naturel de chercher s'il a des yeux; mais il eſt ſur-tout naturel de les chercher dans un Animal, auquel on a apperçu un penchant marqué pour la lumiére. Je n'ai donc rien négligé, pour m'aſſûrer ſi les Polypes avoient des yeux. Il n'y a aucun endroit de leur corps, que je n'aie obſervé avec ſoin, à la loupe, & au microſcope: mais je n'ai jamais pu parvenir à découvrir aucune partie, qui, par ſa ſituation, ou par ſa ſtructure, me donnât lieu de ſoupçonner qu'elle étoit un œil.

QUOIQUE je n'aie point apperçu d'yeux dans les Polypes, & quand même les plus-habiles Obſervateurs, aidés des meilleurs microſcopes, n'en découvriroient point, il ſeroit téméraire, ce me ſemble, de décider qu'ils n'en ont point, & ſur-tout de décider en général, qu'ils n'ont pas une maniére d'appercevoir la lumiére & les objets qu'elle éclaire. Il eſt plus convenable, lorſque les Faits manquent dans de pareilles Recherches, de ſuſpendre ſon jugement, que de faire des Déciſions, qui, dans le fond, ſuppoſent preſque toujours, que la Nature eſt auſſi bornée que les facultés de ceux qui l'obſervent.

QUELQUES-UNS des Faits que j'ai rapportés ci-deſſus, auront déjà donné lieu de penſer, que, lorſque différens Polypes arrêtent le même Ver, ils ſe le diſputent. On en voit ſouvent deux, par exemple, qui tirent, chacun à eux, le même Ver avec beaucoup de force. Il arrive aſſez fréquemment, que l'un commence à l'avaler par un bout, & l'autre par l'autre; & qu'ils continuent à avaler, chacun de leur côté, juſqu'à ce que leurs bouches ſe touchent *. Elles reſtent quelquefois appliquées aſſez long-tems l'une contre l'autre; après quoi, le Ver ſe rompt, & chaque Polype en a la moitié; mais d'autres fois, le combat ne ſe termine pas là. Les Polypes continuent à ſe diſputer leur proie, lorſque leurs têtes ſe touchent. L'un des Polypes ouvre davantage ſa bouche, & ſe met en devoir d'avaler l'autre, avec la portion de Ver qu'il a dans le corps. Il l'avale, en effet, plus ou moins; & ſouvent même preſque tout entier *. Ce combat finit cependant plus heureuſement qu'on ne ſeroit d'abord porté à le croire, pour le Polype qui a été englouti par ſon adverſaire. Il ne lui en coute que ſa proie, que l'autre lui arrache ſouvent de l'eſtomac: il ſort tout entier, ſain & ſauf du corps de ſon ennemi, après même y avoir été pendant plus d'une heure.

* PL. VII. Fig. 4. *a.*

* Fig. 5.

IL arrive très ſouvent aux Polypes, & ſur-tout à ceux de la troiſiéme eſpéce, d'avaler en partie quelques-uns de leurs bras avec leur proie. Ce qui reſte en dehors, forme ſouvent une bouche, très facile à remarquer *. On ſait que ces bras s'entortillent autour de leur proie lorſqu'ils l'arrêtent. Le Polype, au-lieu de les dé-

* PL. VI. Fig. 5. *e, i.*

dégager à meſure qu'il l'avale, les laiſſe tels qu'ils étoient: le Ver, ou le Puceron eſt encore enlacé dans ces bras lorſqu'il eſt dans l'eſtomac, comme il l'étoit avant que d'y entrer *. Il y a plus: les bouts de ces bras reſtent ſouvent dans l'eſtomac plus de vingt-quatre heures, & en ſortent, au bout de ce tems-là, tels qu'ils y ſont entrés. Cependant il faut beaucoup moins de tems, pour que des Animaux, dont les parties ſont beaucoup plus ſolides que celles de ces bras, ſoient macérés & digérés dans cet eſtomac.

* PL. VI. Fig. 5.

Cette Expérience, & ſur-tout le Fait que j'ai rapporté ci-deſſus de ces Polypes, qui ſortent ſains & ſaufs du corps d'un autre Polype, après y avoir été pendant plus d'une heure, me fit ſoupçonner, que ces Animaux n'étoient pas pour leur propre eſpéce un aliment convenable. Depuis que j'en nourriſſois, j'avois eu occaſion de m'en aſſûrer d'une autre maniére. J'avois toûjours tenu un grand nombre de Polypes dans des verres, où ils étoient à portée de ſe manger les uns les autres. Ce fut même pour moi un ſujet de crainte, dans le commencement de mes Obſervations. Il m'étoit déjà arrivé plus d'une fois de voir des Animaux de même eſpéce, ſe manger les uns les autres, & me priver par-là du plaiſir de les obſerver plus long-tems. Mais j'ai été bientôt raſſuré à l'égard des Polypes. Quoique je les aye laiſſés nombre de jours ſans manger, & enſuite des mois entiers, je n'en ai jamais vu qui ayent entrepris de ſe manger les uns les autres. J'ai même tâché de les y porter; j'ai pris un Polype, & je l'ai préſenté à un autre, comme je lûi préſenterois un Ver. Ce dernier, au-

lieu de le ſaiſir ſur le champ, comme il l'auroit fait, ſi ç'avoit été une proie convenable, ce dernier, dis-je, ne faiſoit aucun mouvement qui tendît à l'arrêter: il le laiſſoit gliſſer ſur ſes bras, & tomber au fond du verre; ou, s'il reſtoit attaché aux bras, ce n'étoit pas pour long-tems.

J'AURAI occaſion dans la ſuite de décrire comment je ſuis parvenu à introduire un Polype dans l'eſtomac d'un autre Polype, & à le forcer à y reſter. Je me contenterai de dire à préſent, qu'aucun des Polypes, ſur leſquels j'ai fait cette Expérience, n'eſt mort, quoique quelques-uns ſoient reſtés quatre ou cinq jours entiers dans l'eſtomac. Et il importe de remarquer, que, de tous les Animaux dont j'ai parlé, qui ſervent de nourriture aux Polypes, je n'en ai trouvé aucun qui pût vivre dans leur eſtomac plus d'un quart d'heure. J'ai ſouvent tiré de ces Animaux en vie de l'eſtomac, lorſque j'ai obligé les Polypes à les rendre d'abord après qu'ils les avoient avalés; mais pour peu que j'aie tardé, je les ai toûjours trouvés morts.

J'AI nourri des Polypes de la ſeconde & de la troiſiéme eſpéce, dans toutes les ſaiſons de l'année, & j'ai appris par-là, qu'il n'y en a aucune dans laquelle ils ne mangent, excepté dans ce tems de l'hyver, où l'eau a un degré de froideur, fort peu éloigné de celui de congélation. Le froid qui les engourdit, & qui leur ôte l'activité néceſſaire pour chercher à manger, & pour ſaiſir les proies qui ſe préſentent, leur rend tout aliment inutile, en leur faiſant perdre entiérement l'appétit. Lorſque, dans ce tems-là, on fait

ſait tomber un Ver ſur leurs bras, ils ne paroiſſent avoir aucun goût pour lui, ils ne l'arrêtent point.

Mais, à meſure que la chaleur augmente, leur appétit renait, & ils acquiérent en même tems les forces néceſſaires pour exécuter les manœuvres requiſes, pour attraper des Animaux. C'eſt auſſi dans ce tems, que la plupart de ceux qui leur ſervent de nourriture, revenant de l'état d'engourdiſſement où le froid les avoit mis, ou ſortant des œufs qui avoient été dépoſés auparavant au fond des eaux, commencent à paroitre, & à s'expoſer eux-mêmes, en allant & venant, aux piéges que leur tendent les Polypes.

Il n'eſt pas poſſible de marquer avec préciſion la proportion qu'il y a entre l'augmentation de la chaleur, & celle de l'appétit des Polypes. Le changement, que produiſent quelques degrés de chaleur de plus ou de moins, n'eſt pas aſſez ſenſible. Il ſuffit de dire, que cet appétit eſt beaucoup plus grand en Eté, & qu'alors la voracité des Polypes eſt même très remarquable. Il eſt ordinaire de leur voir avaler un Ver, pour le moins auſſi épais qu'eſt leur corps lorſqu'il eſt étendu, & trois ou quatre fois auſſi long *. J'ai déjà dit, qu'ils peuvent manger, dans un ſeul repas, une dixaine de Pucerons, ou bien trois ou quatre Mille-pieds. Quand on compare le volume des alimens que les Polypes peuvent prendre en une ſeule fois, avec celui de leur corps, on trouve que le premier de ces volumes eſt trois ou quatre fois plus grand que le ſecond.

* PL. VI. Fig. 4.

Quelque grande que ſoit la quantité d'alimens qu'ils prennent en Eté en une ſeule fois, ils l'ont

beaucoup plutôt digérée, & ils ſont beaucoup plutôt en état de faire un nouveau repas, que dans une autre ſaiſon.

LORSQU'IL fait chaud, la digeſtion eſt ſouvent finie au bout de douze heures: le Polype a déjà tiré, de l'Animal qu'il a avalé, le ſuc nourricier, & rendu les excrémens: il s'eſt déjà vuidé de ce volume conſidérable, qui rempliſſoit ſon eſtomac: ſon corps & ſes bras ſe ſont étendus de nouveau. Il faut, pour que tout cela ſe faſſe dans une ſaiſon plus froide, ſouvent deux ou trois fois vingt-quatre heures, ſuivant qu'il fait plus ou moins froid, quoique le Polype ait beaucoup moins mangé, qu'il ne mange en Eté.

LES Polypes rendent leurs excrémens par la bouche. Je n'ai jamais rien vu ſortir par l'ouverture qu'ils ont à leur extrémité poſtérieure.

IL en eſt des Polypes, comme de la plupart des Animaux voraces: s'ils peuvent manger beaucoup à la fois, ils peuvent auſſi reſter fort long-tems ſans manger. L'Hiſtoire des Inſectes nous fournit les exemples des Abeilles, des Fourmis, de diverſes eſpéces de Chenilles, de Vers, de Papillons & de Mouches, qui paſſent des mois entiers, ſans manger quoi que ce ſoit. Mais ce tems de jeûne eſt auſſi, pour ces Inſectes, un tems d'inaction, d'engourdiſſement, que la ſaiſon froide occaſionne. Ils ne pourroient pas reſter ſi long-tems ſans manger en Eté, lorſqu'ils ſont en action, quoiqu'ils ſoutiennent même dans ce tems-là de beaucoup plus longs jeûnes, que tant de Quadrupedes, & d'autres Animaux qui nous ſont connus. Les Polypes, au contraire, peuvent, ſans mou-

mourir, ſe paſſer très longtems de nourriture, dans la ſaiſon la plus chaude. J'en ai conſervé alors dans des verres, qui ont été privés de tout aliment pendant quatre mois.

Je n'ai rien négligé, pour tâcher d'acquérir quelques idées ſur la maniére dont les Polypes digérent leurs alimens, ſur la maniére dont ils en tirent le ſuc nourricier, & ſur celle dont ce ſuc paſſe dans leur corps, pour les nourrir. Je ne me ſuis jamais flatté d'acquérir là-deſſus des idées fort préciſes. Voici tout ce que j'ai pu découvrir.

D'abord après que les Mille-pieds, & ces Vers, dont je me ſuis ſouvent ſervi pour nourrir les Polypes, ont été introduits dans leur eſtomac, ils y ſont fort reconnoiſſables: on les voit diſtinctement, à cauſe de la tranſparence de la peau des Polypes; mais ils ne ſe diſtinguent jamais mieux, que dans ceux qui n'ont pas mangé de quelque tems *. Quand on obſerve de ſuite ces Vers qui ſont dans l'eſtomac, on s'apperçoit que peu à peu ils perdent leur figure, & enfin on ne les reconnoit plus. La matière, dont ils ſont compoſés, a été réduite en une bouillie, qui renferme des fragmens, plus ou moins grands, des parties les plus ſolides de ces Animaux. Tout ce qu'on voit porteroit à croire, que les alimens ſont d'abord macérés dans l'eſtomac des Polypes, & qu'enſuite le ſuc nourricier, en étant ſéparé, ils rejettent le reſte par la bouche.

* PL. VI. Fig. 5.

Lorsqu'on nourrit pluſieurs Polypes, on a ſouvent occaſion de voir ſortir par la bouche, ces excrémens, qui ſont compoſés de parties de matière aſſez gran-

grandes pour être facilement remarquées. Il arrive même, lorſque le Polype n'a pas bien digéré le Ver, ce qui eſt aſſez ordinaire dans une ſaiſon qui n'eſt que tempérée, ou froide; il arrive, dis-je, qu'il y a, parmi ces excrémens, des morceaux de Vers aſſez longs, qui ſont alors blanchâtres, & dont les parties paroiſſent ſeulement avoir été un peu déchirées *.

* PL. VII. Fig. 6. r.

APRÈS que le Polype s'eſt défait de ces excrémens, ſon corps n'eſt pas toûjours entiérement desenflé. Il paroit quelquefois plein d'une liqueur, dans laquelle eſt, ſans doute, le ſuc qui s'eſt ſéparé des alimens. Cette liqueur renferme encore des excrémens, mais plus difficiles à voir ſortir que les premiers dont j'ai parlé, ou plutôt cette liqueur elle-même, n'eſt que des excrémens, après que les parties deſtinées à la nutrition, en ont été ſéparées, & ſont paſſées dans la peau. Elle ſort de l'eſtomac par filets extrêmement déliés, & même auſſi déliés que les bras des Polypes de la troiſiéme eſpéce. J'en ai vu ſortir de la bouche de ces Polypes, qui même m'ont trompé au premier coup d'œil, je les ai pris pour les bras de ces Animaux.

LE corps des Pucerons n'eſt pas macéré dans l'eſtomac des Polypes, comme celui des Vers dont je viens de parler. Auſſi toute la ſuperficie du corps des Pucerons eſt-elle écailleuſe, au-lieu que tout le corps des Vers n'eſt compoſé que de parties molles. Ces Pucerons ſont ordinairement rougeâtres, & ſouvent même leur couleur eſt aſſez vive. Il eſt facile de s'aſſurer, en les obſervant à la loupe, que ce qui leur donne cette couleur, eſt dans l'intérieur, & non à la

la ſuperficie de leur corps. Cette peau, qui eſt écailleuſe, eſt d'un blanc tranſparent, elle laiſſe voir les inteſtins qu'elle enferme, & dans leſquels eſt la matiére colorée, qui fait paroitre les Pucerons rougeâtres. Toute la différence qu'on remarque dans un Puceron, lorſqu'il entre dans l'eſtomac d'un Polype pour lui ſervir d'aliment, & lorſqu'il en ſort comme excrément, c'eſt celle qui eſt dans ſa couleur: il y eſt entré rougeâtre, & il en ſort blanc. Il paroit donc, que la matiére rougeâtre a été ſimplement tirée des inteſtins du Puceron; & l'on ſeroit porté à croire, que cela s'opére par une ſorte de ſuction.

Ce que j'ai vu à l'égard d'un autre Animal *, que j'ai auſſi donné à manger aux Polypes, m'a paru propre à confirmer cette idée. Cet Animal eſt aſſez commun. Il marche, en recourbant & en étendant ſucceſſivement ſon corps. Ce corps eſt d'un blanc tranſparent, & il a à peu près la conſiſtence de la cire. Les inteſtins, qu'on voit très diſtinctement *, ſont, dans la plupart de ces Inſectes, pleins d'une matiére d'un beau rouge cramoiſi. Celui, qui eſt repréſenté dans la Figure 7, eſt trop grand pour pouvoir être mangé par un Polype. Il faut en choiſir pour cela qui ſoient de la moitié plus petits. Ces Animaux ſortent auſſi du corps des Polypes, ſans avoir été macérés: la matiére rouge, qu'ils ont dans leurs inteſtins, en a été ſeulement tirée. J'ai ouvert un Polype, environ une heure après qu'il avoit avalé un de ces Inſectes, & j'ai trouvé que la matiére rouge étoit en train de ſortir par une des extrémités de ce Ver. Elle ne paroiſſoit pas liquide, il me ſembla qu'elle avoit la conſiſ-

* PL. VII. Fig. 7.

* Fig. 7.

ſiſtence de la gelée de groſeilles, elle en avoit auſſi la couleur. Comment cette matiére rouge eſt-elle tirée du corps de ces Vers ? Ne ſeroit-ce point par ſuction ?

VOICI une Expérience, qui réveille la même idée que les deux précédentes. J'avois donné à un Polype aſſez petit, un de ces Vers rouges de Tipules, dont j'ai parlé ci-deſſus *. Il étoit des plus grands, & il ſe préſenta à la bouche du Polype par le milieu du corps; & par conſéquent, le Polype ne pouvoit avaler ce Ver, qu'en ouvrant extrêmement ſa bouche. La premiére fois que je vins obſerver ce Polype, après lui avoir donné à manger, je trouvai ſes lévres fortement appliquées contre ce Ver, & qui embraſſoient un eſpace de ſon corps, long d'environ deux lignes *. La bouche du Polype avoit donc été obligée de s'ouvrir conſidérablement. Son corps * avoit la forme d'un entonnoir, aplatti des deux côtés. Je ne me ſerois pas figuré, que le Polype pût tirer du ſuc de cet Animal, avant qu'il fût dans ſon eſtomac. Cependant, je fus bientôt convaincu, qu'il le pouvoit. La peau du Polype étoit fort tranſparente; je vis diſtinctement, à travers cette peau, dans l'eſtomac du Polype, ou ſi l'on veut, dans l'entonnoir qu'il formoit *, une liqueur rouge qu'il avoit tirée du Ver ſur lequel ſes lévres étoient appliquées: &, en continuant de l'obſerver, je vis ſenſiblement que cette liqueur rouge augmentoit.

* Pag. 101.

* PL. VII. Fig. 8. *ei.*

* *b e i.*

* *b e i.*

J'AI vu depuis, pluſieurs Polypes, qui, aiant dans leurs bras des proies ſi grandes qu'elles ne pouvoient entrer dans leur eſtomac, les ont ſucées en partie, en appli-

appliquant fortement leurs lévres contre ces Animaux.

La cauſe, qui produit cette ſuction, peut auſſi détacher les parties colorées de la peau des Animaux. Je l'ai éprouvé avec ces Araignées d'un très beau rouge, qui ſont fort communes dans les eaux. J'ai donné à des Polypes des peaux de ces Araignées, & les parties colorées en ont été ſéparées dans leur eſtomac. Après que la ſécrétion des parties les plus groſſiéres a été faite, & que ces derniéres ont été rejettées, la matiére rouge, dont je viens de parler, a formé, dans l'eſtomac des Polypes, une liqueur rouge, très facile à diſtinguer à travers leur peau.

La matiére rougeâtre des Pucerons forme une liqueur rougeâtre: celle des Vers plats * en forme une d'un beau rouge: enfin, la liqueur qui reſte dans l'eſtomac, eſt toujours de la couleur dominante dans l'Animal que le Polype a mangé. * PL. VII. Fig. 7.

Cette liqueur eſt compoſée des parties colorées des alimens, & de l'eau qui ſe trouve dans l'eſtomac du Polype. Si on preſſe le corps d'un Polype qui en eſt rempli, on la voit ſortir en aſſez grande quantité.

J'ai remarqué une choſe qui peut beaucoup contribuer à la digeſtion des alimens. C'eſt qu'ils ſont continuellement pouſſés, & repouſſés d'une extrémité à l'autre de l'eſtomac. Il faut, pour avoir occaſion d'obſerver ce mouvement, choiſir des Polypes dont l'eſtomac ne ſoit pas trop plein, & qui aient pris des alimens qui puiſſent être macérés. Ce balottement des alimens eſt ſenſible, lorſque leurs parties ſont déjà diviſées en petits fragmens. Quand, au contraire, l'eſ-

tomac du Polype eſt fort plein, & quand les alimens qu'il a avalés, ne peuvent pas ſe réduire en petites parties, on ne leur voit faire aucun mouvement, & ils ne peuvent pas en faire. Ils n'ont pas la liberté d'aller & de venir, dans un eſpace qui eſt entiérement rempli, & dans lequel ils ſont fort génés: ils ne peuvent pas céder à l'action qui met en mouvement les alimens qui ſont moins ſerrés, & plus briſés; mais, il eſt cependant très vraiſemblable, que cette action a toujours également lieu dans le Polype, mais qu'elle produit ſon effet ſur les alimens, d'une maniére inſenſible. Il eſt bien naturel de penſer, que la cauſe, qui produit ce balottement des alimens dans l'eſtomac des Polypes, eſt une ſorte de mouvement périſtaltique, qui ſe fait en divers ſens. On conçoit facilement, qu'il peut dans les Polypes, comme dans d'autres Animaux, contribuer beaucoup à la digeſtion.

Ce mouvement périſtaltique répand le ſuc nourricier dans tout l'eſtomac des Polypes. Cela ne paroit pas fort néceſſaire dans ceux de la ſeconde eſpéce, parce que cet eſtomac ſe remplit ordinairement d'abord d'alimens, d'une extrémité à l'autre. Mais, il n'en eſt pas de même de ceux à longs bras. Leur corps, comme on l'a déja vu, ſe retrécit conſidérablement, environ aux deux tiers de ſa longueur, & reſte tel juſqu'à ſon extrémité poſtérieure. L'eſtomac eſt par cela même conſidérablement rétréci dans cet endroit-là. Les alimens, qu'un Polype à longs bras avale, s'arrêtent la plupart du tems dans l'endroit où commence ce retréciſſement, & ne rempliſſent que la partie de l'eſtomac, qui eſt la plus lar-

large. Il eſt néceſſaire, dans ce cas, que le ſuc nourricier, lorſqu'il a été ſéparé, ſoit porté dans cette partie étroite de l'eſtomac, dans laquelle des fragmens groſſiers ne ſauroient entrer. C'eſt donc là l'effet que produit le mouvement périſtaltique, qui ſe trouve dans les Polypes: &, pour s'en aſſurer, il ſuffit de donner à quelques Polypes des alimens qui fourniſſent un ſuc d'une couleur un peu vive, par exemple, de ces Vers plats *, dont les inteſtins ſont pleins d'une matiére rouge. Dès que cette matiére rouge commence à ſortir de leur corps, & à ſe répandre dans la partie large de l'eſtomac, elle eſt enſuite bientôt pouſſée dans la partie étroite: on la voit parvenir juſqu'à ſon extrémité, & s'y raſſembler en une quantité très ſenſible.

* PL. VII. Fig. 7.

Ce n'eſt pas-là le ſeul canal étroit, dans lequel les alimens doivent être portés. Il s'en trouve pluſieurs dans les Polypes des deux eſpéces, ſur leſquels j'ai fait mes Expériences. Ces canaux ſont les bras de ces Polypes. Ils ſont percés en dedans, & forment, comme le corps même des Polypes, une eſpéce de boïau. Chacun de ces boïaux, que forment les bras des Polypes, communique avec celui que forme le corps: il s'ouvre dans l'eſtomac; & c'eſt par le trou de communication que les alimens ſont chaſſés, par le mouvement périſtaltique, de l'eſtomac dans ces bras.

J'ai commencé à m'en aſſurer, lorſque j'ai obſervé des Polypes qui avoient ſucé la matiére rouge, qui eſt dans les inteſtins des Vers plats dont je viens de parler. En examinant avec attention, à la loupe, les bras de ces Polypes, près de leur origine, j'ai vu que

la matiére rouge avoit paſſé dans ces bras, & qu'ils en renfermoient une quantité fort ſenſible. Mais, ce ſuc rouge eſt compoſé de parties trop déliées, pour qu'il ſoit facile de les voir paſſer de l'eſtomac dans les bras, de maniére qu'on puiſſe décider, qu'il y eſt entré par un trou de communication, & qu'il eſt dans un canal que forment les bras. Il ſe pourroit que ce ſuc eût été filtré, & eût été répandu dans la peau même.

J'AI fait une autre Expérience, qui a entiérement réſolu mon doute. J'avois donné à un Polype des morceaux de peau de ces petites Limaces noires & plattes *, qui ſe rencontrent en abondance dans les foſſés. La matiére de cette peau fut bientôt réduite, dans l'eſtomac du Polype, en une eſpéce de bouillie, qui étoit principalement compoſée de petits fragmens noirs. Cette bouillie, & ces fragmens étoient balottés dans l'eſtomac du Polype. Je les ſuivois dans leur mouvement avec attention, aidé d'une bonne loupe. Enfin, je m'apperçus que pluſieurs de ces petits fragmens noirs paſſoient à la file dans les bras du Polype: je les voiois diſtinctement, & dans l'eſtomac, & dans les bras, & je les voiois paſſer de l'un dans l'autre. Je ne les ai pas vus aller plus avant dans le bras, que de la longueur de deux ou trois lignes: enſuite, ils étoient renvoïés du bras dans l'eſtomac, & chaſſés de nouveau vers l'extrémité poſtérieure du Polype; après quoi, ils étoient encore repouſſés vers ſon bout antérieur, & dans les bras, & ainſi continuellement.

* PL. VII. Fig. 9.

J'AI repeté très ſouvent cette Expérience. Elle eſt, ce me ſemble, une preuve bien claire de cette ſorte de mouvement périſtaltique qui agit dans les Polypes,

pes, en divers ſens, & elle prouve même, qu'il eſt également, & dans le corps, & dans les bras. Il eſt toûjours aſſez lent, mais ſur-tout en hyver.

Il me ſemble que l'Expérience, que je viens de rapporter, peut ſuffire pour prouver, que les bras des Polypes forment chacun un tuïau, qui a un trou de communication avec l'eſtomac. Mais je n'oſerois décider ſi ce tuïau va juſqu'à l'extrémité du bras, & s'il eſt ouvert à cette extrémité.

Les Expériences précédentes ont été faites avec les Polypes de la ſeconde & de la troiſiéme eſpéce: elles ſont plus faciles avec ceux de la troiſiéme, parce que leur peau eſt plus tranſparente que celle des autres.

Je ſuis parvenu à voir très diſtinctement les trous de communication qui ſont entre l'eſtomac & les bras des Polypes. Je les ai vus pluſieurs fois; mais je ne m'y attendois nullement la premiére fois que je les vis: je faiſois une opération, dont il n'eſt pas encore tems de parler.

De tout ce que je viens de dire, il paroit clairement, que le ſuc nourricier, après avoir été ſéparé, ſe répand dans tout le tuïau que forme le corps, & dans ceux que forme chaque bras des Polypes. Mais, comment paſſe-t-il enſuite dans la peau, qui ſert de parois à ces tuïaux? Comment ſe répand-t-il dans ſes parties? Et comment contribue-t-il à la nutrition & à l'accroiſſement des Polypes?

Je me garderai bien de promettre de répondre d'une maniére ſatisfaiſante à ces Queſtions. Je vais ſimplement expoſer quelques Obſervations, qui, peut-être,

être, ſerviront à répandre une foible lumiére ſur les deux premiéres.

Il convient que je commence par une Digreſſion ſur la cauſe de la couleur des Polypes. Les Faits, qu'elle renfermera, ſerviront de baſe à ce que je dois établir touchant les Queſtions précédentes.

J'ai dit, dans le premier *Mémoire**, que les Polypes n'ont pas toûjours la même nuance de couleur, qu'elle varie dans le même Polype, qu'elle devient, tantôt plus foncée, & tantôt plus claire, enfin qu'il la peut perdre entiérement, & qu'alors il eſt, d'un blanc un peu tranſparent. Tout cela eſt très facile à obſerver, lorſqu'on examine de ſuite les mêmes Polypes pendant quelque tems. Il eſt auſſi très facile de s'appercevoir, que ces changemens viennent du plus ou du moins de nourriture que prennent les Polypes. Plus ils mangent, plus leur couleur devient foncée; & dès qu'on les laiſſe jeûner, elle devient plus claire.

* Pag. 47.

La couleur des Polypes de la ſeconde & de la troiſiéme eſpéce eſt ordinairement d'un brun rougeâtre, mais dont la nuance varie dans les individus de ces eſpéces, & approche plus ou moins du rouge, ou du brun.

Après avoir nourri pendant quelque tems des Polypes, j'eus lieu d'être perſuadé, que cette variété de couleur venoit, non ſeulement du plus ou du moins de nourriture que je donnois à ces Animaux, mais auſſi de la diverſité de la couleur même des alimens qu'ils prennoient. Ce fut ce qui me fit penſer, que ſi les Polypes mangeoient des Inſectes d'une couleur plus vive que celle des Mille-pieds & des Pucerons, dont je les avois nourris juſqu'alors, ils en pren-

prendroient une plus marquée que celle que je leur connoiſſois. Mon but fut d'abord de les rendre d'un beau rouge; & j'eus recours pour cela à ces Vers, dont les inteſtins ſont pleins d'une matiére qui tire ſur le cramoiſi *. J'en donnai à quelques Polypes de la troiſiéme eſpéce, qui n'avoient preſque aucune couleur; &, dans un jour, ils furent teints en rouge. Je réïterai l'Expérience ſur ces Polypes, pour augmenter la nuance de leur couleur rouge, & ſur d'autres de l'une & de l'autre eſpéce: & je leur vis prendre à tous la couleur de la matiére qui étoit dans les inteſtins des Vers que je leur avois donnés; & cela, à proportion de la quantité de cette matiére qui étoit paſſée dans leur eſtomac.

* PL. VII. Fig. 7.

Après avoir teint des Polypes en rouge, je me propoſai d'en teindre en noir. Je leur donnai, pour cet effet, des morceaux de petites Limaces aquatiques noires *: &, en peu de tems, ils furent noirs. Il eſt arrivé diverſes fois, que les Polypes n'ont pas bien digéré ces Limaces: alors, ils n'ont pris que peu ou point leur couleur. J'ai fait manger à quelques-uns de petits Tetards de Grenouilles qui étoient noirs, & après les avoir digérés, leur corps a eu une nuance de cette couleur aſſez foncée.

* Fig. 9.

Ces petites Araignées aquatiques, d'un beau rouge, s'étoient trop fait remarquer, pour que je n'y penſaſſe pas. Il en couta la vie à pluſieurs, que je donnai à des Polypes. Je commençai par les leur offrir entiéres; mais, m'étant apperçu que la plûpart avoient de la peine à les avaler, j'enlevai la peau de ces Araignées, & je la donnai ſeule aux Polypes.

J'appris en même tems par-là, qu'il n'y avoit que la ſuperficie extérieure de cette peau qui fût rouge. Les Polypes, qui ont mangé de ces Araignées, ont pris un beau rouge, tirant ſur la couleur de feu. J'ai trouvé quelquefois dans les foſſés des Polypes, qui avoient la même couleur. Il eſt apparent qu'ils s'étoient nourris nouvellement d'Araignées rouges.

J'AI auſſi entrepris de teindre des Polypes de la troiſiéme eſpéce en verd. N'aiant découvert aucun Inſecte aquatique qui leur pût donner cette couleur, j'eus recours à une eſpéce de Pucerons verds du Roſier. J'en donnai à quelques Polypes, qui les avalérent, & qui, après les avoir digérés, eurent une foible teinte de verd.

LES pieds de ces Pucerons les rendent difficiles à avaler, pour les Polypes. Ils ſont roides. J'ai eu ſoin, la plupart du tems, de couper ces pieds, avant que de les donner aux Polypes. Cependant, j'en ai vu quelques-uns, qui ont avalé chacun un Puceron avec ſes pieds. Ils ne purent pas ſe ranger dans l'eſtomac, ils obligérent la peau des Polypes à s'étendre extrêmement; &, qui plus eſt, il y en eut qui la percérent, & qui ſe montrérent en déhors des Polypes. Trois ou quatre pieds ſortoient en différens endroits de leur corps, & faiſoient un effet fort ſingulier.

LES Polypes, qui furent ainſi percés, n'en digérérent pas moins le corps des Pucerons, & même obligérent peu à peu les pieds à rentrer dans leur eſtomac. Après quoi, il ne reſta aucune trace de la bleſſure que ces pieds avoient faite à leur peau; & les Polypes ne parurent s'en reſſentir en aucune manière.

APRÈS

APRÈS avoir eſſaïé de varier la couleur des Polypes, au moïen de celle de différens Animaux que je leur avois donné à manger, je tentai de la varier encore d'une autre maniére. Je ne penſai pas moins, qu'à leur donner toutes les couleurs des Fleurs qui ornent un Parterre par leur grande variété. Il auroit fallu, pour que cela fût poſſible, que ces Végétables euſſent été des alimens propres pour les Polypes. Je pris différentes Fleurs, je coupai leurs pétales en morceaux étroits, & longs de deux ou trois lignes; & j'en fis tomber ſur les bras de pluſieurs Polypes. Les uns ne les arrêtérent pas, d'autres les arrêtérent pour peu de tems; mais le peu d'empreſſement qu'ils avoient pour les porter à leur bouche, me fit bientôt comprendre que ces Fleurs ne leur plaiſoient pas. Deux Polypes cependant en avalérent. L'un, un morceau de pétale de Pied-d'aloüette bleue, & l'autre, un morceau de pétale de Giroflier. Mais, comme j'étois très attentif à obſerver s'ils les digéreroient, & s'ils ſépareroient leurs parties colorées, du reſte, je les leur vis rejetter hors de l'eſtomac.

CELA me fit comprendre, que je devois renoncer à voir réuſſir cette Expérience, & que les Polypes ne pouvoient pas ſe nourrir de Fleurs. Je n'ai pas eſſaïé de leur donner d'autres Végétables, excepté du pain, dont ils ne ſe ſont pas nourris.

J'AI fait infuſer, dans de l'eau, des Fleurs de Souci jaune, & de Pied-d'aloüette bleue, & j'ai mis des Polypes dans cette teinture, pour eſſaïer s'ils y pourroient vivre, & ſur-tout ſi cette liqueur paſſant dans leur eſtomac, les parties colorées, qu'elle renfermoit,

ne ſerviroient point à nourrir & à teindre les Polypes, comme le font les parties colorées qu'ils tirent des Animaux; mais, les Polypes n'ont pû vivre dans ces infuſions.

Il paroit donc, par les Expériences rapportées ciderſus, que la couleur des Polypes dépend de celle du ſuc nourricier qu'ils tirent des Animaux qu'ils mangent. On pourroit, peut-être, s'imaginer, que ce n'eſt qu'en apparence qu'ils en ſont colorés, qu'il en eſt des Polypes, comme d'une bouteille d'un verre tranſparent, à travers lequel on voit la liqueur qu'elle renferme, & qui paroit en avoir la couleur. Il ſuffit, pour ſe convaincre du contraire, d'examiner avec attention un Polype, après qu'il s'eſt entiérement vuidé de tout excrément, & qu'il s'eſt de nouveau allongé. On voit à l'œil, que ſon eſtomac eſt extrêmement retréci, qu'il ne contient plus de liqueur, & que la couleur eſt dans la peau même. Si enſuite, on ouvre le Polype, il eſt encore plus facile de s'en convaincre.

J'ai voulu ſavoir combien de tems les Polypes conſervent leur couleur. J'ai fait l'Expérience avec des rouges & avec des noirs, tous de la même eſpéce. Après qu'ils ont eu digéré les alimens qui les ont colorés, je les ai laiſſé jeûner. J'ai trouvé, qu'au bout de quinze jours, ces Polypes avoient encore une nuance, fort reconnoiſſable, de noir ou de rouge, quoique beaucoup plus foible que celle qu'ils avoient eue d'abord après avoir mangé. Peu à peu, elle s'eſt ſi fort affoiblie, qu'au bout de trois ſemaines, ou d'un mois, elle n'étoit plus ſenſible: le Polype étoit à peu près blanc.

Mais,

Mais, comment ce ſuc coloré ſe répand-t-il dans la peau des Polypes? Entre-t-il dans des Vaiſſeaux, & ſe diſperſe-t-il, par le moïen de ces Vaiſſeaux, dans tout le corps? On doit ſe rappeller ici, que j'ai dit dans le premier *Mémoire* *, que je n'avois pû découvrir aucun Vaiſſeau dans la peau des Polypes. Je n'ai vu que ces grains dont j'ai beaucoup parlé, & la matiére glaireuſe dans laquelle ils ſont. Il ſe peut que cette matiére renferme pluſieurs Vaiſſeaux; mais, ſuppoſé que cela ſoit, j'ôſe dire, cependant, que ce n'eſt pas dans ces Vaiſſeaux, que paſſe immédiatement le ſuc coloré qui a été extrait des alimens: car cette matiére glaireuſe eſt toujours blanche, & tranſparente, dans les Polypes mêmes qui ont le plus de couleur.

* Pag. 56.

Les grains, au contraire, qui ſe trouvent en abondance dans la peau des Polypes, ſont colorés: c'eſt de leur couleur, que dépend celle des Polypes; & la leur dépend de celle du ſuc nourricier que ces Animaux tirent des alimens qu'ils prennent. Ces grains deviennent, par exemple, rouges ou noirs, quand les Polypes ont été nourris par un ſuc rouge ou noir. Ils ont des nuances, plus ou moins fortes de ces différentes couleurs, à proportion de la force de la nuance de celle du ſuc nourricier, & à proportion de ſa quantité. Enfin, ils perdent peu-à-peu leur couleur, ſi on ne l'entretient, en donnant de tems en tems des alimens de même couleur aux Polypes. Que conclure donc de tout cela, & de tout ce qui a été dit ci-deſſus ſur ce ſujet *? C'eſt que le ſuc nourricier paſſe im-

* Mém. I. Pag. 58. & ſuiv.

immédiatement de l'eſtomac des Polypes, dans les grains dont leur peau eſt garnie.

MAIS, comment ce ſuc teint-il ces grains? Il eſt très apparent qu'ils ſont tous autant de *glandules*, ou de *veſſicules*, dans leſquelles il eſt introduit, peut-être, par une eſpéce de ſuction. Ces veſſicules paroiſſent colorées, parce qu'elles ſont pleines, parce qu'elles ſont imbibées d'un ſuc coloré. En ſuppoſant cela, il eſt facile de comprendre pourquoi ces grains ne paroiſſent pas colorés, lorſqu'ils ſont ſéparés, & pourquoi ils paroiſſent de plus en plus colorés, à meſure qu'ils ſont réünis en plus grande quantité.

LES parois de l'eſtomac ſont entiérement tapiſſées de grains, comme je l'ai dit dans le Mémoire précé-
* Pag. 54. dent *. Ce ſont ces grains-là, qui ſe rempliſſent, les prémiers, du ſuc nourricier qui ſe trouve dans l'eſtomac. Auſſi voit-on, que la ſuperficie intérieure de l'eſtomac eſt toujours bien colorée, après que les Polypes ont mangé. Les couches de grains, qui ſont au-deſſus de cette ſuperficie, reçoivent auſſi du ſuc nourricier; & cela, à proportion que le Polype prend plus ou moins d'alimens.

IL eſt très aiſé de remarquer, que, lorſqu'un Polype a peu mangé, & ſur-tout lorſqu'il a jeûné, il n'y a que quelques couches de grains, ſavoir, les plus près des parois de l'eſtomac, qui ſoient colorées: les autres ſont blanches, & forment cette enveloppe tranſparente, garnie de grains non colorés, dont j'ai par-
* Pag. 48. lé *. Quand un Polype eſt bien nourri, l'enveloppe transparente eſt plus mince, & il y a un plus grand nom-

nombre de couches de grains qui ſont colorées. Sans doute, qu'à meſure que les grains, les glandules, qui ſont le plus près de l'eſtomac, ſe rempliſſent, le ſuc nourricier paſſe aux autres. Il eſt facile de comprendre, que les bras tirent ce ſuc, comme le corps, dès qu'on ſe rappelle, que leur ſtructure eſt la même que la ſienne, & que le ſuc nourricier pénétre dans leur intérieur *.

* Voi. Pag. 60 &c. & Pag. 123. & ſuiv.

Mr. le Comte de Marſigli nous apprend, dans ſon *Hiſtoire de la Mer*, que la peau du Corail, & celle d'autres prétendues Plantes marines, eſt toute remplie de petits grains, qu'il compare à des grains de ſel. Les belles Obſervations, que Mr. de Reaumur rapporte dans la Préface du ſixiéme Volume des *Mémoires pour ſervir à l'Hiſtoire des Inſectes*, qu'il a faites, conjointement avec Mrs. Bernard de Juſſieu & Guétard; ces Obſervations, dis-je, nous ont déjà ſuffiſamment appris, que ces corps organiſés, qu'on a pris pour des Plantes, ſont des amas de Polypiers & de Polypes. Si les grains, qui ſe trouvent dans ces Polypes, étoient plus grands que ceux des Polypes dont je fais l'Hiſtoire, & s'ils leur reſſembloient, on pourroit, peut-être, en les obſervant, ſe mettre plus au fait de ce qu'ils ſont.

On pourroit demander ici ce que devient le ſuc nourricier, après avoir paſſé dans ces grains? Comment il ſe répand dans les autres parties des Polypes, pour ſervir à leur nutrition? Je me trouve tout-à-fait hors d'état de répondre à cette Queſtion.

L'accroissement des Polypes eſt fort prompt, lorſqu'ils mangent beaucoup & ſouvent; c'eſt-à-dire, en Eté. Il eſt proportionné à la quantité d'alimens qu'ils

qu'ils prennent. Je ne m'arrête point à déſigner les différens dégrés de leur accroiſſement, parce que j'y reviendrai, en parlant de leur multiplication.

J'AI déjà dit, que les Polypes peuvent jeûner très long-tems: je dois ajouter ici qu'ils diminuent, à meſure qu'ils jeûnent. J'en ai obſervé qui avoient, lorſqu'ils étoient étendus, la longueur d'un pouce, & qui ont diminué, par un jeûne de plus de trois mois, au point qu'ils ſont devenus des plus petits que j'aie jamais vus. Ils diminuent plus vite en Eté qu'en Hyver.

POUR juger, autant qu'il me ſeroit poſſible, de la durée de la vie des Polypes, j'ai entrepris d'en nourrir de ſuite. J'en ai qui ſont nés dans les mois de Juin & de Juillet de l'année 1741, & qui actuellement * vivent encore. Ces Animaux peuvent donc vivre pendant plus de deux ans. Ceux, dont je viens de parler, ont paſſé, pendant leur vie, par bien des différens dégrés de grandeur. Je les ai vus pluſieurs fois grands & petits, ſuivant que je les ai nourris plus ou moins.

* Janvier 1744.

CE n'eſt pas ſans ſoins, que l'on conſerve les Polypes; & encore en meurt-il pluſieurs de différentes maladies. J'en ai déjà décrit une ci-deſſus *, dont je ne ſaurois aſſigner la cauſe.

* Pag. 58.

LES Polypes ſont ſujets à être incommodés par une eſpéce de petits Poux, très communs dans les eaux. Ces Poux m'ont paru plats ſous le corps, & arrondis par-deſſus. Leur figure eſt à peu près ovale. Ils ſont ordinairement blancs: j'ai cependant remarqué, avec une loupe, du brun ſur le corps de pluſieurs.

ſieurs. Ils marchent avec viteſſe ſur le corps des Polypes, & peuvent le quitter & ſe mettre à la nage. Il m'a paru, qu'ils ſe raſſemblent ſur-tout près de la tête des Polypes *. On en voit, cependant, ſouvent grand nombre, qui courent ſur tout le corps *, & ſur les bras *. Il faut ſe ſervir d'une loupe, pour les voir diſtinctement. La Figure 10 repréſente parfaitement un Polype, groſſi avec une forte loupe, & garni de ces petits Animaux. Si l'on ne délivre les Polypes de ces Poux, ils peuvent en peu de jours en être couverts, & l'on s'apperçoit bientôt qu'ils en ſont incommodés. Souvent ils périſſent, & ſont mangés par ces petits Animaux. On voit peu-à-peu leurs bras diminuer, & enſuite leur corps, juſqu'à ce qu'il n'en reſte plus rien. Il arrive auſſi, qu'ils ne ſont rongés qu'en partie, ils perdent leur tête *.

* PL. VII. Fig. 10. *a.*
* *a b.*
* *c c c.*
* Fig. 11.

J'ai ſouvent mis dans des verres des centaines de Polypes, qui avoient des Poux ſur le corps. Je les ai abandonnés exprès à leur mauvais ſort. Ces petits Animaux ſe ſont prodigieuſement multipliés dans ces verres. Pluſieurs des Polypes en ſont péris. Il eſt arrivé quelquefois, qu'au bout de quelque tems, tous ces Poux ont diſparu. Je dois avertir, que j'ai toujours laiſſé la même eau dans les verres. Les Polypes, qui n'étoient pas morts lorſque les Poux ont diſparu, ſont reſtés en vie pour la plupart. Ceux, dont la partie antérieure avoit été tout-à-fait mangée *, ont pouſſé une nouvelle tête, & de nouveaux bras. J'en ai nourri quelques-uns, auſſi-bien que de ceux qui n'avoient pas été ſi mutilés, & ils ſont devenus de très beaux Polypes.

* PL. VII. Fig. 11.

Les Polypes ſont rarement long-tems ſans contracter des Poux. C'eſt ce qui m'a obligé à prendre pluſieurs précautions pour les en délivrer.

Ils en contractent même dans les foſſés où ils ſe tiennent. J'en ai trouvé pluſieurs fois, qui en étoient fort garnis: & j'ai eu occaſion de m'aſſurer, que ces Animaux les font périr, auſſi-bien dans leur ſéjour ordinaire, que dans les poudriers.

Il m'a paru, que les Polypes, qui ſont couverts d'un grand nombre de Poux, perdent plus vite leur couleur que les autres: & j'ai ſouvent remarqué, que, quoiqu'on leur donne autant à manger qu'à ces derniers, ils ne prennent pas une couleur auſſi foncée qu'eux.

L'usage m'a appris, qu'il étoit bon de changer ſouvent d'eau les Polypes. Il importe ſur-tout de mettre dans de nouvelle eau ceux qui ſont malades. J'ai obſervé ordinairement de changer d'eau après chaque repas. Cela prévient l'infection que les excrémens peuvent donner à l'eau. J'ai vu des Polypes ſe pourrir, en quelque maniére, dans une eau fort infectée par des cadavres de Pucerons, & par des excrémens.

S'il s'agit de Polypes qui me ſoient précieux par les Expériences que j'ai faites, ou que je ſuis en train de faire ſur eux, je prens encore plus de précautions. Je tâche de les délivrer entiérement de leurs Poux. Pour cet effet, je paſſe pluſieurs fois le bout d'un pinceau ſur tout leur corps: lorſque je ne puis pas facilement vergeter les Polypes, je les agite dans l'eau. Ce mouvement ſert auſſi à détacher les Poux.

Il

Il y a peu d'Inſectes qui n'aient leurs ennemis. Les eaux fourmillent d'Animaux voraces, qui ſe détruiſent les uns les autres. Tel, qui en a dévoré pluſieurs, eſt dévoré à ſon tour, & ſouvent par des Animaux beaucoup plus petits que lui. Le Polype en eſt un exemple. Il eſt redoutable à des Vers qui le ſurpaſſent de beaucoup en grandeur : il les dévore tout vivans ; & de petits Inſectes, qu'on ne peut bien diſtinguer ſans le ſecours d'une loupe, les attaquent & les font périr.

J'ai cherché s'il n'y avoit pas dans les eaux de plus grands Animaux, qui mangeaſſent les Polypes : j'ai commencé par en préſenter à des Poiſſons. Après avoir nourri de Vers une Perche d'une petite eſpéce, pendant quelque tems, j'ai jetté un Polype dans le verre où elle étoit. Ce Poiſſon s'eſt d'abord approché du Polype, & l'a englouti ; mais au lieu de l'avaler, il l'a d'abord rendu, comme s'il avoit pour ce Polype une grande répugnance. Il s'en eſt encore rapproché, il l'a englouti de nouveau, & l'a rejetté avec la même promptitude. C'eſt ce qui a été réïtéré alors cinq à ſix fois de ſuite. J'ai repeté bien des fois cette Expérience avec cette Perche. Je lui ai offert très ſouvent des Polypes, elle a toujours entrepris de les avaler ; mais, à deux fois près qu'elle y a réüſſi, elle les a toûjours rejettés, le moment même après les avoir fait entrer dans ſa bouche. Je lui ai préſenté un Polype, qui tenoit dans ſes bras un Ver qu'elle aimoit beaucoup. Je penſai que ce Poiſſon ſeroit, peut-être, obligé d'avaler le Polype, en avalant le Ver. Il a, en effet, d'abord englouti & le Ver, & le Polype ;

mais, il les a rejettés ſur le champ. Après cela, il les a repris & rendus ſucceſſivement, juſqu'à ce que les aiant ſéparés, il a avalé le Ver, & laiſſé le Polype. J'ai ſouvent repeté cette Expérience en préſence de diverſes perſonnes, que cette ſcène a fort diverties. Je l'ai auſſi faite ſur des Gougeons, & avec le même ſuccès. Au lieu de rejetter les Polypes par la bouche, ils les ont pluſieurs fois fait ſortir par les ouïes. De trois Gougeons, aux quels j'en ai ſouvent préſenté, un ſeul en a avalé une fois un. Il arrive ordinairement, qu'ils rejettent le Polype ſans lui faire le moindre mal; mais, j'en ai vu un, qui ſe trouva fort déchiré, & à peine reconnoiſſable, après que les Poiſſons eurent tenté pluſieurs fois de l'avaler. Cet accident, qui auroit été mortel pour bien d'autres Animaux, fut peu de choſe pour ce Polype: il ſe guérit bientôt.

Je n'ai pu trouver aucune eſpéce de Scarabées aquatiques, auxquels les Polypes puſſent ſervir de proie. Chacun ſait cependant, qu'il y en a de très voraces. J'ai ſur-tout tâché d'en faire manger à ceux d'une eſpéce fort commune. Il s'agit de ces petits Scarabées preſque ovales, & dont les foureaux des aîles ont la couleur & le luiſant de l'acier bruni. On les voit ſouvent par troupes, qui nagent avec une prodigieuſe viteſſe ſur la ſuperficie de l'eau. J'en ai raſſemblé pluſieurs dans un grand verre, où je les ai nourris avec divers Inſectes terreſtres & aquatiques. Lorſqu'ils ſont affamés, ils ſaiſiſſent avec promptitude ceux qu'on fait tenir ſur la ſuperficie de l'eau, & ſe les diſputent les uns les autres avec un grand acharnement. Après en avoir fait jeûner pendant quelque tems,

tems, je leur préſentai un Polype. Il fut d'abord ſaiſi par deux de ces Scarabées; mais, un moment après, ils le lachérent. C'eſt ce que j'ai vu pluſieurs fois. Quelque affamés qu'ils fuſſent, ils ont conſtamment rejetté les Polypes.

AIANT donné un grand Ver à un petit Polype, je préſentai le Polype à mes Scarabées, lorſqu'il eut avalé tout ce Ver, & qu'il fut extrêmement renflé. Quelques Scarabées le ſaiſirent, & mangérent alors, & le Ver, & le Polype dans le corps duquel il étoit. C'eſt le ſeul moïen que j'aie pû trouver, pour leur faire manger des Polypes. Mais ce Fait, ne peut, ce me ſemble, nullement prouver, que ces Animaux ſoient un de leurs alimens ordinaires.

J'AI déjà indiqué, dans le prémier Mémoire, les expédiens que j'emploie, pour trouver des Polypes. J'ai dit, qu'il s'en trouve indifféremment ſur tous les corps qui ſont dans l'eau, qu'il faut les en tirer, les mettre dans un verre plein d'eau, & que bientôt on appercevra les Polypes qui ſeront deſſus, ſur-tout ſi on en a déjà vu, & ſi on leur donne le tems de s'étendre, en laiſſant le verre en repos pendant un moment.

LE foſſé, dans lequel j'ai trouvé les prémiers Animaux de ce genre que j'ai vus, & enſuite les deux autres eſpéces que j'ai découvertes, eſt ſitué au pied des Dunes. Il eſt large d'une vingtaine de pieds. Il forme à un bout un cul-de-ſac, & à l'autre il communique, par un canal étroit, à un ruiſſeau qui parcourt Sorgvliet dans ſa longueur. L'eau de ce foſſé eſt continuellement rafraichie par celle qui ſe filtre dans le

ſable des Dunes, & coule de ce foſſé dans le ruiſſeau dont je viens de parler. Elle eſt claire juſqu'au fond, & extrêmement peuplée d'Inſectes, ſans être, cependant, le moins du monde croupiſſante. C'eſt-là où j'ai vu un nombre prodigieux de Polypes, comme je le dirai dans la ſuite.

J'EN ai cherché dans les autres eaux de Sorgvliet, qui communiquent à celle-là, dans un vivier par lequel paſſe le ruiſſeau, & dans le ruiſſeau même. J'en ai trouvé en différens endroits, ſur-tout de ceux de la troiſiéme eſpéce. J'ai parcouru les bords du ruiſſeau au-deſſus de Sorgvliet, & j'ai pêché des Polypes, même dans des endroits où il n'y avoit que quelques pouces d'eau. Enfin, j'en ai trouvé dans de grands foſſés, qui ſont encore plus près de la Haye que Sorgvliet; & j'ai tout lieu d'être perſuadé, qu'il s'en trouve dans la plupart des canaux & des foſſés de la Hollande.

CEUX, que Leeuwenhoek a vus, ont été tirés du canal qui va de Delft à Delfs-haven. Mr. Allamand, qui a bien voulu repeter la plupart de mes Expériences, & dont je puis alléguer le témoignage, comme une excellente preuve de la réalité des Faits que j'ai découverts; Mr. Allamand, dis-je, en a trouvé en très grande quantité dans la Province de Friſe, & aux environs de Leyde. On en a pêché, au mois de Juillet 1740, un nombre prodigieux dans les foſſés d'une maiſon de campagne, ſituée dans la Province d'Overiſſel. Mr. de Reaumur en a trouvé trois différentes eſpéces autour de Paris. Ces Animaux ont été vus en Angleterre dès l'année 1703, comme nous l'ap-

l'apprend la Lettre anonyme, qui ſe trouve dans les *Tranſactions Philoſophiques* de cette année-là. Dès le mois d'Avril de cette année-ci, (1743) on en a pêché à Hackney, près de Londres, & enſuite en pluſieurs endroits de l'Angleterre, & en Ecoſſe.

Il y a donc lieu de penſer, qu'il ſera facile à la plupart des Naturaliſtes, qui ſouhaiteront de vérifier & de perfectionner mes Expériences, de trouver des Polypes dans les différens païs de l'Europe. Il faut ſur-tout en chercher dans les recoins que forment les foſſés, les mares & les étangs, dans ces endroits où l'on voit que le vent pouſſe & raſſemble les Plantes qui flottent ſur l'eau. Quoiqu'on en ait cherché inutilement quelque part, on doit y revenir, & peut-être y en trouvera-t-on en très grande quantité, huit ou quinze jours après qu'on n'a pu en découvrir un ſeul. Je le ſais par expérience.

Il y a beaucoup moins de Polypes dans les eaux pendant l'Hyver, que dans les autres ſaiſons de l'année; & ils ſont plus difficiles à trouver. Les Plantes aquatiques, ſur leſquelles ils ſe tiennent communément, ne flottent plus, dans cette ſaiſon, ſur la ſuperficie de l'eau, ou ne s'élévent du fond qu'en petite quantité. La plupart ſont des Plantes annuelles, qui pourriſſent à l'approche de l'Hyver, & dont les reſtes vont au fond de l'eau. C'eſt-là auſſi que ſont les Polypes, mais dans une ſorte d'inaction. Il faut avoir la patience de tirer de l'eau, & d'examiner ſouvent bien des choſes, avant que d'en découvrir un ſeul. J'en ai trouvé dans tous les mois d'Hyver. Mais dès que la belle ſaiſon approche, dès le mois d'A-

d'Avril, la Lentille monte à la ſuperficie de l'eau & elle y multiplie, les jeunes Plantes de Prêle pouſſent & s'élévent dans l'eau, tant d'autres Plantes qui flottent ſur l'eau, commencent à croitre. Les Polypes, que la chaleur ranime, montent ſur ces Plantes : ils les parcourent, en cherchant leur proie; & on peut alors les tirer de l'eau avec les Plantes.

A meſure que la chaleur augmentera, il eſt vraiſemblable qu'on en trouvera en plus grande quantité. Si ce n'eſt dans un endroit, ce ſera dans un autre.

J'AI aſſuré, que les Polypes ſe tenoient, en Hyver ſur-tout, au fond de l'eau. C'eſt ce que m'ont appris les Recherches que j'ai faites dans les foſſés dans cette ſaiſon, & les Expériences que j'ai faites dans mon Cabinet. J'en ai tenu pluſieurs dans de grands vaſes, dont le fond étoit garni de terre. Ils ſont reſtés au fond de l'eau ſur cette terre pendant le froid; mais dès qu'ils ont ſenti la chaleur, ils ſont montés le long des parois du vaſe, & de là ſur les Plantes aquatiques que j'y avois miſes, & à la ſuperficie de l'eau. Il ſeroit dangereux pour les Polypes de reſter près de cette ſuperficie pendant la gelée. Ils pourroient ſe trouver expoſés à périr dans la glace. J'ai eſſaïé d'en faire geler. J'en ai vu, qui ont été pendant plus de vingt-quatre heures dans la glace, & qui n'en ſont pas morts; mais un plus grand nombre y a péri : enſorte qu'il eſt naturel de penſer, qu'un pareil ſéjour, ſur-tout quand il eſt un peu long, ne peut qu'être pernicieux aux Polypes. Il importe

te donc beaucoup de prendre des précautions pour préſerver de la gelée ceux ſur leſquels on fait des Expériences.

J'ai vu, pendant une forte gelée, à travers la glace, des Polypes dans le foſſé, où j'en pêche ordinairement. Je me ſuis, pour cet effet, étendu ſur la glace en des endroits où le Soleil donnoit, & éclairoit juſqu'au fond de l'eau. Les Polypes étoient fixés ſur des Plantes & ſur des feuilles qui étoient au fond du foſſé. Il y en avoit de la ſeconde & de la troiſiéme eſpéce. C'eſt le 11 Janvier de cette année * que je les ai conſidérés avec le plus d'attention. Le Thermométre de Prins, expoſé au Nord, avoit été le matin au 16me degré, & à midi au 26me. C'eſt entre midi & une heure que j'ai obſervé les Polypes dans le foſſé. Ils n'étoient pas extrêmement contractés. J'en ai remarqué un qui avoit mangé. Quoique les eaux ne ſoient pas peuplées d'Inſectes en Hyver, comme en Eté, on ne laiſſe pas d'y en voir quelques-uns dans le tems le plus froid. Je remarquai, par exemple, le jour dont je parle, des Pucerons de trois différentes eſpéces qui nageoient, & qui pouvoient ſervir de nourriture aux Polypes. Je fus curieux de ſavoir dans quel degré de froid étoient les Polypes. Aiant fait un trou à la glace, je deſcendis au fond de l'eau, un Thermométre ſuſpendu à une ficelle, & je le laiſſai pendant quelque tems à côté des Polypes. Il étoit, quand je le tirai, au 42me degré. Le froid ne pénétre pas ſi tôt au fond d'un foſſé, que dans un poudrier; enſorte que les Polypes ne ſont pas facilement expoſés, dans leur ſéjour ordinaire, à ce froid que je leur ai fait éprouver dans mes

* 1744.

verres, qui les a entiérement engourdis, & leur a ôté tout appétit.

J'AI toujours tenu mes Polypes dans de l'eau de puits, parce que c'eſt celle que j'ai pu avoir le plus commodément. J'en ai auſſi tenu dans de l'eau de pluye. L'eau de ſource, & de riviére, doit leur être fort convenable. Il eſt aſſez vraiſemblable qu'il y a certaines eaux qui ne conviennent pas aux Polypes: mais il peut arriver ſouvent que les Polypes, qu'on met dans telle ou telle eau, meurent tous en peu de tems, ſans que cela ſoit une preuve qu'elle n'eſt pas propre pour ces Animaux. En ſe donnant quelques ſoins, on éprouve dans la ſuite qu'ils y peuvent vivre.

EXPLICATION
DES FIGURES
DU SECOND MÉMOIRE.

PLANCHE VI.

LA Figure 1, repréſente un Mille-pied à dard; *d* le dard qui eſt à l'extrémité antérieure de cet Animal.

Figure 2, un Polype *a b* de la ſeconde eſpéce, de la bouche duquel ſort une partie *a m*, d'un Mille-pied, dont l'autre partie eſt dans l'eſtomac du Polype.

ON

On voit dans la Figure 3, un bout de ficelle, auquel un Polype *a b* eſt fixé en *b*. Il faut placer ce bout de ficelle ſur le haut d'un grand poudrier, de maniére qu'il repoſe ſur les bords du verre en *b* & en *k*, & que l'endroit *b* trempe dans l'eau. Alors le Polype a de la place pour laiſſer pendre ſes bras, & l'on peut, lorſqu'ils ſont étendus, lui voir faire les manœuvres dont il ſe ſert, pour arrêter une proie, & pour la porter à ſa bouche. *m c n*, eſt un Mille-pied, arrêté par l'extrémité du bras *a c*. Le Mille-pied entraine le bras avec lui, en nageant. Un autre Mille-pied, marqué *m i n* eſt repréſenté déjà fort enlacé dans le bras *a o i*. Le Polype eſt en train de le porter à ſa bouche. Non ſeulement il contracte ſon bras pour cet effet, mais il le diſpoſe en tire-boure, depuis *o* juſqu'en *i*. Un Puceron *p*, eſt arrêté par le bout du bras *a p*, & entraine ce bras, en ſe débattant.

La Figure 4, eſt celle d'un Polype qui a ſaiſi un grand Ver, & qui ſe diſpoſe à l'avaler en double. Les lévres du Polype ſont déjà étendues de côté & d'autre. Ce Ver eſt fort enlacé dans les bras du Polype.

La Figure 5, repréſente un Polype à longs bras, qui vient d'avaler un Ver, lequel eſt fort reconnoiſſable à travers la peau du Polype. Les deux bras, qui avoient arrêté le Ver, ont été avalés en partie avec lui, ſavoir leur bout. On voit en *i* & en *e* la courbure qu'ils forment.

La Figure 6, repréſente un Polype qui avale un Ver en double, par le milieu. Les deux bouts du Ver pendent encore en déhors.

On voit dans la Figure 7, un Polype, dont la bouche *a* eſt ouverte, & dans laquelle ſe trouve déjà en partie un Puceron *p*.

Le Polype de la Figure 8, eſt de la ſeconde eſpéce, il eſt entiérement rempli de Pucerons.

Celui de la Figure 9, eſt de l'eſpéce à longs bras; la portion *a d* de ſon corps eſt remplie de Pucerons, & la queuë *d b* eſt vuide, & fort étroite: il y a un col en *a*.

Tel eſt auſſi le Polype de la Figure 10, & comme il n'eſt pas tout-à-fait ſi rempli vers ſa bouche que l'autre, le col *c* eſt encore plus remarquable.

La Figure 11, repréſente un Puceron branchu, groſſi au microſcope. *b b* ſes branches, ou nageoires, *c* ſon bout antérieur, *e* ſa queuë.

Planche VII.

La Figure 1, repréſente un Polype à longs bras, qui, après avoir arrêté un grand nombre de Pucerons, les a tous raſſemblés en un monceau *a*, près de

de ſa bouche, afin de les avaler les uns après les autres, juſqu'à ce que ſon eſtomac ſoit rempli.

On voit dans la Figure 2, de ces Vers qu'on trouve ſouvent raſſemblés en grande quantité au fond de l'eau. Ils font ſortir de terre une partie de leur corps, & lui font faire des ondulations continuelles.

La Figure 3, eſt celle d'un Polype de la troiſiéme eſpéce, fixé ſur un brin de bois, par ſon bout poſtérieur *b*. Il a avalé un Gardon. La peau du Polype eſt ſi tendue, & ſi mince qu'on a de la peine à l'appercevoir. On ne diſtingue bien que le Poiſſon, & les bras *a c*, *a c*, *a c*, du Polype, qu'on prendroit pour des barbes qui ſortent de la tête du Gardon.

La Figure 4, repréſente deux Polypes, qui ont chacun avalé une partie d'un même Ver, par un de ſes bouts; après quoi leurs têtes ſe ſont rencontrées en *a*. Il arrive quelquefois qu'après cela, un des deux Polypes ouvre davantage ſa bouche, & avale l'autre Polype en partie. C'eſt ce qui eſt repréſenté dans la Fig. 5.

Le Polype de la Figure 6, eſt repréſenté rendant des excrémens *e*, qui ſont les reſtes d'un Ver, qui n'a pas été entiérement digéré.

La Figure 7, repréſente un Ver plat & blanc, dont les inteſtins ſont pleins d'une matiére d'un beau rouge.

La Figure 8, repréſente un Ver rouge *c d* de Tipule, ſur lequel un Polype a appliqué ſes lévres *e i*. Ce Polype le ſuce dans cet état, ſans l'avaler.

On voit dans la Figure 9, une Limace aquatique noire.

La Figure 10, repréſente un Polype groſſi au microſcope, fixé contre un brin de bois par ſon bout poſtérieur *b*. On voit ſur le corps *a b* de ce Polype, ſur ſes bras *a c*, *a c*, *a c*, mais ſur-tout ſur ſon bout antérieur *a*, pluſieurs petits Poux blancs, qui vont & viennent, qui le ſucent & peuvent le faire périr.

La Figure 11, eſt celle d'un Polype, auquel les Poux ont déjà mangé les bras, & la tête.


Fig. 3.
h
b
k
f
g
a
Fig. 4.
o
m
i
n
m
c
n
p
Fig. 11.
b
b
c
c
Fig. 8.
Fig. 7.
Fig. 6.
g.
a
a
p

Digitized by Google

Fig. 2.



Fig. 3.

6

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 9.

Fig. 7.

Fig. 10.

Fig. 8.



MÉMOIRES POUR L'HISTOIRE DES POLYPES.

TROISIÈME MÉMOIRE.

De la Génération des Polypes.

APRÈS m'être assuré, que les Polypes d'eau douce, dont il est question dans ces Mémoires, pouvoient se multiplier par la section, je fus extrêmement curieux de connoitre la maniére dont ils se multiplient naturellement. Je doutois encore, dans ce tems-là, si les Polypes étoient des Plantes, ou des Animaux, & je me

me flattois même, comme je l'ai dit, que leur maniére naturelle de ſe multiplier me fourniroit un Caractére diſtinctif, & propre à me tirer du doute où j'étois.

On voit dans les Lettres de Leeuwenhoek, & de l'Anonyme Anglois, imprimées dans les *Tranſactions Philoſophiques* pour l'Année 1703, que les premiers, & à ce qu'il paroit, les ſeuls Polypes que ces deux Naturaliſtes aient obſervés, étoient en train de multiplier, lorſqu'ils les ont trouvés. Quelque nouveau que fût pour eux le Fait ſingulier que leur préſentoit cette multiplication des Polypes, ils ne s'y trompérent point; & frappés par cette merveille, ils donnérent toute leur attention aux progrès des jeunes Polypes, juſqu'à ce qu'ils fuſſent parfaits, & qu'ils ſe fuſſent ſéparés de leur mere.

J'ignorois la découverte de ces deux Naturaliſtes, lorſque le haſard me préſenta les Polypes, & je ne reconnus pas d'abord leurs petits pour ce qu'ils étoient. Il y avoit cependant pluſieurs Polypes, parmi les premiers que j'ai découverts, qui produiſoient des petits. Je m'étois peu arrêté à les conſidérer, ne m'étant point encore propoſé d'obſerver de ſuite des Polypes; &, lorſque je me mis à les étudier avec ſoin, il ne s'en trouva plus dans mon verre qui fuſſent en train de multiplier.

Ce fut dans le mois de Décembre 1740, que je commençai à chercher quelle étoit la maniére naturelle de multiplier des Polypes. Je n'apperçus rien pendant ce mois là, pendant celui de Janvier, & une partie de Février 1741, qui me donnât lieu de me flatter, que je parviendrois à ſatisfaire ma curioſité

té ſur cet article. C'eſt ſur quoi je ne pouvois guères compter en Hyver: mais, j'attendois avec impatience le tems favorable à la Végétation des Plantes, & à la Multiplication des Animaux. Celui, où je devois trouver ce que je cherchois, arriva même plutôt que je ne l'eſperois. Le 25 Février, j'obſervois avec une loupe un Polype verd, qui étoit fixé ſur le côté du verre, dans lequel je tenois tous ceux, qui n'étoient pas emploiés à quelque Expérience particuliére. J'apperçus, ſur ſon corps, une petite excreſcence d'un verd foncé. Quelque petite que fût cette excreſcence, elle attira toute mon attention, parce que je n'avois jamais rien vu de pareil ſur aucun Polype, quoique j'en euſſe déjà obſervé un aſſez grand nombre. Le Polype, ſur lequel elle étoit, fut dès ce moment très précieux pour moi; &, de peur de le confondre avec pluſieurs autres qui étoient dans le même verre, je l'en tirai, & je le mis à part dans un autre. Il s'attacha contre le côté du verre; & par bonheur il ſe plaça de maniére, que je pouvois facilement obſerver, avec une forte loupe, l'excreſcence qui paroiſſoit ſur ſon corps. Dès le jour même que je la découvris, après l'avoir conſidérée à pluſieurs repriſes, je trouvai quelque rapport entre ſa ſtructure, & celle du Polype dont elle ſortoit. Je ne pouvois, à la vérité, fonder, ſur un rapport auſſi incertain, aucune déciſion aſſurée. Mais, je commençai à ſoupçonner, que cette excreſcence deviendroit un Polype. L'idée de ces Polypes que j'avois vus l'Eté précédent, fixés les uns ſur les autres, me revint à l'eſprit. C'eſt ſur-tout ce qui me fit penſer que l'ex-

creſcence, que j'obſervois, étoit un jeune Polype, qui ſortoit d'un autre. Je ceſſai mes Obſervations du 25 Février à dix heures & demie du ſoir, non ſans impatience de revoir ce Polype qui m'avoit occupé une partie de cette journée.

J'EUS le lendemain matin le plaiſir de voir, que ſon excreſcence étoit augmentée en longueur; elle avoit environ un quart de ligne de long. Elle étoit à peu près cylindrique, & ſituée perpendiculairement ſur le Polype. Elle augmenta ſenſiblement le 26, & le 27. Le 28, elle avoit pour le moins une demi-ligne de longueur. Lorſque je faiſois contracter le Polype, elle ſe contractoit auſſi. Enfin, tout conſpiroit à me perſuader que cette excreſcence étoit un jeune Polype, & il ne me manquoit plus, pour en être aſſuré, que de voir ſortir de ſon ſommet, ces fils déliés, que j'ai nommés les pieds & les bras des Polypes. Je les cherchois continuellement; & ce jour même, 28me. Février, à dix heures du ſoir, j'en apperçus quatre, qui commençoient à pouſſer. Ce ne fut pas ſans un ſenſible plaiſir, que je les apperçus, ni ſans une extrême curioſité de voir la fin d'un Phénoméne ſi nouveau pour moi. Les jours ſuivans, les quatre bras du jeune Polype s'allongérent, & il en parut un cinquiéme. Le Polype même croiſſoit ſenſiblement. Je l'ai vu, lorſqu'il tenoit encore à ſa mere, s'étendre pour le moins juſqu'à la longueur de trois lignes. Il s'en eſt ſéparé le 18me. Mars, entre dix & onze heures du matin.

AVANT que ce jeune ſe fût ſéparé de ſa mere, j'en vis d'autres qui ſortoient auſſi de quelques-uns des Po-

Polypes, qui vivoient enſemble dans mon grand verre.

Je trouvai, dans le mois d'Avril *, la ſeconde eſpéce de Polypes, dont j'ai parlé dans les Mémoires précédens; & le premier de cette eſpéce, que je vis, avoit cinq petits, qui ſortoient à la fois de ſon corps. Ceux de l'eſpéce à longs bras en produiſoient auſſi, quand je les découvris: & les Obſervations ſuivies, que j'ai faites ſur les uns & ſur les autres, m'ont prouvé qu'ils multiplioient tous de la même maniére. * 1741.

Comme les Polypes de la ſeconde, & de la troiſiéme eſpéce, ſont beaucoup plus grands que les Polypes verds, il eſt plus facile d'obſerver les progrès des jeunes qu'ils produiſent. C'eſt auſſi ſur ces deux eſpéces, que j'ai ſouvent repeté les Obſervations, que j'ai d'abord faites ſur l'autre.

Lorsqu'un jeune Polype commence à pouſſer, on ne voit d'abord qu'une petite excreſcence, qui ordinairement ſe termine en pointe *. Elle a à peu près la figure d'un cône, mais d'un cône, dont la baſe eſt grande à proportion de ſa hauteur. La couleur de cette excreſcence, de ce petit bouton, eſt d'ordinaire plus foncée que celle du corps de la mere. Peu à peu ce bouton s'éléve davantage, & à meſure qu'il s'allonge, il forme un cône, dont la baſe devient plus petite, à meſure qu'il augmente en hauteur. Ce cône eſt ſouvent mal formé, ſa pointe eſt arondie, ou bien il paroit tronqué. Quelques degrés d'accroiſſement de plus, font enfin perdre, au jeune Polype, la forme cônique: il devient à peu près cylindrique; & c'eſt alors, ou environ ce tems-là, que les bras commencent à pouſſer à ſon * PL. VIII. Fig. 1. e.

* PL. VIII. Fig. 1. *c i.* extrémité antérieure *. Ce jeune Polype ne conſerve pas long-tems la figure d'un cylindre, ſon bout poſtérieur, par lequel il tient à ſa mere, s'étrécit peu à peu, il s'étrangle, & enfin il ne paroit la toucher * Fig. 2. *b.* que par un point *. Le jeune Polype, qui, dans ſes commencemens, étoit beaucoup plus large à ſon bout poſtérieur, n'eſt nulle part ſi mince, après qu'il eſt formé.

QUAND le jeune Polype n'eſt pas fort avancé, & que ſon bout poſtérieur eſt peu ou point étranglé, il reſte toûjours dans la même ſituation à l'égard du corps de ſa mere, il conſerve la même direction avec laquelle il en eſt ſorti, qui eſt le plus ſouvent perpendiculaire; mais quelquefois plus ou moins oblique. Lorſque l'étranglement eſt déjà conſidérable, & que le jeune Polype tient moins à ſa mere, il ne garde plus une ſituation fixe, il varie ſon inclinaiſon ſur le corps de la mere. Si ce jeune ne ſe ſoutenoit pas par ſa propre force, il pendroit alors en bas: mais, on voit clairement qu'il ſe ſoutient par lui-même, & qu'il exécute, pour varier la direction de ſon corps, tous les mouvemens que fait un Polype, fixé contre les parois d'un verre.

LE Polype eſt prêt à ſe ſéparer de ſa mere, lorſ- * Fig. 2. *a b.* qu'il ne lui eſt plus attaché que par un point *. Il eſt aſſez facile de s'imaginer comment cette ſéparation ſe fait: mais, j'ai voulu la voir; &, à force d'en épier le moment, je l'ai rencontré pluſieurs fois. J'ai vu de jeunes Polypes, des trois eſpéces que je connois, ſe ſéparer de leurs meres. Ils ſe ſéparent tous de la même maniére. La mere & le jeune s'at-

Digitized by Google

s'attachent au verre, ou aux autres corps ſur leſquels ils ſe trouvent, avec leurs bras, & même avec leur tête. Ce ſont-là les préparatifs que font les Polypes pour ſe ſéparer. Il ne s'agit plus, pour en venir à bout, que de faire un effort; & il n'eſt pas néceſſaire qu'il ſoit conſidérable. C'eſt quelquefois la mere, qui fait cet effort; d'autres fois le jeune, & ſouvent tous deux. On conçoit aiſément, que les Polypes, étant ſuſceptibles d'un grand nombre de dégrés de contraction, d'extenſion, & d'inflexion; & pouvant ſe cramponner contre les corps, dans la plupart des attitudes très variées, qu'ils peuvent prendre: on conçoit, dis-je, que les meres, & les jeunes ne ſe mettent pas toujours préciſément dans la même ſituation, quand ils ſe préparent à ſe ſéparer: Au contraire, elle varie beaucoup: mais, dans le fond, l'opération, dont il s'agit, revient toûjours à l'idée générale que j'en ai donnée. Je me contenterai de décrire un ſeul cas particulier.

UN Polype *, qui avoit un petit, prêt à ſe ſéparer †, diſpoſa ſon corps en arc de cercle ‡, & attacha ſes deux extrémités * contre le côté du poudrier. Le jeune tenoit au haut de cet arc †, & ſa tête ‡ étoit fixée contre le verre. La mere ne fit que contracter un peu ſon corps, qui par-là devint la corde * de cet arc de cercle qu'il formoit auparavant. Ses deux extrémités reſtérent attachées contre le verre. Le jeune, qui étoit cramponné contre le verre avec ſes bras, ne ſuivit point la mere lorſqu'elle ſe retira. Il reſta à ſa place, ſon bout poſtérieur * ſe détacha du corps de la mere *: ils ſe ſéparérent, & ſe trou-

* PL. VIII. Fig. 3. *a b.*
† *c d.*
‡ *a d b.*
* *a* & *b.*
† *d.*
‡ *c.*
* Fig. 4. *a b.*
* *d.*
* *a b.*

trouverent même d'abord à quelque diſtance l'un de l'autre *.

* Pl. VIII. Fig. 4.

J'ai vu cette ſéparation ſe faire, quoique la mere ne fût fixée que par ſon bout poſtérieur. Elle s'opére même quand l'un & l'autre bout ne tiennent qu'à la ſuperficie de l'eau. Ils y trouvent un appui ſuffiſant pour cela. J'ai ſouvent hâté la ſéparation, en donnant un petit coup au jeune Polype, avec le bout d'un pinceau, ou bien en agitant la mere dans l'eau. Ce dernier expédient a ſuffi une fois, pour faire détacher trois petits d'une mere, qui en avoit pluſieurs. Il m'eſt arrivé d'engager, au bout d'un pinceau, les bras d'un jeune Polype, & de le tenir ſuſpendu dans l'eau. Je l'ai enſuite ſecoüé, & avec lui la mere qui pendoit en deſſous. Ils ſe ſont alors ſéparés l'un de l'autre, la mere eſt tombée au fond du verre, & le jeune eſt reſté attaché au bout du pinceau.

Dès qu'un jeune Polype eſt ſéparé de ſa mere, il peut marcher, & faire tous les mouvemens dont ces Animaux ſont ſuſceptibles.

Les bras des jeunes Polypes commencent à pouſſer, comme je l'ai déjà dit, à peu près lorſque ces jeunes ont pris la forme d'un cylindre *. J'ai dit à peu près, parce que ces bras peuvent, cependant, ſortir plûtôt, ou plus tard; & que les changemens de forme qu'on remarque dans un jeune Polype, pendant ſon accroiſſement, ne ſont pas toûjours les mêmes, & ne ſe ſuccédent pas toûjours avec la même régularité.

* Fig. 1. ci.

Il ne paroit d'abord que quatre ou cinq bras; &, quand ces bras ont déjà fait quelques progrès, il en ſort

ſort d'autres dans les intervalles que les premiers laiſſent entre eux.

Tous les Polypes d'une même eſpéce, n'ont pas le même nombre de bras lorſqu'ils ſe ſéparent de leurs meres. Il en vient encore plus ou moins aux uns ou aux autres, après leur ſéparation.

J'ai déjà dit dans le premier Mémoire *, que tous les individus des trois eſpéces de Polypes, que je connois, n'avoient pas un nombre égal de bras, & j'ai marqué, avec autant de préciſion qu'il m'a été poſſible, quelle étoit la différence, qu'on trouve dans ces Animaux à cet égard. C'eſt ſur les Polypes de la ſeconde eſpéce, que j'ai obſervé de ſuite l'accroiſſement du nombre des bras; parce que ce ſont ceux que j'ai nourris le plus long-tems. J'ai vu dans quelques-uns ce nombre augmenter, plus d'une année après leur naiſſance, & parvenir même peu à peu juſqu'à celui de dix-huit * & de vingt. Je n'ai jamais pu trouver dans les foſſés, des Polypes qui euſſent un ſi grand nombre de bras, je ne l'ai remarqué que dans ceux que j'ai nourris. J'ai auſſi obſervé quelquefois que le nombre de leurs bras diminuoit.

* Pag. 24.

* Pl. X. Fig. 3.

Un jeune Polype peut ſe ſervir de ſes bras, pour arrêter une proie, avant qu'il ſoit ſéparé de ſa mere. C'eſt ce dont il eſt bien facile de s'aſſurer. Il ſuffit de faire tomber un Ver, ou quelque autre petit Animal, ſur de jeunes Polypes, qui tiennent encore à leur mere. On le leur verra ſaiſir, lors même qu'ils n'auront encore que quelques bras; & que ces bras n'auront pas fini leur croit. Cette Expérience apprendra en même tems, que la bouche des jeunes Polypes

pes eſt formée avant leur ſéparation. Ils l'ouvriront pour faire entrer le Ver dans leur eſtomac : en un mot, ils feront tout ce que j'ai décrit, en parlant en général, dans le Mémoire précédent, de la maniére dont les Polypes arrêtent leur proie, la portent à la bouche, & l'avalent.

Les jeunes Polypes ne mettent pas toûjours le même eſpace de tems à pouſſer. On remarque à cet égard beaucoup de variété ; & cela, ſuivant qu'il fait plus ou moins chaud, & ſuivant la quantité de nourriture que prennent les Polypes. J'ai vu de jeunes Polypes être parfaitement formés, au bout de 24 heures ; & d'autres ne l'être qu'au bout de 15 jours. Les premiers pouſſoient dans le fort de l'Eté, & les autres dans une ſaiſon, où l'eau, dans laquelle ils étoient, faiſoit deſcendre le Thermométre de Prins au-deſſous du 48me. degré ; c'eſt-à-dire, au-deſſous du degré, qui marque le tempéré.

Les mêmes circonſtances, qui font que les jeunes Polypes pouſſent plus ou moins vîte, ſont auſſi celles qui influent ſur la durée de leur union avec leurs meres. Plûtôt ils ſont formés, plûtôt ils ſont en état de s'en ſéparer. Auſſi voit-on, en Eté, très ſouvent des jeunes qui ſe détachent de leurs meres, deux jours après avoir commencé à pouſſer ; au-lieu qu'il s'écoule quelquefois, en Hyver, cinq ou ſix ſemaines, avant qu'ils s'en ſéparent.

Tous les jeunes Polypes ne ſont pas également grands, lorſqu'ils ſe ſéparent de leurs meres. Cela varie, ſuivant la quantité de nourriture qu'ils ont reçue pendant leur union, & ſuivant

vant pluſieurs circonſtances qu'il ſeroit inutile de ſpécifier.

Il n'arrive pas réguliérement, qu'un jeune Polype ſe détache de ſa mere, dès qu'il eſt bien formé, & que ſon bout poſtérieur, par lequel il lui eſt uni, eſt fort étranglé. Si la mere eſt fixée quelque part où elle, & ſes petits ſoient toujours à portée de ſaiſir autant de proies qu'ils en peuvent manger, leur ſéparation n'a ſouvent lieu, dans le tems même le plus chaud, que pluſieurs jours après que ces jeunes ſont parvenus au point où ils auroient pu ſe ſéparer. Mais, quand la nourriture manque, les jeunes Polypes ſe ſéparent plûtôt. Il eſt apparent, que, preſſés par la faim, ils ſe détachent pour aller chercher ailleurs de quoi la ſatisfaire.

Je rapporterai bientôt mes Obſervations ſur le dégré de chaleur néceſſaire pour faire pouſſer les jeunes Polypes, & ſur la durée de leur union avec leur mere. C'eſt pourquoi je ne m'étendrai pas davantage ici ſur cet Article.

On pourroit, peut-être, dire, que les jeunes Polypes ne ſortent point réellement du corps des vieux; mais, que ſeulement des œufs, ou de petits Polypes, ont été dépoſés, & fixés ſur leur peau, & qu'ils y reſtent attachés pendant qu'ils croiſſent. C'eſt un ſoupçon, que doivent naturellement former ceux qui n'ont pas examiné la choſe par eux-mêmes, & qui peut auſſi venir dans l'eſprit de ceux, qui l'examinent pour la premiére fois. Mais, dès qu'on obſerve avec attention un jeune Polype à la loupe, & ſurtout lorſqu'on ſuit ſes progrès, on ne peut preſque

plus douter, que la mere ne le pouſſe hors de ſon corps, comme un tronc d'arbre pouſſe une branche. On voit diſtinctement, que cette excreſcence, qui eſt le commencement d'un jeune Polype, n'eſt qu'une continuation de la peau de la mere; que cette peau s'eſt renflée, s'eſt élevée en cet endroit: & même, il n'eſt pas impoſſible de voir, qu'elle forme déjà un petit tuïau, qui communique avec celui que forme la peau de la mere, ou, pour parler autrement, avec ſon eſtomac. C'eſt-là ce que mes premiéres Obſervations m'ont appris: mais, j'avois trop d'intérêt de m'aſſurer plus poſitivement de ce Fait, pour m'en tenir là. Je n'ai donc rien négligé, pour faire des Expériences plus déciſives, ſur la maniére dont les jeunes Polypes ſont unis avec leurs meres.

Il s'agiſſoit ſur-tout de ſavoir, ſi l'eſtomac des jeunes Polypes communique avec celui des meres. On doit ſe rappeller ici ce que j'ai dit de la ſtructure de ces Animaux*. Leur corps eſt percé d'un bout à l'autre: il forme une ſorte de tuïau, ou de boïau; & c'eſt ce tuïau, que j'ai appellé l'eſtomac des Polypes. Je me propoſai donc, pour m'aſſurer de l'étroite union, qui me paroiſſoit être entre un jeune Polype & ſa mere, de chercher, ſi les tuïaux, que forment leurs corps, avoient un trou de communication; ſi l'eſtomac du jeune Polype n'étoit, par rapport à celui de la mere, que ce que ſont certains vaiſſeaux du corps humain, qui s'ouvrent les uns dans les autres.

* Pag. 50.

La premiére Expérience que je fis, pour parvenir à mon but, fut de tâcher d'ouvrir un Polype de maniére, que je puſſe voir diſtinctement le trou de com-

communication, en cas qu'il y en eût, un, en effet entre l'eſtomac de cette mere, & celui de ſon petit. Je choiſis un aſſez grand Polype de la ſeconde eſpéce, duquel ſortoit un jeune, dont le bout poſtérieur, l'endroit par lequel il tenoit à la mere, n'avoit pas encore commencé à s'étrangler, afin que s'il y avoit un trou de communication, il fût d'autant plus ſenſible. Je mis ce Polype dans un peu d'eau, dans le creux de ma main, & je me plaçai de maniére, que je pouvois, quand je voulois, éclairer davantage mon objet, en l'expoſant au Soleil. Enſuite, je coupai, avec des ciſeaux, environ la moitié du corps du jeune Polype. Son eſtomac fut alors ouvert, au bout ſupérieur de cette partie, qui reſtoit attachée à la mere, il y avoit une ouverture, par laquelle je regardai avec le ſecours d'une loupe; & il me ſembla, qu'en effet, cet eſtomac du jeune Polype communiquoit avec celui de la mere. Mais, je pouvois me faire illuſion. Il convenoit, pour que je fuſſe plus ſûr de ce que je voiois, que cet endroit, où devoit être la communication, fût davantage éclairé. Je coupai donc le corps de la mere, de côté & d'autre de l'endroit d'où ſortoit le jeune Polype. Il ne reſta alors qu'une portion cylindrique fort courte, & ouverte par les deux bouts. Ces deux ouvertures ſervirent à introduire plus de jour dans la portion qui reſtoit du corps de la mere; &, par conſéquent à éclairer davantage cet endroit où devoit être l'ouverture de communication entre elle & le jeune. Je regardai de nouveau par le bout ſupérieur & ouvert de la portion reſtante du jeune Polype, & je vis très

ſenſiblement plus de jour à l'endroit où il tenoit à ſa mere: il me ſembloit même que je voiois dans l'eſtomac de la mere. Mais, il ſe pouvoit encore, qu'il y eût, à cet endroit où ſe joignoient les deux Polypes, une peau, qui n'empêchât pas le paſſage de la lumiére, & qui cependant ſéparât les deux eſtomacs. C'eſt ce qui reſtoit à examiner. Ce fut dans ce deſſein, que je coupai, ſuivant ſa longueur, la portion cylindrique reſtante de la mere, j'enlevai la moitié oppoſée à celle dont le jeune ſortoit, & je mis par-là tout à fait à découvert cet endroit de l'intérieur de l'eſtomac de la mere, où devoit être le trou de communication avec celui du jeune. Je le vis alors très diſ-

* PL. VIII. Fig. 5. *t.* tinctement*: & en regardant par ce trou, avec le ſecours d'une loupe, j'apperçus l'ouverture qui étoit

* *o.* au bout de la portion reſtante du jeune *. Aiant enſuite fait changer de ſituation à ces deux portions de Polypes ainſi préparées, je regardai par cette derniére ouverture*, & je vis très clairement le jour à tra-

* Fig. 6. *t.* * *i.* vers le trou de communication *. Afin qu'il ne me reſtât aucun ſcrupule, je mis ces portions de Polypes dans un petit verre plat, & je les obſervai encore à la loupe avec beaucoup d'attention. Je vis, en les diſpoſant comme elles avoient déjà été diſpoſées ſur ma main; je vis, dis-je, le trou de communication que je cherchois, de maniére à n'avoir plus le moindre lieu de douter de ſa réalité.

Je ne me ſuis pas contenté de faire cette Expérience une fois: je l'ai entrepriſe ſept fois, & j'ai réüſſi cinq.

On ne peut guères nourrir des Polypes, lorſqu'ils pouſ-

pouſſent des jeunes, ſans avoir occaſion de remarquer un Fait, qui démontre cette ouverture de communication qu'il y a entre l'eſtomac de la mere, & celui de ſon petit. Après que la mere a mangé *, on voit le corps des jeunes Polypes qui lui ſont attachés, s'enfler, ſe remplir d'alimens, comme s'ils en avoient eux-mêmes pris par la bouche *: &, pour peu qu'on les obſerve, on a tout lieu de juger, que ces alimens ſont paſſés de l'eſtomac de la mere dans le leur, par l'ouverture de communication qui eſt entre eux. Mais, la preuve devient encore plus parfaite, ſi l'on peut voir, en effet, ces alimens paſſer de l'eſtomac de la mere dans celui de ſes petits: & c'eſt ce dont on trouvera l'occaſion, pour peu qu'on travaille à ſe la procurer.

* PL. VIII. Fig. 7. *a b.*

* *c, d, e, i, d.*

Je nourriſſois à part, dans un poudrier, un Polype à longs bras, dont un jeune ſortoit, environ à une ligne de diſtance de la tête. Il étoit fixé contre les parois du verre, & il avoit la tête en bas. Au ſimple coup d'œil, il me parut qu'il y avoit une ouverture de communication très grande, entre ce Polype & ſon petit. Le tout que formoient ces deux Polypes, reſſembloit à un vaiſſeau, qui ſe ſépare en deux, aſſez près d'une de ſes extrémités. Pour m'aſſurer plus préciſément de ce qui en étoit, je donnai un Mille-pied à dard à la mere, & un autre au jeune Polype. Chacun de ces deux Polypes commença à avaler ſon Mille-pied: & je les vis d'abord entrer peu à peu; l'un dans la portion de l'eſtomac de la mere, priſe de l'endroit où le jeune ſortoit juſqu'à la tête; & l'autre dans l'eſtomac du jeune. Lorſque

que ces Mille-pieds furent parvenus à l'endroit, où ſe faiſoit la jonction des deux eſtomacs, ils paſſérent tous deux dans la portion commune, c'eſt-à-dire, dans la partie poſtérieure de l'eſtomac de la mere; & il ne reſta rien dans les portions d'eſtomac ſéparées, ſavoir, dans celui du jeune, & dans la portion de celui de la mere, priſe de l'endroit où le jeune ſortoit, juſqu'à la tête. C'eſt dans l'eſtomac commun, dans le reſte de celui de la mere, que les deux Mille-pieds furent digérés & réduits en une ſorte de bouillie. Cette matiére commença alors à être balottée d'une maniére ſenſible dans le corps du Polype: elle alloit & venoit, de l'eſtomac commun, dans les portions ſéparées, & des portions ſéparées dans l'eſtomac commun. Quelquefois elle paſſoit toute dans une de ces portions ſéparées, & d'autres fois il en paſſoit une partie dans chacune. J'ai repeté très ſouvent cette Expérience, & avec toute la variété dont elle eſt ſuſceptible.

Après avoir été témoin des Faits, que je viens de rapporter, il ne m'étoit plus poſſible de douter, le moins du monde, de la communication qu'il y avoit entre une mere Polype & ſon petit. Il étoit clair, que la peau de ce petit, n'eſt abſolument qu'une continuation de celle de la mere, & que les Polypes multiplient véritablement par rejettons, comme nombre de Plantes.

Il y a plus, les jeunes Polypes, comme je l'ai déjà indiqué pluſieurs fois, ne pouſſent pas à un ſeul endroit déterminé. On en voit ſortir ſucceſſivement, & ſouvent en même tems, de pluſieurs endroits: &

j'ôſe

j'ôſe même avancer, à l'égard de quelques Polypes que j'ai nourris pendant plus de deux années, qu'il y a peu ou point d'endroits de leur corps, dont il ne ſoit ſorti des petits.

Les jeunes ne ſortent pas, dans les Polypes à longs bras, de la partie poſtérieure, de cette eſpéce de queuë que forme leur corps en ſe retréciſſant *. Ils ne ſortent que de l'autre partie *. Mais, quant aux Polypes de la ſeconde eſpéce, je leur ai vu pouſſer des jeunes, même très près de leur extrémité poſtérieure. Cependant, il eſt vrai, que cela eſt aſſez rare.

* PL. VIII. Fig. 8. *b c.*
* *a c.*

La ſeconde Expérience, que j'ai rapportée *, pour prouver que l'eſtomac des jeunes Polypes communique avec celui des meres, a pu en même tems faire connoître l'uſage de cette communication. On a vu, que le ſuc nourricier, extrait des alimens dans l'eſtomac de la mere Polype, étoit porté dans l'eſtomac du jeune. C'eſt à quoi ſert ce mouvement qui ſe fait quelquefois remarquer dans les Polypes, & dont j'ai prouvé la réalité dans le Mémoire précédent *. J'y ai fait voir, que ce mouvement ſert à répandre le ſuc nourricier dans tout l'eſtomac, & même à le conduire dans les bras, d'où il eſt enſuite renvoié dans le corps.

* Pag. 163.

* Pag. 121.

Il étoit bien vraiſemblable, que les alimens digérés dans l'eſtomac d'une mere Polype, & paſſés enſuite dans l'eſtomac de ſes petits, ſervoient à les nourrir Mais, j'ai cherché à avoir une démonſtration parfaite de cette vérité, & elle n'a pas été difficile à trouver.

J'ai donné à diverſes meres Polypes de ces alimens.

mens d'une couleur bien marquée, dont je me ſuis ſervi pour faire les Expériences rapportées, dans le ſecond Mémoire, de ces vers plats dont les inteſtins ſont pleins d'une matiére rouge *. Une partie des alimens rouges a paſſé dans l'eſtomac des jeunes Polypes, & ils ont pris, comme leur mere, une couleur rouge : ce qui prouve que ces alimens ont ſervi à les nourrir, ainſi qu'on en peut juger par ce qui a été dit ci-deſſus *.

* PL. VII. Fig. 7.

* Mém. II. Pag. 126. &c.

Il n'eſt pas étonnant que des Animaux, qui ſont encore unis à leur mere, tirent d'elle leur nourriture. C'eſt ce qu'un grand nombre d'Expériences nous ont appris depuis long-tems. Mais, les Polypes nous font voir plus que cela ; ſavoir, des petits, qui nourriſſent leur mere, lorſqu'ils lui ſont encore unis, tout comme la mere même les nourrit.

Ces petits, comme je l'ai déjà dit, ſaiſiſſent des proies, les avalent, & les digérent, avant que de ſe ſéparer de leur mere. Les alimens paſſent enſuite, après la digeſtion, de leur eſtomac dans celui de la mere, de la même maniére que ceux, que la mere a pris, paſſent dans l'eſtomac des jeunes. C'eſt ce que j'ai vu très ſouvent : & l'on juge bien, que je n'ai pas négligé de donner à pluſieurs petits, pendant leur union avec leur mere, des alimens rouges ou noirs. Le ſuccès a été tel, que j'avois lieu de l'attendre : les meres ont pris la couleur des alimens que les jeunes avoient mangés ; elles ont été nourries par leurs petits.

Quand les Polypes ſont placés dans des endroits, où les Inſectes, qui leur ſervent de nourriture, abondent,

dent, les meres & les petits dévorent ſouvent, en même tems, pluſieurs proies, qu'ils ont attrapées; & ces alimens, qui ſe trouvent d'abord à part dans leur eſtomac, ſe mêlent enſuite, lorſqu'ils ſont réduits en ſubſtance liquide, ou en bouillie. C'eſt ce qu'il eſt facile de voir, en donnant, par exemple, à une mere, un Ver à entrailles rouges, & au jeune un morceau de Limace noire. On découvre, quelque tems après, du ſuc rouge dans l'eſtomac du jeune, & du ſuc noir dans celui de la mere. J'ai même vu chacune de ces matiéres, noire & rouge, paſſer d'un eſtomac dans l'autre. D'abord, elles étoient bien diſtinctes: mais, à force d'être portées & reportées de part & d'autre, elles ſe méloient, & formoient un tout d'une couleur mêlée de noir & de rouge; & c'eſt la couleur qu'avoient la mere & le jeune, après que la nutrition étoit achevée. Ce qui prouve clairement, que la mere & le jeune profitent en commun des alimens, que chacun prend en particulier.

J'AI fait voir, qu'un jeune Polype nourrit ſa mere, je dois encore ajouter, que ſi elle porte en même tems d'autres jeunes, ce premier peut auſſi les nourrir. Le ſuc nourricier, qu'il a tiré des alimens qu'il a pris, après être paſſé de ſon eſtomac dans celui de la mere, eſt enſuite répandu dans celui des autres jeunes. Cette mere, avec ſes petits, peut être conſidérée comme un vaiſſeau qui a pluſieurs branches, qui ont toutes entre elles une libre communication. Auſſi, lorsqu'on donne à un ſeul petit des alimens de couleur rouge, par exemple, on voit bientôt les autres ſe remplir du ſuc, qui en a été extrait,

& prendre enſuite, de même que la mere, & le petit qui a mangé pour tous, une teinte de rouge, plus ou moins forte, ſuivant que le ſuc a été plus ou moins abondant.

A meſure que l'extrémité poſtérieure, celle par laquelle un jeune Polype eſt attaché à ſa mere, s'étrangle, le trou de communication, qui eſt entre leurs eſtomacs, diminue, & enfin il ſe ferme, & la communication ceſſe. Pour juger de la durée de la communication qu'il y a entre l'eſtomac d'une mere & celui de ſon petit, j'en ai nourri de ſuite; & chaque fois que j'ai donné à manger à la mere, ou au petit, j'ai eu ſoin d'examiner avec attention, ſi le ſuc paſſoit encore d'un eſtomac dans l'autre. Dans les commencemens, des fragmens des alimens alloient & venoient de l'eſtomac de la mere dans celui du jeune Polype, & de l'eſtomac du jeune dans celui de la mere. Enſuite, l'ouverture de communication étant devenue plus petite, il n'y avoit plus que le ſuc tout ſeul, qui pût ſe communiquer; &, enfin, j'ai remarqué pluſieurs fois, en donnant des alimens rouges à la mere, ou à ſon petit, qu'il ne paſſoit de l'un dans l'autre aucune partie ſenſible de ce ſuc, très facile à appercevoir, à cauſe de la vivacité de ſa couleur: ce qui prouve que l'ouverture de communication étoit alors fermée; à ſavoir, le trou qui étoit dans la peau de la mere.

J'ai fait avec ſuccès les Expériences, dont je viens de parler, ſur les Polypes de la ſeconde & de la troiſiéme eſpéce.

Au reſte, ces Expériences ne réüſſiſſent pas toûjours

jours à ſouhait. Les Polypes ne prennent pas toûjours également bien les alimens qu'on leur offre: ils ne ſont pas d'ailleurs toujours placés comme il faut, pour être obſervés commodément avec une loupe. On ne doit donc pas ſe rebuter, pour quelque manque de ſuccès: mais il faut tenter de nouveau ce qui n'a pas réüſſi. Il eſt même bon de repeter pluſieurs fois les Expériences qui réüſſiſſent. Tout ce qui ſe peut voir, ne ſe découvre pas, & ſouvent ne peut pas être découvert la premiére fois.

ON a vu dans le ſecond Mémoire *, que deux Polypes ſe diſputent la même proie. C'eſt ce qui arrive même entre une mere & ſon petit. Elle lui enleve quelquefois des Pucerons, ou des Vers, qu'il a commencé à avaler, & elle l'avale lui-même en partie. Le petit, dans l'occaſion, fait auſſi des efforts pour enlever la proie, que ſa mere a priſe: mais, je n'ai jamais vu finir ces combats par la mort de l'un ou de l'autre. Ils ſe quittent enſuite, ſans s'être fait de mal.

* pag. 112.

J'AI ſeulement remarqué en général, juſqu'à préſent, qu'un Polype produit en même tems pluſieurs petits; mais, je n'ai pas encore indiqué, à quel point peut aller la fécondité de ces Animaux.

POUR ſe mettre en état de juger, par ſes propres yeux, de la fécondité des Polypes, il ſuffit d'en nourrir de ſuite quelques-uns pendant l'Eté. J'en ai même nourri un grand nombre, & j'ai pris beaucoup de précautions en faiſant mes Expériences, non ſeulement, parce que je ne voulois rien négliger de ce qui

pouvoit contribuer à me donner quelques lumiéres ſur cet article; mais auſſi, parce que les Polypes, ſur leſquels je les ai faites, devoient en même tems ſervir à d'autres Expériences, qui demandoient beaucoup d'exactitude. Il me paroit néceſſaire d'expoſer ici toutes les précautions que j'ai priſes, parceque c'eſt ſur elles, que doivent être fondées les Preuves des Faits que je rapporterai.

J'AI choiſi pour ſujets des Expériences que j'ai faites, de jeunes Polypes nouvellement ſéparés de leurs meres; & je les ai mis en ſolitude dans des poudriers. Afin de ne courir aucun riſque de confondre ces poudriers, j'ai colé un Numero ſur chacun d'eux, & j'ai marqué le même Numero dans le Livre que j'avois préparé, pour écrire le Journal de mes Obſervations. Les verres, dans leſquels étoient ces Polypes ſolitaires, ont toujours été remplis d'Animaux propres à les nourrir. Je me ſuis ſervi de ces Pucerons, dont j'ai déjà beaucoup parlé dans le Mémoire précédent *: Il n'y a point de nourriture plus commode. Un Polype, dont le poudrier en eſt bien garni, peut continuellement manger autant qu'il veut; & c'eſt ce qui étoit néceſſaire pour le ſuccès de mes Obſervations. J'ai eu le bonheur de trouver ſans interruption, pendant plus de ſix ſemaines, autant de ces Pucerons, que j'en ai eu beſoin. Tous les deux jours, j'en donnois de nouveaux à mes Polypes, avec de nouvelle eau; & je nettoiois leurs verres quand cela étoit néceſſaire. C'eſt un ſoin que j'ai toûjours pris moi-même, parce que j'ai voulu pouvoir être parfaitement ſûr, que chaque Polype avoit bien été remis dans

* Pag. 92.

ſon

ſon verre. J'ai pris toutes les précautions poſſibles, pour ne pas me tromper à cet égard. Deux fois par jour, j'ai viſité mes verres, j'ai examiné avec attention le Polype que chacun contenoit, & j'ai marqué dans mon Journal ce que j'ai obſervé.

ENTRE le 1 & le 10 Juin 1741, j'ai mis en ſolitude, vingt Polypes de la ſeconde eſpéce; & entre le 20 & le 23 du même mois j'y en ai mis quatorze de la troiſiéme. En peu de jours, il en eſt mort trois des vingt de la ſeconde eſpéce; & onze des quatorze de la troiſiéme. J'en avois mis pluſieurs en ſolitude, afin que mes Obſervations ne fuſſent pas interrompues, par la mort de quelques Polypes. L'Expérience me prouva, que cette précaution étoit néceſſaire.

J'AI marqué avec ſoin, dans mon Journal, l'ordre de la naiſſance des petits qu'ont produits mes Polypes ſolitaires, le jour auquel chaque petit à commencé à pouſſer, & celui dans lequel il s'eſt ſéparé. Dès que je trouvois un jeune Polype ſéparé, je l'ôtois du verre de ſa mere; & s'il étoit choiſi, pour un de ceux de cette génération, ſur laquelle je voulois faire les mêmes Expériences que ſur la génération précédente, je le mettois auſſi en ſolitude, & je l'obſervois avec les mêmes précautions. Vingt jeunes Polypes de la ſeconde eſpéce, & huit de la troiſiéme, provenus de ceux de la premiére génération des ſolitaires, ont auſſi été mis, chacun à part, dans des verres. J'ai continué à en mettre en ſolitude de génération en génération, juſqu'à la ſixiéme. J'ai écrit dans mon Journal, à l'article de chaque jeune,

de quel Polype ce jeune étoit né, le jour auquel il avoit commencé à pouſſer, & celui de ſa ſéparation.

Il me ſuffira d'inſérer ici un Article de mon Journal. J'ai choiſi celui d'un Polype, qui tient à peu près le milieu, pour la fécondité, entre pluſieurs autres que j'ai obſervés. C'eſt un Polype de la ſeconde eſpéce, & un de ceux de la troiſiéme génération, qui ont été nourris en ſolitude. Il a commencé à ſortir de ſa mere le 5 Juillet, il s'en eſt ſéparé le 10, & alors il avoit déjà un jeune, qui, depuis le jour précédent, avoit commencé à pouſſer.

Jeunes Polypes.	Jour, auquel ils ont commencé a pouſſer.	Jour de leur ſéparation d'avec leur mere.
Le 1er. jeune a commencé à pouſſer le	Juillet. 9	Il s'eſt ſéparé le Juillet. 13
2 jeune.	11	15
3	12	17
4	13	17
5	13	22
6	16	22
7	17	23
8	18	24
9	22	25
10	22	26
11	23	26
12	25	27

Juil-

		Juillet.		Juillet.
13	jeune. a pouſſé le	26	ſéparé le	29
14	- - - -	27	- - - -	30
15	- - - -	29	- - - -	—
16	- - - -	30	- - - -	—
17	- - - -	—	- - - -	— Août.
18	- - - -	—	- - - -	19
19	- - - -	—	- - - -	11
		Août.		
20	- - - -	9	- - - -	13
21	- - - -	11	- - - -	14
22	- - - -	12	- - - -	15
23	- - - -	13	- - - -	17
24	- - - -	14	- - - -	17
25	- - - -	14	- - - -	18
26	- - - -	15	- - - -	20
27	- - - -	16	- - - -	20
28	- - - -	17	- - - -	21
29	- - - -	18	- - - -	22
30	- - - -	18	- - - -	23
31	- - - -	20	- - - -	23
32	- - - -	20	- - - -	24
33	- - - -	21	- - - -	25
34	- - - -	21	- - - -	26
35	- - - -	23	- - - -	27
36	- - - -	23	- - - -	28
37	- - - -	24	- - - -	28
38	- - - -	26	- - - -	30
39	- - - -	27	- - - -	31
40	- - - -	28	- - - -	1 Sept. Août.

		Août.		Septembre.
41	jeune. à pouſſé le	29	ſéparé le	2
42	- - - - -	29	- - - - -	2
43	- - - - -	31	- - - - -	4
		Septembre.		
44	- - - - -	1	- - - - -	—
45	- - - - -	4	- - - - -	—

Je n'ai pas marqué les jours auxquels les jeunes, 17, 18, & 19, ont commencé à pouſſer, ni ceux de la ſéparation des jeunes, 15, 16, & 17. Quelques diſtractions m'ont empêché, ces jours-là, de faire mes Obſervations avec ſoin.

Cette Table, dont il s'agit, nous apprend, que le Polype a produit 45 petits dans l'eſpace de deux mois; c'eſt-à-dire, environ 20 par mois. Entre tous les Polypes, que j'ai nourris & obſervés de la même maniére que celui-là, il y en a, comme je l'ai déjà dit, qui ont plus multiplié, & d'autres moins. J'ai trouvé que le nombre mitoïen entre ces deux extrémités, étoit de 20 jeunes par mois.

Il eſt facile, en examinant cette Table, de déterminer à peu près la durée de l'union des jeunes Polypes avec leurs meres. On voit qu'elle va ordinairement à trois ou quatre jours. Mais, à la vérité, les Polypes ne font ſi peu de tems à parvenir au point où ils peuvent ſe ſéparer de leurs meres, que dans l'Eté.

Pour ſe former une idée de la fécondité des Polypes, il ne ſuffit pas de ſavoir, qu'un ſeul en peut produire une vingtaine dans un mois. Cela ne ſeroit rien,

rien, ſi leurs générations ne ſe ſuccédoient pas très promptement. Quand je commençai à nourrir des Polypes en ſolitude, je ne connoiſſois pas encore leur fécondité. C'étoit alors le milieu de Juin, & je craignois de m'y être pris trop tard, pour pouvoir obſerver, au moins, quelques générations de ſuite. Mais, ma curioſité fut bientôt ſatisfaite au-delà de mes eſpérances. Au bout d'un mois, j'avois déjà dans mon Journal des Obſervations ſur ſix générations ſucceſſives de Polypes. Ces Obſervations m'ont appris, qu'un jeune Polype peut, quatre ou cinq jours après qu'il a commencé à ſortir de ſa mere, avoir lui-même un jeune qui commence à pouſſer, c'eſt-à-dire, qu'on peut voir tous les quatre ou cinq jours une nouvelle génération de Polypes. Ainſi, pour juger de la quantité de Polypes, qui pourroient venir d'un ſeul, au bout de deux mois, par exemple, il faut poſer d'abord, que ce premier Polype en peut produire quarante pendant ce tems: mais outre cela, on doit compter, que ces quarante commencent chacun à multiplier cinq jours après qu'ils ont commencé à pouſſer, & qu'ils multiplient auſſi ſur le pied de vingt par mois. Ce que je dis de cette ſeconde génération, regarde auſſi la troiſiéme & les ſuivantes. On comprend facilement, en faiſant attention à tout cela, que le nombre des deſcendans d'un ſeul Polype, peut, au bout de deux mois, être prodigieux.

J'ai ſuppoſé dans ce que je viens de dire, que tous les Polypes produiſoient des petits, qu'ils étoient tous meres; & c'eſt ce que j'aurai bientôt occaſion de prouver.

C'EST, en faiſant les Expériences que je viens de rapporter, que j'ai découvert un Fait remarquable, dont j'ai déjà fait mention en paſſant, & dont je dois à préſent parler plus au long. En conſidérant de jeunes Polypes, qui étoient encore attachés à leurs meres, j'en vis un qui avoit lui-même un petit, lequel commençoit à ſortir de ſon corps; c'eſt-à-dire, qu'il étoit mere, pendant qu'il étoit encore uni à ſa mere. Ce que j'admirai dans ce Polype, fut bientôt commun à pluſieurs autres; & j'eus, en peu de tems, pluſieurs jeunes Polypes, encore attachés à leurs meres, leſquels avoient déjà trois ou quatre petits, dont quelques-uns étoient même parfaitement formés *: ils pêchoient des Pucerons comme les autres, & ils les mangeoient. Ce n'eſt pas tout: j'ai même vu une mere Polype, qui portoit ſa troiſiéme génération. Du petit qu'elle produiſoit, ſortoit un autre petit, & de celui-ci un troiſiéme.

* PL. VIII. Fig. 8.

LORSQUE l'on conſidére une mere chargée de petits, il faut, pour croire que c'eſt un Animal qui multiplie, en être bien convaincu d'avance. On la prendroit plutôt pour une Plante, ou pour une Racine, qui eſt extrêmement ramifiée *.

* Fig. 8.

JE ne décrirai qu'une de ces meres, entre tant d'autres, que j'ai eu occaſion d'obſerver. C'eſt celle qui eſt repréſentée dans la Figure 8. de la Pl. VIII. Elle fournira en même tems un Exemple de la promptitude avec laquelle les Polypes croiſſent & multiplient.

C'EST d'un Polype à longs bras dont il s'agit. Quinze jours après avoir commencé à ſortir de ſa mere,

re, & neuf jours après s'en être ſéparé, il avoit pour le moins, lorſqu'il étoit bien étendu, un pouce & un quart de longueur. Dix jeunes ſortoient en même tems de ſon corps, & quatre à cinq de ces jeunes étoient longs d'environ ſept à huit lignes. Il y en avoit huit d'entre eux qui étoient parfaitement formés, & en état de manger. De plus, cinq de ces derniers produiſoient des petits. De l'un de ces cinq il en ſortoit trois, de deux autres il en ſortoit deux, & enfin, les deux derniers en pouſſoient chacun un. Quelques-uns des Polypes de cette ſeconde génération avoient déjà des bras, & prenoient même des Pucerons. Tout le groupe, formé par cette mere, & par ſes dix-neuf petits, avoit pour le moins un pouce & un quart de long, & un pouce de large. Les bras de la mere, de même que ceux de ſes petits, pendoient pour la plupart vers le fond du poudrier.

Il ne s'étoit ſéparé qu'un jeune Polype, de cette mere, depuis qu'elle avoit commencé à multiplier. C'eſt ce qui a fait qu'au bout de quinze jours elle s'eſt trouvée ſi garnie de petits. Elle a toûjours été ſuſpendue à la ſuperficie de l'eau, & le verre, dans lequel elle étoit, a toûjours été bien rempli de Pucerons; deux circonſtances, très propres à prévenir la trop prompte ſéparation des petits, & par conſéquent, à ſe procurer le ſpectacle de ces Polypes ſi garnis de jeunes.

On a déjà pu facilement comprendre, par ce que j'ai dit juſqu'à préſent, que les Polypes ne multiplient jamais tant, que lorſqu'ils ont une abondante nourriture, & qu'il fait chaud. Ces deux circonſtances

doivent abſolument être réünies, pour que les Polypes puiſſent multiplier au point que j'ai décrit ci-deſſus. Une abondante nourriture devient inutile à ces Animaux, dès qu'il ne fait pas chaud, parceque, comme je l'ai fait voir dans le Mémoire précédent *, le dégré d'appétit des Polypes eſt proportionné à celui de la chaleur de l'eau dans laquelle ils ſont.

* Pag. 114 &c.

POUR ſe convaincre, que les Polypes multiplient à proportion de la quantité d'alimens qu'ils prennent, il ſuffit d'en faire jeûner & manger alternativement pendant quelque tems. C'eſt une Expérience, qu'on eſt même quelquefois obligé de faire malgré ſoi. Les Animaux, propres à nourrir les Polypes, peuvent devenir rares; & on peut même en manquer tout-à-fait. C'eſt ce que j'ai éprouvé, & ſur-tout dans les commencemens de mes Recherches, lorſque je n'étois pas exercé à trouver toutes ſortes d'alimens convenables aux Polypes. Dans ce tems de diſette, mes Polypes devenoient plus petits, & ceſſoient de multiplier; mais, enſuite, dès que je leur fourniſſois de la nourriture, j'avois le plaiſir de leur voir produire de nouveaux petits. Je ne m'en ſuis pas tenu à cette Expérience générale. J'ai mis un Polype à part, pour le faire jeûner, le 18. Juillet 1741. Quatre petits ſortoient alors de ſon corps; & il en a pouſſé encore un cinquiéme. Ces cinq jeunes ont été ſéparés le 26. Juillet. Leur mere a été ſans manger juſqu'au 7me. Août; &, pendant ce tems-là, elle n'a pouſſé aucun petit. D'autres Polypes, au contraire, qui vivoient dans l'abondance, en pouſſoient tous les jours de nouveaux. Je lui ai donné des Pucerons le 7me. Août,

Août, & le 9me. j'ai vu ſortir un jeune; & depuis elle en a produit pluſieurs. Enfin, je l'ai miſe, encore pluſieurs fois alternativement dans l'abondance & dans la diſette; & toûjours avec le même ſuccès.

Si l'on ne ſavoit pas que les jeunes Polypes peuvent ſe nourrir eux-mêmes, dès qu'ils ont des bras, quoiqu'ils ſoient encore attachés à leur mere, on auroit de la peine à comprendre comment, en une quinzaine de jours, un Polype peut devenir ſi grand, & porter dix-neuf petits bien nourris. Je parle de celui que j'ai décrit tout à l'heure *. Cette mere Polype mangeoit chaque jour, environ une dixaine de Pucerons; &, certainement, le ſuc nourricier qu'elle en tiroit, n'auroit pu ſuffire à nourrir tous ſes petits. Mais, ceux de ces petits, qui étoient en état de manger, dévoroient par jour entre eux autour de vingt Pucerons, dès le dixiéme, ou douziéme jour. Ces alimens ſe mêloient avec ceux de la mere, comme nous l'avons dit ci-deſſus *; & le tout, qui en réſultoit, ſe diſperſoit dans tous les jeunes Polypes, au moïen de la communication qui étoit entre leurs eſtomacs.

* PL. VIII. Fig. 8.

* Pag. 166.

Parmi le grand nombre de Polypes que j'ai pêchés dans les foſſés dans le tems le plus propre, il ne s'en eſt trouvé aucun qui eût plus de ſept petits, attachés à la fois à ſon corps. Je n'en ai même rencontré de pareils, que très rarement. Cela vient apparemment, de ce qu'il arrive peu ſouvent, que les Inſectes, qui ſervent de nourriture aux Polypes, ſoient en auſſi grande quantité, dans les endroits où ils vivent, que dans les poudriers où je tenois les miens. J'ai vu, cepen-

cependant, dans des foſſés, & dans un vivier, des endroits, où des Polypes auroient été pendant long-tems à même de ſaiſir autant de proies, que ceux que je nourriſſois dans des verres: & c'eſt ce qui me fit penſer, après avoir été témoin de la prodigieuſe fécondité des Polypes, qu'en peu de tems, on pourroit voir des foſſés remplis d'un nombre infini de ces Animaux, quand même il n'y en auroit eu que quelques-uns peu auparavant; pourvu que ces foſſés fuſſent bien garnis de Pucerons. Ce n'étoit-là qu'une conjecture, fort vraiſemblable à la vérité, que je formai au mois d'Août 1741, mais que l'Expérience juſtifia parfaitement dans le mois de Juillet de l'année ſuivante.

DEPUIS que j'obſerve les Polypes, j'examine de tems en tems les eaux de Sorgvliet dans leſquelles j'en ai trouvé: je parcours les bords des foſſés & d'un vivier, je tire de l'eau, en différens endroits, quelques Plantes, ou quelques autres corps, ſur leſquels je cherche des Polypes. Je tache même de les voir dans leur ſéjour naturel, en prenant pour cela les précautions que j'ai indiquées dans le Mémoire précédent. Lorſque je fis, au commencement de Juillet 1742, la viſite des eaux de Sorgvliet, je trouvai très peu de Polypes dans le foſſé, ſitué aux pieds d'une Dune, & qui m'a fourni les premiers Polypes que j'ai vus. Une quinzaine de jours après, j'en parcourus les bords, dans le tems que le Soleil, donnant dans l'eau, éclairoit en divers endroits juſqu'au fond. Je vis d'abord une Plante, qui étoit plus chargée de Polypes, qu'aucune

que

que j'euſſe jamais vue. Je la tirai de l'eau avec empreſſement ; &, la regardant comme un Tréſor, je quittai tout pour la mettre en ſureté dans mon Cabinet. Cependant, après m'être délecté à l'admirer pendant quelques momens, je revins ſur les bords du foſſé, & je continuai à les parcourir. Quelle ne fut pas ma joie, lorſque je parvins à un endroit, où je vis tout le fond, pour ainſi dire, hériſſé de Polypes! Des branches d'Arbres, longues de pluſieurs pieds, qui étoient tombées dans l'eau, en étoient, ſans exagération, preſque autant garnies qu'une perruque l'eſt de cheveux. Une planche d'environ dix pieds de longueur, qui flottoit ſur l'eau, en étoit ſi parfaitement bordée, qu'on auroit dit qu'elle étoit environnée d'une frange. Je tirai du foſſé une des branches, qui étoit extrêmement couverte de Polypes. Quand elle fut hors de l'eau, tous ces Polypes, contractés & placés les uns ſur les autres, formoient une glaire épaiſſe & brunâtre, qu'on n'auroit pas facilement priſe pour un amas de Polypes. Je mis, dans un grand verre plein d'eau, un morceau de cette branche, où il a été vu par pluſieurs perſonnes. Les Polypes étoient ſi ſerrés, qu'on avoit de la peine à découvrir le bois ſur lequel ils étoient fixés. Quand leurs bras ſe furent étendus dans le verre, il en étoit preſque entiérement rempli. On peut juger de l'effet que faiſoient ces Polypes & leurs bras, par la Figure de la Pl. IX. Mais, je dois avertir, que, quelque grand que ſoit le nombre de Polypes qui ſont repréſentés dans cette Figure fixés ſur un morceau de bois, il n'approche pas, cepen-

cependant, de celui que j'ai vu ſur de pareils morceaux de bois, & ſur de beaucoup plus grands. Je me ſuis diverti à jetter des Vers au milieu de ce nombre prodigieux de bras, qui rempliſſoient le verre dans lequel étoit cette multitude de Polypes. Un ſeul de ces Vers étoit pris par pluſieurs Polypes. En peu de tems, il ſe trouvoit enlacé de mille maniéres dans leurs bras.

QUELQUE mêlés que fuſſent les bras des Polypes qui ſaiſiſſoient la même proie, j'ai remarqué qu'ils ſe ſéparoient enſuite; & j'ai obſervé, pendant pluſieurs jours, cette multitude de fils déliés, qui ſe touchoient preſque, ſans appercevoir aucune confuſion entre eux *. Ils faiſoient divers mouvemens, ils s'allongeoient, & ſe raccourciſſoient, ſans s'embarraſſer les uns dans les autres.

* PL. IX.

APRÈS avoir bien examiné tout ce qui étoit à portée de mes yeux, dans le foſſé dont il s'agit, je trouvai que les branches d'Arbres, & les brins de bois qui étoient dans l'eau, n'étoient nulle part plus garnis de Polypes, qu'aux endroits qui étoient les plus près de la ſuperficie de l'eau. Il eſt très vraiſemblable, que la plupart de ces Animaux avoient été conduits là, par le penchant qu'ils ont pour la lumiére. C'eſt l'idée qui me vint, lorſque je remarquai le Fait que je viens de rapporter; & je cherchai d'abord à le vérifier par quelque Expérience. Je plantai dans le fond de l'eau pluſieurs bâtons par un bout, de maniére que le bout oppoſé ſe terminoit preſque à ſa ſuperficie. Mon but étoit d'obſerver ſi les Polypes, qui étoient en grand nombre ſur le fond du foſſé, mon-

monteroient le long de ces bâtons, & s'ils viendroient ſe placer en quantité à leur extrémité la plus expoſée à la lumiére. Mais, quelques jours après avoir placé ces bâtons de la ſorte, le nombre des Polypes diminua fort ſubitement dans le foſſé, comme je le dirai bientôt; & il me fut par conſéquent impoſſible de voir la fin de l'Expérience que j'avois commencée.

Il étoit bien facile de découvrir la cauſe de cette prodigieuſe quantité de Polypes. Le foſſé étoit extrêmement peuplé de Pucerons, qui avoient fourni aux premiers Polypes, & aux autres à meſure qu'ils naiſſoient, autant de nourriture qu'il en falloit pour les faire beaucoup multiplier.

Je profitai du peu de tems que ce foſſé fut ſi rempli de Polypes, pour obſerver, autant qu'il me fut poſſible, toutes leurs manœuvres dans leur ſéjour ordinaire. J'allois chaque jour me coucher ſur une planche qui avançoit un peu au-deſſus de l'eau, je tenois mes yeux à peu de diſtance de ſa ſuperficie. Je voiois les Polypes marcher, étendre leurs bras, & ſaiſir les Animaux qui les touchoient. Il y avoit un grand nombre de Polypes, qui étoient ſuſpendus à la ſuperficie de l'eau, & lorſque le vent l'agitoit, je les voiois ſuivre les vagues: il en paſſoit des bandes ſous mes yeux, qui alloient où le mouvement de l'eau les conduiſoit.

Il y avoit alors peu de Limaçons qui n'euſſent quelques Polypes ſur leur coquille. Ces Polypes n'avoient pas beſoin de marcher pour paſſer d'un lieu dans un autre. Les Limaçons leur ſervoient de voiture, & quoiqu'ils cheminent fort lentement, ils faiſoient

ſoient faire cependant aux Polypes, en peu de tems plus de chemin qu'ils n'en pourroient faire dans un jour en marchant. D'autres Polypes alloient encore plus vîte. C'étoient ceux, qui étoient fixés ſur les fourreaux de ces jolies Teignes, faits avec de petites piéces de Plantes, coupées en quarrés longs, réunies enſemble, & diſpoſées en ſpirale. Ces Teignes nagent aſſez vite. J'en ai vu qui portoient, en nageant, pluſieurs Polypes attachés à leurs foureaux *.

* PL. X. Fig. 1.

J'AI déjà dit, que cette grande quantité de Polypes n'a pas duré long-tems. Huit jours après avoir remarqué des morceaux de bois qui en étoient chargés, je n'y trouvai plus que des reſtes de Polypes, qui n'étoient reconnoiſſables, que pour ceux qui en avoient déjà vu périr. Il eſt fort vraiſemblable, que les Poux, dont j'ai déjà parlé, ont beaucoup contribué à la deſtruction de ces Polypes. Tous ceux, que j'ai tirés de l'eau dans ce tems-là, en avoient. J'ai laiſſé des Polypes dans de grands verres, ſans les délivrer de ces Animaux; ils en ont été dévorés pour la plupart.

LES Polypes peuvent, comme je l'ai dit ci-deſſus, multiplier dans un tems aſſez froid. J'en ai trouvé dans les eaux de Sorgvliet au mois de Novembre, de Décembre & de Mars, qui avoient trois & quatre petits; & j'en ai eu en même tems dans un Cabinet, qui en portoient davantage. Les Expériences, que j'ai faites, m'ont prouvé clairement, que les Polypes peuvent produire des petits durant toute l'année. J'en ai pluſieurs Exemples parmi ceux que j'ai nourris pendant long-tems.

CE-

CELUI, dont il s'agit dans l'Article du Journal que j'ai rapporté ci-deſſus *, a, comme on l'a vu, commencé à pouſſer des jeunes le 9me. Juillet 1741, &, depuis ce tems-là juſqu'à préſent *, il n'a pas ceſſé d'avoir des petits attachés à ſon corps. Cependant, je l'ai tenu en Hyver, dans un Cabinet, où le froid ne différoit que de quelques degrés de celui qu'il faiſoit dehors; & je ne l'en ai ôté, pour le mettre ſur la tablette de ma cheminée, que lorſqu'il geloit.

* Pag. 172.

* Janvier 1744.

AYANT tenu un Régitre des naiſſances des Polypes pendant l'Eté, j'ai été curieux d'en tenir un pendant l'Hyver. J'ai commencé dans l'Automne de 1742, & j'ai pris pour ſujets de mon Expérience, deux Polypes de la ſeconde eſpéce, & deux de celle à longs bras. Mon but n'a pas été de rechercher ſeulement combien ils produiroient de petits pendant un mois de l'Hyver; mais encore de tâcher d'obſerver, auſſi exactement qu'il me ſeroit poſſible, à quel degré de froid ils ceſſeroient de multiplier, & à quel degré ils recommenceroient. Et comme la quantité d'alimens, que prennent les Polypes, influe beaucoup ſur le plus ou le moins de petits qu'ils produiſent, je me ſuis encore propoſé de marquer les repas qu'ils feroient en Hyver, & de leur en faire faire autant qu'ils pourroient, afin d'acquérir par-là des idées plus complettes, ſur tout ce qui a rapport à leur multiplication.

POUR faire ces Expériences, j'ai dû continuellement obſerver le Thermométre. J'en ai tenu un dans un des quatre verres où étoient les Polypes que j'ob-

ſervois. Les trois autres verres étoient à côté de celui-là. C'eſt d'un Thermométre de Mercure de Mr. Prins, dont je me ſuis ſervi. On ſait que le 32e. degré marque le point de congélation, le 48e. l'air temperé, le 64e. l'air chaud, & le 212e. l'eau bouillante. Suivant les Obſervations que Mr. l'Abbé Nolet a faites touchant le rapport de la marche du Thermométre de Mr. de Reaumur avec celui de Mr. Prins, il a déterminé vingt degrés & deux tiers de ce dernier, pour dix degrés de celui de Mr. de Reaumur. Il ſera donc facile à ceux, qui voudront rapporter mes Obſervations au Thermométre de Mr. de Reaumur, de le faire en ſe réglant là-deſſus.

J'AI ordinairement obſervé trois fois par jour le Thermométre, le matin, à midi, & le ſoir, & j'ai rapporté dans le Régitre à ces différens tems, les Obſervations qui y étoient rélatives. Il ne m'a pas paru néceſſaire d'inférer ici ce Régitre. Je me contenterai d'indiquer les conſéquences qu'on peut tirer des Obſervations qu'il renferme.

LES voici. 1°. Les Polypes peuvent manger lorſque l'eau, dans laquelle ils ſont, fait deſcendre le Thermométre de Prins au trente-cinquiéme degré. A la vérité, il arrive ſouvent qu'ils refuſent de manger, lorſque l'eau a ce dégré de froid. Quand le Thermométre eſt près du quarantiéme dégré, ils peuvent faire un repas tous les deux ou trois jours : mais, ce repas n'eſt pas de la moitié auſſi grand que ceux qu'ils font en Eté; & il leur faut deux ou trois jours, pour digérer les alimens qu'ils ont pris.

2°. Quelques jeunes Polypes ont commencé à pouſ-

pouſſer, lorſque le Thermométre étoit au trente-huitiéme degré; mais, ils pouſſent plus fréquemment, quand il eſt entre le quarante & quarante-ſixiéme: degré de chaleur, qui ne ſuffiroit pas, pour faire pouſſer la plûpart des Plantes qu'on cultive dans nos jardins.

3°. Il paroit encore par ce Régitre, que la plûpart des jeunes Polypes reſtent dans le tems froid, environ un mois, unis à leurs meres: non qu'il leur faille tout ce tems-là pour être en état de s'en ſéparer, mais parce qu'ils ſont alors moins vifs, & que n'étant pas preſſés par la faim, ils ne ſont pas excités à changer de place pour aller chercher des alimens.

Avant que d'avoir fait toutes les Obſervations que je viens de rapporter ſur la fécondité des Polypes, & ſur l'influence qu'a ſur cette fécondité la quantité d'alimens qu'ils prennent, & le dégré de chaleur dans lequel ils vivent, j'avois déjà cherché à découvrir comment ils étoient fécondés.

Je continuai ces Recherches, en faiſant les Obſervations dont il a été queſtion ci-deſſus; & comme ce que j'avois découvert ſur la génération des Polypes, avoit même plus de rapport avec ce que nous connoiſſons dans pluſieurs Plantes, qu'avec ce que nous connoiſſons dans un grand nombre d'Animaux, je penſai, en tâchant d'épier les amours des Polypes, non ſeulement à voir ſi elles avoient du rapport avec celles des Animaux, mais même avec celles des Plantes.

Le premier Fait, dont je me ſuis aſſuré, c'eſt que tous les Polypes à bras en forme de cornes, ſont meres, que tous les individus de l'eſpéce produiſent

des petits. La plûpart de ceux, que je trouvai d'abord dans les foſſés, ne pouſſoient pas des jeunes; mais, après que je leur eus fait faire quelques repas dans les poudriers où je les mis en grande quantité, il n'y en eut aucun qui ne commençât à multiplier. C'eſt ce qui me fit penſer que, peut-être, tous les Polypes étoient meres: &, pour juger avec plus de ſureté de ce qui en étoit, je donnai une très grande attention à un nombre conſidérable de Polypes que je nourriſſois, & ſur leſquels je faiſois diverſes Expériences. Il n'y en eut, en effet, aucun qui ne ſe mît à pouſſer des petits, après avoir mangé plus ou moins; enſorte que je n'eus dès-lors plus lieu de douter, que le ſoupçon que j'avois formé, ne fût fondé.

J'Ai nourri, depuis ce tems-là, j'oſe dire des milliers de Polypes; & je n'en ai trouvé aucun, qui n'ait multiplié, après avoir pris une certaine quantité d'alimens.

En examinant les Polypes que je nourriſſois en compagnie dans des verres, j'étois toûjours attentif à toutes leurs demarches, pour voir s'il ne ſe paſſoit rien entre eux d'analogue à ce qui ſert à féconder la plupart des Animaux. Mais, quelques ſoins que je me ſois donnés pour cela, quelque grand que ſoit le nombre de Polypes que j'ai obſervés, je n'ai jamais pu parvenir à remarquer rien de pareil. Cela me fit penſer, qu'il en étoit peut-être des Polypes, comme des Pucerons, qui, ſelon la découverte qui avoit été nouvellement faite, & dont j'ai déjà parlé *, ſont tous meres, & multiplient ſans accouplement. Mais,

* Pag. 17.

cet

cet exemple ne ſuffiſoit pas. Il falloit des Preuves, confirmées par des Expériences faites ſur les Polypes mêmes.

Je mis donc pluſieurs Polypes de la ſeconde & de la troiſiéme eſpéce en ſolitude; &, afin d'être bien ſûr qu'ils n'avoient pu, depuis leur ſéparation, avoir aucune communication avec d'autres Polypes, je n'ai pris, pour faire cette Expérience, que ceux que j'ai ſéparés moi-même de leur mere, ou que ceux, qui, s'étant ſéparés d'eux-mêmes, ont été tirés du verre dans lequel étoit leur mere, d'abord après cette ſéparation, & avant que quelque autre jeune ſe fût ſéparé, avec lequel il auroit été poſſible qu'ils ſe fuſſent accouplés. On a vu ci-deſſus*, toutes les précautions que j'ai priſes, pour faire vivre ces Polypes dans une parfaite ſolitude, pour pouvoir toûjours les reconnoitre, & pour m'aſſurer qu'eux & leurs deſcendans, que j'ai auſſi mis en ſolitude, avoient tous multiplié.

* Pag. 170.

En effet, tous ceux qui ont vécu ſeulement pendant quelques jours, & qui ont mangé, ont produit des petits, & ont continué à en produire de plus en plus, à meſure que je les ai nourris.

Non ſeulement ces premiers Polypes, que j'ai mis en ſolitude, ont multiplié, mais auſſi pluſieurs de leurs deſcendans, que j'ai auſſi mis, de génération en génération, juſqu'à la ſeptiéme, avec les mêmes précautions, en ſolitude.

J'ai fait cette Expérience ſur un nombre conſiderable de Polypes; & c'eſt pour cela, qu'on peut avec d'autant plus de confiance en conclure, qu'il n'eſt pas néceſſaire, pour qu'un Polype multiplie, qu'il ait eu, de-

depuis qu'il s'eſt ſéparé d'avec ſa mere, aucune communication avec un autre Polype. C'eſt même ce dont j'ai eu lieu d'être perſuadé, peu après avoir commencé à nourrir des Polypes ſolitaires. J'en vis pluſieurs, dont les petits, encore attachés à leur corps, produiſoient eux-mêmes d'autres petits*; c'eſt-à-dire, pour m'exprimer en d'autres termes, qu'ils avoient, avant leur ſéparation, le principe de la fécondité.

* Voi. pag. 176.

LORSQUE je fus convaincu qu'un Polype n'avoit pas beſoin, pour multiplier, de vivre avec d'autres depuis qu'il s'étoit ſéparé de ſa mere, & que j'eus vu multiplier ces Animaux, pendant qu'ils étoient encore unis à ceux qui les produiſoient, je penſai que c'étoit, peut-être, pendant cette union, que ſe paſſoit ce qui devoit contribuer à leur fécondité. Je me mis donc à obſerver de ſuite, & avec beaucoup d'attention, de jeunes Polypes qui n'étoient pas encore ſéparés de leur mere: mais, quelques ſoins que je me ſois donnés, je n'ai jamais rien pu remarquer, ni entre les jeunes qui tenoient à une même mere, ni entre ces jeunes & leur mere, qui me donnât lieu de former le moindre ſoupçon. Tous ces Polypes multiplioient, ſans qu'il m'ait été poſſible de rien remarquer qui ait pu contribuer à leur génération: ce qui me fit juger, que ce que je tâchois de découvrir, ſuppoſé qu'il y eût quelque choſe de pareil, étoit ou imperceptible, ou au moins très difficile à voir.

JE fus donc alors réduit à aller encore plus en tatonnant, que je ne l'avois fait juſques-là.

CE qui ſert à féconder les Plantes, étant fort ſecret, &

& même imperceptible dans la plupart, il me vint dans l'eſprit, que peut-être les Polypes reſſembloient encore aux Plantes à cet égard. Il étoit bien difficile, pour ne pas dire impoſſible, de pouvoir juger, s'il y avoit, en effet, une pareille reſſemblance entre les Polypes & les Plantes. Auſſi ne regardai-je cette idée, que comme une conjecture des plus incertaines, & qui ne meritoit pas beaucoup d'attention. Cependant, il me parut convenable de ne pas négliger de faire une Expérience, à laquelle cette conjecture m'avoit fait penſer.

On découvre dans les fleurs des Plantes un piſtile & des étamines: & il s'agiſſoit de ſavoir, s'il n'y avoit point de parties dans les Polypes, qui euſſent le même uſage que celles des fleurs des Plantes.

Je ſuppoſai donc, que ces parties pouvoient être dans la tête & dans les bras des Polypes, & en général, que peut-être c'étoit-là qu'étoit ce qui contribuoit à la fécondation des Polypes, ſoit à la maniére des Plantes, ſoit à celle des Animaux, ſoit enfin d'une maniére parfaitement inconnue. Je me mis d'abord à chercher, ſi les meres & les jeunes ne ſe communiquoient point le principe de la fécondité au moïen de leur tête & de leurs bras. Pour cet effet, je coupai la tête à huit meres qui avoient des petits, dont les bras ne paroiſſoient pas encore. Je mis chacune de ces huit meres en ſolitude dans un verre; &, à meſure que leurs bras repouſſoient, & que leur tête ſe formoit, je les coupois de nouveau. Elles n'ont eu, ni bras, ni tête, pendant tout le tems que leurs petits ſont reſtés attachés à leur corps; &, par conſé-

quent, il n'a pu y avoir entre ces petits & ces meres, par le moïen de ces parties, aucune communication qui pût contribuer à la fécondation. Les petits étant devenus capables de prendre des alimens, je leur en donnai: ils crûrent, ils ſe ſéparérent; &, d'abord après leur ſéparation, je les mis en ſolitude dans des verres. Ils n'auroient pas dû multiplier, s'il avoit été néceſſaire que leur mere leur communiquât le principe de la fécondité, de la maniére dont je l'avois ſuppoſé: & ce qui prouve, que cette ſuppoſition étoit fauſſe, c'eſt qu'ils multipliérent tous abondamment, après avoir fait quelques repas.

MAIS, cette communication ſuppoſée pouvoit, peut-être, avoir lieu entre les jeunes qui ſortoient enſemble du même Polype. Il n'y avoit guères de vraiſemblance dans cette idée. Cependant, je ne voulus pas négliger de faire l'Expérience, qui pouvoit décider, que ces jeunes Polypes ne ſe ſervoient point de leur tête pour ſe rendre féconds les uns les autres. Je coupai donc celle d'une mere qui n'avoit qu'un jeune, & qui a toûjours été ſeul juſqu'à ſa ſéparation. Cependant ce petit a multiplié abondamment dans le verre, où je le mis en ſolitude, après qu'il ſe fut ſéparé de ſa mere.

J'AI fait une autre Expérience, qui prouve auſſi qu'un jeune Polype a en lui le principe de la fécondité, avant qu'il ait pu le recevoir extérieurement de ſa mere, ni d'aucun autre Polype. J'ai coupé un jeune, qui commençoit ſeulement à pouſſer, c'eſt-à-dire, qui n'étoit encore qu'un très petit bouton, tel que celui qui eſt marqué *e*, dans la Figure 1. de la Planche

che VIII. On le voit dans la Figure 9. de la même Planche, comme il étoit d'abord, après qu'il eut été ſéparé de ſa mere avec des ciſeaux; & il eſt groſſi au microſcope dans la Figure 10. Ce bouton, aiant été mis à part dans un verre, s'eſt allongé peu à peu, il lui eſt venu des bras, & il a enſuite multiplié.

ENFIN, pour achever cette Diſcuſſion, je dirai, que, quelque attention que j'aie donnée pour voir ſi un jeune Polype ne ſe féconde point lui-même d'une maniére extérieure, je n'ai pu rien appercevoir qui m'ait fait venir la moindre idée de ce que je cherchois.

IL me paroit convenable de rappeller ici en peu de mots à l'eſprit, ce que nous apprennent les différentes Expériences que j'ai faites, pour découvrir le principe de la fécondité des Polypes. On en peut conclure:

1°. Qu'un jeune Polype, depuis qu'il eſt ſéparé de ſa mere, n'a pas beſoin de la compagnie d'un autre Polype, pour multiplier.

2°. Que même avant que de s'en ſéparer, il a le principe de la fécondité, puiſque dès lors il multiplie.

3°. Que ſi c'eſt la mere qui lui communique ce principe pendant qu'il lui eſt uni, ce n'eſt point qu'il y ait aucune communication entre la tête & les bras de cette mere, ou bien entre la tête & les bras d'un jeune Polype.

4°. Qu'il n'eſt pas non plus fécondé de cette maniére par un autre jeune, qui ſorte de la même mere en même tems que lui.

5°. Que s'il ſe féconde lui-même, il eſt aſſez vrai-

ſemblable, que c'eſt d'une maniére impereeptible.

TOUT ce que renferment ces cinq Articles, regarde les Polypes de la ſeconde & de la troiſiéme eſpéce. J'ai fait ſur les uns & ſur les autres les Expériences dont ces Articles ſont les conſéquences. Il ne m'a pas été poſſible de les faire ſur les Polypes verds, parce qu'ils m'ont manqué, avant que j'euſſe pouſſé mes Recherches juſques-là; & depuis ce tems-là, je n'en ai pas pu trouver.

SI nous n'avons pu découvrir comment les Polypes ſont fécondés, nous avons au moins appris, qu'ils ne le ſont point comme la plupart des Animaux que nous connoiſſons; & que, par conſéquent, ils forment encore une Exception à la Regle prétendue générale, qu'*il n'y a point de fécondation ſans accouplement*; Regle, qui a déjà été démentie d'une maniére bien remarquable, par la Découverte, faite depuis quelques années ſur les Pucerons.

PENDANT que j'ai fait toutes les Obſervations que j'ai rapportées ci-deſſus, ſur la Maniére dont les Polypes multiplient par rejettons, je n'ai pas négligé de chercher, s'ils n'avoient point d'autres Maniéres naturelles de multiplier. J'ai, par exemple, eu ſoin d'être attentif à remarquer, s'ils ne ſe partageoient point d'eux-mêmes, c'eſt-à-dire, ſi ces Animaux ne ſe multiplioient point naturellement par boutures, ou ſi au contraire cette Maniére de ſe multiplier n'avoit lieu, que lorſqu'on les coupoit en deux, ou en pluſieurs parties. J'ai vu en effet des Polypes ſe partager d'eux-mêmes. L'endroit, où ils ſe ſont partagés, s'eſt peu à peu retréci, juſqu'à ce qu'enfin,

une

un petit mouvement a pu opérer la ſéparation. Chaque portion eſt devenue enſuite un Polype complet. Il s'eſt fait en elles la même réproduction qu'on remarque dans les moitiés d'un de ces Animaux qu'on a coupés en deux. J'ai obſervé de ſecondes parties de ces Polypes, qui ſe ſont partagés d'eux-mêmes, dans leſquelles la réproduction, qui devoit ſe faire pour qu'elles fuſſent des Polypes complets, n'a eu lieu, même en Eté, qu'au bout de quinze jours, ou trois ſemaines. Quelques Polypes ſe ſont partagés par le milieu du corps, & d'autres plus ou moins près du bout antérieur & du bout poſtérieur. Il y en a quelques-uns de ceux que j'ai nourris pendant long-tems, qui ſe ſont partagés d'eux-mêmes deux ou trois fois. Le plus court intervalle qu'il y ait eu d'une fois à l'autre, a été de trois mois. Deux de ces Polypes dont je parle, étoient des portions d'un de ces Animaux que j'avois ſucceſſivement coupé en cinquante parties.

QUOIQUE j'aie, depuis près de trois ans, obſervé un nombre très conſiderable de Polypes, je n'en ai pas vu plus de douze, qui ſe ſoient partagés d'eux-mêmes. Si cela n'a pas lieu plus fréquemment dans leur ſéjour ordinaire, je ne ſais ſi on peut regarder cette maniére de multiplier, comme un moïen naturel, que la Nature ait donné aux Polypes pour perpétuer leur eſpéce, ou plutôt, ſi on ne doit pas la regarder comme quelque choſe d'extraordinaire. Quoi qu'il en ſoit, il paroit qu'ils ne ſe multiplient que très peu par ce moïen, & qu'il n'eſt nullement comparable à la multiplication des Polypes par rejettons.

J'ai auſſi cherché ſi ces Animaux n'étoient point ovipares. Je n'ai jamais rien vu, qu'on puiſſe prendre pour des œufs, que ce que je vais décrire.

J'ai remarqué ſur le corps de pluſieurs Polypes de petites excreſcences ſphériques, qui y étoient attachées par un pédicule fort court *. Il y en avoit de blanches, & de jaunes. Je n'en ai jamais vu plus de trois à la fois ſur le même Polype. Après être reſtées quelque tems attachées aux Polypes, elles s'en ſont ſéparées, & ſont tombées au fond du verre. J'en ai obſervé à diverſes repriſes, avant & après leur ſéparation. Elles ſont toutes à la fin devenues à rien, excepté une ſeule, qui, peut-être, eſt devenue un Polype. Je dis, peut-être, parce que je ne ſuis pas tout-à-fait ſûr du Fait. Dans le tems où j'aurois dû obſerver cette excreſcence avec le plus d'aſſiduité, je fus deux jours ſans la conſidérer. Lorſque je revins l'examiner, je trouvai, à la place où je l'avois laiſſée, un Polype informe, qui paroiſſoit réellement venir d'un corps ſphérique, qui s'allongeoit du côté par lequel il touchoit le fond du verre. Le côté oppoſé étoit encore arrondi, & l'on y appercevoit les bouts de trois bras qui commençoient à ſortir. Peu-à-peu ce Polype s'allongea, & prit la forme ordinaire de ces Animaux. En un mot, je ſerois aſſuré que ce Polype eſt venu d'un de ces petits corps ſphériques qui s'étoit détaché d'un Polype, ſi je n'avois pas été deux jours ſans l'obſerver, & s'il n'y avoit pas eu quelques petits Polypes dans le même verre.

* Pl. X. Fig 2. e, e.

La même choſe eſt à peu près arrivée à Mr. Allamand, qui a auſſi obſervé pluſieurs de ces petits corps.

Il

Il lui a paru, que l'un d'eux étoit devenu un Polype; mais, il n'ôſe cependant pas l'aſſurer poſitivement, parce qu'il n'a pas fait non plus l'Expérience, avec une exactitude aſſez grande, pour qu'elle puiſſe le ſatisfaire.

Il convient donc de repeter ces Obſervations, pour juger plus préciſément de ce que deviennent les petits corps ſphériques dont il s'agit. Mais ſuppoſé qu'ils deviennent des Polypes, je ne ſais ſi on pourroit les regarder comme des œufs, ou comme des Polypes qui prennent accidentellement, en pouſſant, une forme ſphérique, & qui périſſent enſuite, ou parviennent à l'état de Polype parfait.

Mr. de Reaumur m'a appris, par une Lettre qu'il m'a fait l'honneur de m'écrire le 17 Décembre 1743, que Mr. Bernard de Juſſieu avoit, pendant les vacances, trouvé, à quantité de Polypes à bras en forme de cornes, une petite veſſie adhérente à leur corps. Il me ſemble aſſez vraiſemblable que cette petite veſſie eſt la même choſe que j'ai appellée un petit corps ſphérique *. Il a paru à Mr. de Juſſieu, qu'elle étoit pleine d'œufs; mais, étant obligé de ſuivre ſa route, il n'a pu s'aſſurer aſſés de ce que donnent ces œufs. Si, en effet, c'étoient des œufs des Polypes à bras en forme de cornes, ces Animaux ſeroient ovipares & vivipares. Ce n'eſt encore à la vérité qu'une conjecture; mais qui, aiant été formée par un Naturaliſte, tel que Mr. de Juſſieu, eſt digne de la plus grande attention.

* Pl. X. Fig. 2. *e*, *e*.

Je dois encore avertir, que je n'ai trouvé de petits corps ſphériques, que ſur les Polypes de la ſe-

con-

conde eſpéce; & cela ſeulement en Automne, & au commencement de l'Hyver.

On découvre auſſi en Automne & au commencement de l'Hyver, ſur les Polypes de la ſeconde & de la troiſiéme eſpéce, de petites excreſcences fort différentes de celles dont il a été queſtion juſqu'à préſent. Elles n'ont pas de figure réguliére. Il y en a qui finiſſent à peu près en pointe, & d'autres, dont le deſſus eſt applati, ou arrondi *. Au lieu de tenir au Polype, comme celles dont j'ai parlé ci-deſſus, par un pédicule, elles lui ſont attachées par l'endroit le plus large. Elles forment à peu près une pyramide, dont la baſe eſt immédiatement appliquée contre le Polype. Ces excreſcences ſont quelquefois en ſi grand nombre ſur le même Polype, qu'elles ſe touchent preſque : c'eſt ce qu'on remarque principalement ſur ceux à longs bras. Elles n'occupent dans les Polypes de cette eſpéce que la portion la plus large de leur corps, celle qui eſt compriſe entre la tête & le commencement de la queuë *. Toutes ces excreſcences ſont blanches, & ſe font facilement remarquer par leur couleur, ſur-tout lorſqu'elles ſont en grand nombre. On ſeroit porté à les regarder comme une maladie des Polypes, ou au moins comme une ſuite d'une maladie. Il eſt certain, que ces Animaux ne ſont pas ſi actifs, lorſque leur corps eſt couvert de ces boutons: ils ont peu ou point d'appétit, maigriſſent en peu de tems, & perdent leur couleur. Quand les Polypes, qui ont des excreſcences, recommencent à manger, on voit ces excreſcences devenir peu à peu plus petites, & enfin elles ſe diſſipent entiérement;

* PL. X. Fig. 4.

* a c.

rement; au-lieu que les excreſcences ſphériques ſe ſéparent de ces Animaux.

J'AI remarqué que les bras des Polypes de la troiſiéme eſpéce, qui étoient fort incommodés de ces boutons, faits à peu près en forme de pyramide, étoient fort minces & fort courts *. Je n'ai pu les leur voir allonger. * PL. X. Fig. 4.

IL eſt arrivé pluſieurs fois que des Polypes à longs bras, qui étoient couverts de ces derniéres excreſcences, ont pendant l'Hyver, & quoiqu'ils euſſent fort peu mangé, pouſſé en peu de tems un grand nombre de jeunes Polypes extrêmement petits. J'en ai compté vingt-deux, qui étoient en même tems ſur le corps d'un Polype. Ils ſe ſont ſéparés enſuite de leur mere; & ceux, qui ont été nourris, ſont devenus auſſi grands que ceux qui pouſſent en Eté. J'avois d'abord ſoupçonné; que ces petits Polypes ſortoient des excreſcences, ou plutôt, que ces excreſcences devenoient de petits Polypes; mais, lorſque j'ai examiné la choſe de plus près, j'ai remarqué, que les Polypes pouſſoient à côté des excreſcences, dans les intervalles qu'elles laiſſent entre elles.

JE vais à préſent parler de quelques autres végétations irréguliéres, qu'on remarque encore dans les Polypes, lorſqu'on les obſerve de ſuite pendant quelque tems.

LEURS bras ſont ordinairement ſimples: ils n'ont aucune branche. Cependant, on en voit aſſés fréquemment un ou deux dans un Polype, qui ſont fourchus, & quelquefois même en plus d'un endroit. La branche, qui ſort du bras, & qui fait cette four-

che, eſt plus ou moins près de leur origine & de leur extrémité. Je ne décrirai ici en particulier, que le bras d'un Polype de la troiſiéme eſpéce, qui ſe trouve repréſenté dans la Figure 11 de la Planche VIII, parfaitement tel que je l'ai vu. Ce Polype avoit un bras fourchu, très remarquable *. Il ſe diviſoit d'abord en deux branches en *c*. L'une de ces branches étoit fourchue en deux endroits, ſçavoir en *d* & en *e*, & l'autre en un endroit, ſçavoir en *i*.

* *fffff.*

J'AI vu des Polypes verds, & de ceux de la ſeconde eſpéce qui avoient un, deux, ou trois bras, ailleurs qu'à leur place naturelle *. Ils ſortoient du corps, plus ou moins près du bout antérieur, ou du bout poſtérieur. Je n'ai jamais vu à un Polype plus de trois bras qui fuſſent ainſi déplacés, excepté à ceux, ſur leſquels j'avois fait quelque opération. On en verra un exemple dans le Mémoire ſuivant. Je ne me ſuis pas apperçu que les bras, qui ſont ailleurs qu'autour de la bouche, fuſſent d'aucun uſage aux Polypes. La plupart ont diminué peu à peu, & ſont enfin entiérement diſparus.

* PL. X. Fig. 3. *c d.*

J'AI encore vu, ſur des Polypes de la ſeconde eſpéce, des jeunes qui ont toûjours conſervé la figure d'un cône, & qui n'avoient qu'un bras, lequel ſortoit préciſément de la pointe de ce cône *. La maniére, dont ſe forment ces Polypes, ne m'eſt pas connue. Je ne les ai remarqués que lorſqu'ils étoient déjà formés. Il m'a paru, que quelques-uns, au-lieu de ſe ſéparer de leur mere, ont peu à peu diminué, enſorte que le petit cône a diſparu, & qu'il n'eſt

* Fig. 6. *ccc.*

reſ-

reſté qu'un bras à la place où il étoit. D'autres, au contraire, ont d'abord perdu leur bras, & ſe ſont enſuite ſéparés du Polype auquel ils tenoient. Je n'ai jamais vu plus de trois Polypes côniques ſur le corps d'un autre *. Ce n'eſt qu'en Automne & en Hyver, que j'en ai remarqué. * PL. X. Fig. 6.

On trouve quelquefois des Polypes, qui peuvent paſſer pour avoir deux têtes. J'en ai obſervé quelques-uns lorſqu'ils ſe ſont formés, c'eſt-à-dire, lorſqu'ils ſortoient du corps de leur mere. Quand les bras ont commencé à pouſſer, il a paru deux têtes, au-lieu d'une, au bout antérieur de ces jeunes Polypes. D'abord elles ſe touchoient, mais enſuite, après que le Polype eut fait quelques progrès, chacune de ces têtes s'eſt allongée, & s'eſt trouvée enſuite au bout d'une branche. Ces deux branches ſe réüniſſoient au reſte du corps, qui étoit commun. J'ai gardé aſſez long-tems de pareils Polypes à deux têtes, après qu'ils ſe ſont ſéparés de leur mere. Il étoit naturel de prendre une des deux têtes de ces Polypes, pour un petit qui commençoit de pouſſer, en même tems que les bras de ſe mere. Dans cette ſuppoſition, ces petits auroient dû ſe ſéparer au bout d'un certain terme, plus ou moins long, ſuivant la ſaiſon. C'eſt ce qui n'eſt pas arrivé à l'égard de pluſieurs, ils ſont reſtés très long-tems attachés au Polype auquel ils tenoient; & cela, ſans que l'endroit, par lequel ils étoient attachés, ſe ſoit étreci, & que la communication d'une branche à l'autre ait ceſſé. J'en ai vu quelques-uns, qui ſe ſont pourtant à la fin ſéparés. On peut donc les regarder,

ou comme un jeune Polype extraordinaire, qui eſt reſté attaché plus long-tems à ſa mere que les autres, ou comme une ſeconde tête du Polype, qui s'eſt ſéparée, ainſi qu'il arrive aux bout antérieur d'un Polype de ſe ſéparer quelquefois de ſoi-même du bout antérieur.

ENTRE pluſieurs de ces Polypes qui ont d'abord paru avec deux têtes, j'en ai obſervé un pendant long-tems, que je crois devoir décrire ici. C'étoit un Polype à longs bras. Je l'ai mis dans un verre plat, lorſqu'il s'eſt ſéparé de ſa mere, & je l'ai bien nourri. Les deux branches, ou bouts antérieurs de ce Polype, ſe ſont fort allongés en peu de tems, & la queuë commune eſt peu-à-peu diminuée, juſqu'à ce qu'enfin elle a diſparu. D'abord, les deux bouts antérieurs formoient un angle; mais, après que la queuë eut diſparu, ils ſe ſont mis bout à bout, & ont formé un Polype, qui avoit une tête à chaque extrémité *. Je lui ai donné à manger, tantôt par une bouche, & tantôt par l'autre: &, par laquelle des deux qu'il ait pris les alimens, ils ſont paſſés dans tout le corps. Le milieu de ce Polype * étoit plus étroit que les deux bouts *. Il étoit tel qu'eſt la queuë d'un Polype à longs bras ordinaire. Celui, dont il s'agit à préſent, a multiplié de côté & d'autre de la portion étroite. J'ai été très attentif pour voir s'il marcheroit, & en ce cas-là, comment il marcheroit. Mais, pendant deux mois qu'il a été dans cet état ſingulier, je n'ai jamais pu remarquer qu'il ait changé une ſeule fois de place. Je l'ai toûjours trouvé, toutes les fois que je l'ai obſervé, couché ſur le fond du verre, préciſément au même endroit où je l'avois laiſſé. Il étoit

* PL. X. Fig. 5. *a* & *c*.

* *c i*.

* *a i*, *c c*.

la

la plupart du tems assez étendu, & les bras serpentoient de differentes maniéres sur le fond du verre *. Il a été deux mois dans l'état singulier que je viens de décrire. Enfin, il s'est formé de nouveau au milieu * une queuë fort courte. La communication, qui étoit entre les deux branches, s'est fermée, & chacune paroissoit être un Polype parfait. Il est apparent que ces deux Polypes se seroient séparés, mais, ils sont morts de maladie, peu de tems après le dernier changement dont je viens de faire mention.

* PL. X. Fig. 5.

* m.

Si l'on voit de jeunes Polypes qui poussent deux têtes, on a aussi quelquefois occasion d'en observer qui n'en poussent point. Il ne sort point de bras à leur extrémité antérieure, & il ne s'y forme point de bouche. On pourroit regarder ces jeunes Polypes imparfaits, comme des queuës extraordinaires qui viennent à la mere Polype; ils en font, en effet, les fonctions. Souvent le Polype, dont ils sortent, s'en sert pour se cramponner contre les corps, lorsqu'il marche & lorsqu'il est en repos, de la même maniére qu'il se sert de son bout postérieur. J'ai vu, le 18. Janvier 1743, jusqu'à sept de ces queuës extraordinaires sur un même Polype *, qui avoit outre cela deux jeunes ordinaires, & trois de ces Polypes côniques dont j'ai parlé ci-dessus *. On peut juger, par la Figure 7 de la Pl. X, qui le représente exactement, combien la figure de ce Polype étoit bizarre. Il avoit alors un an & demi. L'Eté suivant il ne restoit, sur son corps, aucun de ces jeunes extraordinaires. Il avoit repris la forme ordinaire des Polypes.

* Fig. 7. q, q, q, q, q, q, q.

* t, t, t.

Il me faudroit entrer dans un trop grand détail, si

je voulois décrire toutes les variétés de figures, qu'ont produit, dans les Polypes que j'ai nourris pendant long-tems, les végétations irréguliéres auxquelles ces Animaux ſont ſujets. Ce que j'en ai dit, ſuffit pour faire comprendre, qu'à cet égard les Polypes ont encore plus de rapport avec les Plantes, qu'avec les Animaux qui nous ſont connus.

APRÈS avoir expoſé tout ce que j'ai pu découvrir ſur la maniére dont les Polypes multiplient, & fait voir qu'elle reſſemble beaucoup à ce que nous connoiſſons dans les Plantes à cet égard, il ne ſera peut-être pas inutile d'examiner ici plus en détail, en quoi conſiſte cette reſſemblance.

LES Plantes ſe multiplient de trois maniéres differentes. 1°. Par graine. 2°. Par bouture. 3°. Par rejettons. Elles ne raſſemblent pas toutes ces trois propriétés.

NOUS n'avons, juſqu'à préſent, rien découvert dans les Polypes, que l'on puiſſe aſſurer être de la graine: ainſi, à cet égard, nous ne pouvons marquer aucun rapport entre eux & les Plantes. Mais, nous en trouvons au contraire un très grand aux deux autres égards. Ce que j'ai dit au commencement du premier Mémoire* ſur la reproduction, qui ſe fait dans les portions d'un Polype qu'on a coupé en deux, ſuffit pour nous faire comprendre que ces portions de Polype reſſemblent beaucoup aux boutures des Plantes; & tout ce que j'ai rapporté dans celui-ci ſur la maniére naturelle dont ces Animaux multiplient, nous a fait voir que les jeunes Polypes ſont véritablement des rejet-

* Pag. 13. &c.

rejettons qui ſortent des vieux, comme les rejettons ſortent d'une Plante Mais, à la vérité, les rejettons des Polypes ſe ſéparent d'eux-mêmes, au-lieu que ceux des Plantes doivent être ſéparés par art. C'eſt au moins ce qu'on eſt obligé de pratiquer par rapport à ceux des Plantes, qu'on fait multiplier par rejettons dans les jardins, & dans les pépiniéres.

Il y a cependant une Plante fort commune, dont les rejettons ſe ſéparent d'eux-mêmes. Je veux parler de la Lentille aquatique. Elle eſt compoſée d'une ſeule feuille, qui flotte ordinairement ſur l'eau, & qui pouſſe, du milieu de ſa ſuperficie inférieure, un ou pluſieurs fils aſſez déliés, qu'on peut regarder comme des racines. Pour peu qu'on obſerve de ſuite cette Plante pendant l'Eté, on verra ſortir de ſes bords, en differens endroits, d'autres feuilles, qui pouſſeront des racines, lorſqu'elles ſeront parvenues à une certaine grandeur. Ces feuilles, ou pour parler autrement, ces rejettons, ne tiennent que très peu à la Plante dont ils ſortent, quand ils ſont formés. Alors ils s'en ſéparent d'eux-mêmes, & abandonnés ſeuls au mouvement de l'eau, ils peuvent en peu de tems ſe trouver fort éloignés de la Plante qui les a produits.

Il eſt donc conſtant que les Polypes, de même que pluſieurs ſortes de Plantes, ſe multiplient par boutures, & par rejettons, & qu'il y a par conſequent à ces deux égards beaucoup de rapport entre leur maniére de ſe multiplier. Mais, n'y auroit-il point auſſi de rapport entre la maniére dont les Plantes & celle dont les Polypes ſont fécondés? Tout ce que nous connoiſſons, par rapport à un grand nombre de Plantes,

tes, c'eſt qu'il y a dans leurs fleurs des parties qui contribuent à leur fécondation, ſavoir le piſtile, & les étamines ; enſorte que quand ces parties manquent, les Plantes ſont incapables de produire des graines fécondes. C'eſt ce qui ne peut, juſqu'à préſent, nous faire connoitre ce qui ſert à féconder les Polypes, parce que nous n'avons rien découvert dans ces Animaux, qui fût analogue aux fleurs de Plantes, & à la graine qu'elles produiſent.

MAIS ce qui ſe paſſe dans les fleurs des Plantes, influe-t-il ſur leur fécondité à l'égard des boutures & des rejettons? Par exemple, la Vigne peut-elle multiplier par bouture, & l'Orme par rejettons, indépendamment de ce qui ſe paſſe dans leurs fleurs; ou la Vigne ne peut-elle multiplier par bouture, & l'Orme par rejettons, que lorſque ce qui ſert à féconder les graines, s'eſt paſſé dans les fleurs? Il ſera néceſſaire d'entrer dans une petite Diſcuſſion pour répondre à cette queſtion : & ce que je dirai à cette occaſion, pourra peut être ſervir à nous faire, au moins, entrevoir un rapport encore plus grand entre les Polypes, & les Plantes qui multiplient par boutures, & par rejettons.

IL eſt fort vraiſemblable que ce qui ſe paſſe dans les fleurs, ne ſert à les féconder que par rapport aux graines, & nullement par rapport aux rejettons & aux boutures. Voici le Fait, ſur lequel je fonde ce que je dis. Il n'y a rien de plus connu que ces fleurs, qui ſont naturellement ſimples, mais, qui deviennent quelquefois doubles. On ſait que les Plantes, qui ont des fleurs ſimples, donnent de la graine, mais que cel-

celles de la même eſpéce qui ont des fleurs doubles, n'en donnent point, & on n'ignore pas que ce qui a rendu ces Plantes à fleurs doubles, incapables de porter des graines, c'eſt que les parties, qui ſervent à la fécondation & à la formation de la graine, ſont devenues des pétales. Ce qui ſe paſſe dans les fleurs, & qui ſert à la fécondation des Plantes par rapport aux graines, n'a donc pas lieu dans les Plantes à fleurs doubles, dont nous venons de parler. La choſe n'a, par exemple, pas lieu dans une Plante de Giroflier double. Cependant, indépendamment de cela, cette Plante multiplie par rejettons, & les rejettons peuvent en produire d'autres, qui, de générations en générations, ſeront toûjours également propres à multiplier de cette maniére. C'eſt ce que l'Expérience nous apprend, & d'où l'on peut conclure, qu'un Giroflier double peut multiplier par rejettons, indépendamment de ce qui ſe paſſe dans ſes fleurs.

On pourroit même, peut-être, étendre cette concluſion aux Plantes qui ont des fleurs parfaites, & qui peuvent multiplier par graine. Suivant ce raiſonnement, on pourroit, par exemple, dire, que ce qui ſe paſſe dans les fleurs d'un Orme, & d'où réſulte la fécondation des graines, n'influe point ſur la fécondation de cet arbre par rapport aux rejettons, qu'il en peut produire indépendamment de ce qui ſe paſſe dans ſes fleurs; & même que les rejettons qu'il produira, ſeront non ſeulement en état de multiplier par rejettons, mais auſſi par graines. Il ſemble donc qu'à l'égard des rejettons, les Plantes ſont fécondes par elles-mêmes. Ce que j'ai dit des

rejettons, peut auſſi ſe dire des boutures. Il eſt fort apparent que ce qui fait qu'une bouture peut devenir une Plante parfaite, & multiplier enſuite, & par boutures, & par rejettons, n'a pas de rapport à ce qui ſe paſſe dans les fleurs, & qui influe ſur les graines. Le ſarment d'une Vigne, par exemple, eſt également propre à fournir des boutures, ſoit qu'il ait eu des fleurs, ou qu'il n'en ait point eu.

N'EN ſeroit-il donc point des Polypes, comme des Plantes qui multiplient par rejettons & par boutures? Ne ſeroient-ils point féconds par eux-mêmes, propres à produire des rejettons & des boutures, ſans qu'il ſe ſoit paſſé en eux rien d'analogue à ce que nous connoiſſons dans pluſieurs Animaux, & à ce qu'on a lieu de ſoupçonner dans les fleurs des Plantes?

ON eſt actuellement en état de juger, que la maniére extraordinaire dont les Polypes à bras en forme de cornes, peuvent ſe multiplier par la ſection de leurs parties, n'eſt pas la ſeule propriété ſinguliére, qui les diſtingue de tant d'autres Animaux, & qui ait été ſi long-tems inconnue dans cette claſſe de corps organiſés. Leur maniére naturelle de ſe multiplier par rejettons, doit être miſe dans le même rang; & elle n'eſt pas moins propre à nous apprendre, combien les Régles prétendues generales, qui ont été admiſes preſque univerſellement, méritent peu ce nom, quand même on ne trouveroit d'autres exceptions que celles que forment les Polypes dont je donne l'Hiſtoire.

MR. de Reaumur nous a appris, dans la Préface du

ſixié-

ſixiéme Volume de ſes Mémoires ſur l'Hiſtoire des Inſectes *, que pluſieurs Curieux, après avoir été informés qu'on pouvoit multiplier les Polypes en les coupant, ont découvert la même propriété dans differentes eſpéces de Vers; & cette Expérience a encore réuſſi ſur un plus grand nombre d'Animaux, depuis que cette Préface eſt écrite. Il étoit bien vraiſemblable, comme le dit ce célébre Naturaliſte, *que les Polypes ne devoient pas être les ſeuls auxquels il eût été accordé de pouvoir être multipliés d'une façon ſi étrange. Plus on examine les productions & les opérations de la Nature, & plus on reſte convaincu qu'il ne s'y trouve rien d'unique.* C'eſt, je crois, ce qui peut s'appliquer à l'une & l'autre maniére de multiplier des Polypes: & en conſéquence de ce principe, il y avoit lieu de penſer, après avoir vu pouſſer des rejettons aux Polypes, que cette Façon de multiplier, quelque étrange qu'elle parût, n'étoit pas particuliére à ces ſeuls Animaux; mais, qu'elle étoit au contraire commune à pluſieurs autres, de différentes eſpéces, & même de différens genres.

* Pag. 55, & ſuiv.

Quelque fondée que fût cette conjecture, on ne pouvoit que déſirer de la voir confirmer par des Exemples. Je n'eus pas beſoin d'attendre long-tems pour en trouver un très remarquable. La Figure des Animaux qui me l'ont fourni, m'a engagé à les ranger dans la claſſe des Polypes. Leurs bras ſont placés à leur extrémité antérieure, autour de leur bouche. Ils ſont rangés fort réguliérement, & forment un joli pannache *. Celui de cette Figure eſt repréſenté fort en grand. On les voit de grandeur naturelle dans la

* PL. X. Fig. 8. *a a a a a.*

* *p, p, p.* Figure 9 *. J'ai donné à ces Animaux le nom de Polypes à pannache, pour les diſtinguer des autres Polypes.

En cherchant des Polypes verds au mois d'Avril 1741, je trouvai, comme je l'ai déjà dit, les premiers Polypes de la ſeconde eſpéce que j'ai vus. Ce fut en même tems que je découvris les Polypes à pannache. Il y en avoit pluſieurs, ſur les Plantes aquatiques, que j'avois raſſemblées dans des verres pleins d'eau. Ces Polypes à pannache excitérent extrêmement ma curioſité. Ils réveillérent d'abord dans mon eſprit l'idée d'une fleur épanoüie *, & comme il y en avoit pluſieurs enſemble, ils formoient une ſorte de bouquet *. Il faut que je décrive un peu plus en détail la ſtructure de ces Animaux, afin que je puiſſe me faire mieux entendre, lorſque j'en viendrai à leur maniére de multiplier par rejettons.

* PL. X. Fig. 8. *i b a d c.*

* Fig. 9.

Leur corps * a environ une ligne de longueur, ſans compter le pannache *, qui eſt preſque auſſi long que le corps. Celui-ci eſt fort mince, il eſt à peu près cylindrique, & ſa peau eſt parfaitement tranſparente. Le pannache n'eſt qu'une continuation de cette peau tranſparente; il eſt fort large à proportion du corps, & d'une figure très remarquable. Sa baſe * eſt faite en forme de fer de cheval, & des bords de cette baſe ſortent les bras * du Polype: ils ſont tous un peu recourbés en dehors. Le pannache, qu'ils forment par leur aſſemblage, a l'air d'une fleur monopétale épanoüie. Ces bras ſont fort près les uns des autres: j'en ai compté au-delà de ſoixante à un ſeul pannache. On pourroit les comparer, par rapport à leur épaiſſeur & à leur tranſparence, à des fils de ver-

* Fig. 9. *i e.* Fig. 8. *i b a e.*

* Fig. 9. *e.* Fig. 8. *a c d d e.*

* PL. X. Fig. 8. *e a c.*

* *a d, a d, a d.*

verre très fins. La baſe du pannache eſt creuſée en goutiére, elle tient au Polype par le milieu * du fer à cheval qu'elle forme, & c'eſt-là qu'eſt une ouverture, qui ſert de bouche à cet Animal. Ses inteſtins * ſe diſtinguent facilement à travers la peau tranſparente de ſon corps. Ils ſont d'un brun aſſez foncé dans les Polypes qui ont bien mangé. Après avoir obſervé pendant quelque tems les Polypes à pannache, & être parvenu à les voir manger, j'ai été en état de diſtinguer trois parties principales dans leurs inteſtins, ſavoir, l'éſophage *, l'eſtomac †, & l'inteſtin droit *.

* PL. X. Fig. 8. *e.*

* *e b, f g, f a.*

* *e b.* † *f g.* * *f a.*

Ces Animaux ont, ce me ſemble, encore plus l'air de Plante, que les Polypes à bras en forme de cornes. Auſſi de très habiles Naturaliſtes en ont-ils pris diverſes eſpéces, qu'ils ont remarquées ſur la ſuperficie de différentes prétendues Plantes marines, pour des fleurs & pour des racines. S'ils avoient eu occaſion d'obſerver dans ces Polypes à pannache marins, une propriété, qu'ils ont apparemment, auſſi-bien que les nôtres d'eau douce, ils auroient reconnu ces Animaux pour ce qu'ils étoient. Ils ſont voraces, & même très voraces, au moins ceux de l'eſpéce que j'ai obſervée. A la vérité, ils ne peuvent manger que des Animaux fort petits, mais en un jour ils en dévorent un grand nombre. Le pannache des Polypes eſt, pour ces petits Animaux, un goufre dans lequel ſont précipités la plupart de ceux qui en approchent en nageant. Si l'on obſerve attentivement à la loupe des Polypes à pannache, placés dans de l'eau bien peuplée de fort petits Inſectes, il ſera très facile

de remarquer par quel moïen ils attirent leur proie & la font tomber dans leur bouche: on verra d'inſtant en inſtant un bras ou deux ſe recourber ſubitement en dedans du pannache, & puis ſe remettre dans leur premiére ſituation. Il arrive rarement que le même bras ſe recourbe deux fois de ſuite. Si en même tems qu'on examine l'action de ces bras, on jette un coup d'œil autour du pannache, on remarque de petits Animaux, qui nagent au-deſſus, & qui ſont ſucceſſivement précipités dans ce pannache, à meſure que les bras ſe courbent. Ces bras ne touchent point la proie, mais, ils occaſionnent dans l'eau par leur mouvement une ſorte de tournant, qui la conduit dans le pannache. Elle fait ſouvent des efforts pour s'échapper, mais, l'inflexion ſubite d'un bras donne au torrent qui l'entraine, un nouveau degré de rapidité, qui la porte, malgré elle, juſqu'au fond du pannache. J'ai dit que ce fond, cette baſe du pannache, étoit creuſée en goutiére. Les petits Inſectes, qui doivent ſervir de proie au Polype, tombent donc dans cette goutiére, & ils coulent enſuite dans la bouche, qui eſt au milieu *. Quand le Polype ſe préſente à l'œil de côté, on peut facilement lui voir avaler ſa proie. On la voit paſſer de l'éſophage dans l'eſtomac, & ſi elle n'eſt pas extrêmement petite, on la diſtingue même dans cet eſtomac, parce que toutes les parties de ces Polypes ſont tranſparentes. J'appelle l'éſophage, ce petit canal * qui va de la bouche juſqu'à un ſac *, qui ſert d'eſtomac au Polype. L'éſophage finit un peu au-deſſous de l'extrémité ſupérieure de l'eſtomac, ſavoir en *b*. Les alimens rendent cet eſtomac

* PL. X. Fig. 8. *e*.

* *e b*.

* *f g*.

tomac très reconnoiſſable. Ils ſont balottés dedans d'une maniére très ſenſible, & beaucoup plus vite que dans les Polypes à bras en forme de cornes. Ils ſont ſucceſſivement pouſſés de bas en haut, & de haut en bas. On peut facilement ſe tromper ſur la véritable longueur de l'eſtomac. On pourroit croire qu'il va juſqu'à la baſe du pannache. Mais, pour prévenir cette erreur, il ſuffit de bien remarquer juſqu'où ſont portés les alimens, lorſqu'ils ſont pouſſés vers le haut de l'eſtomac. On s'appercevra qu'ils s'arrétent un peu au-deſſus de l'endroit où l'éſophage rencontre l'eſtomac; & que c'eſt de là * qu'ils partent pour retourner vers l'autre extrémité *. Entre ce bout ſupérieur de l'eſtomac & la baſe du pannache, il y a donc un eſpace occupé par un petit ſac *, qui eſt très ſouvent parfaitement rempli par une matiére brune, & plus foncée que celle qui eſt dans l'eſtomac. Ce ſac eſt l'inteſtin droit, & cette matiére brune eſt celle des excrémens. Elle forme un grain un peu oblong, très facile à remarquer, & qui occupe toute la capacité de l'inteſtin droit. Il ſe vuide entiérement en une ſeule fois. Ce grain de matiére brune qui le remplit, en ſort tout entier par une ouverture qui eſt à la baſe, ou à côté de la baſe du pannache. J'ai vu ſouvent des Polypes rendre leurs excrémens, mais, je n'ai jamais pu découvrir préciſément la ſituation de l'ouverture dont ils ſortoient. Après que le Polype a rendu ſes excrémens, l'inteſtin droit, qui eſt alors vuide, paroit d'un brun fort clair; il eſt même aſſez tranſparent. Si cet Animal eſt dans une eau bien peu-

* PL. X. Fig. 8. *f.*
* *g.*
* *fa.*

peuplée d'Inſectes, & s'il en avale beaucoup, comme cela arrive ordinairement, de nouveaux excrémens paſſeront bientôt de l'eſtomac dans l'inteſtin droit; il ſe remplira, & reprendra ſa premiére couleur & ſon opacité.

J'AI dit ci-deſſus, que les Polypes à pannache, pour attirer leur proie dans leur bouche, recourbent en dedans quelques-uns de leurs bras. On voit faire quelquefois un autre mouvement à ces bras. C'eſt lorſqu'il eſt tombé dans le pannache un Animal trop grand pour pouvoir être avalé, ou quelque autre corps. Les Polypes, pour s'en débarraſſer, ouvrent leur pannache en tout, ou en partie; ils renverſent beaucoup leurs bras en dehors, & les remettent enſuite dans leur attitude ordinaire. Ces bras ſe renverſent & ſe remettent tous enſemble.

LES Polypes à bras en forme de cornes, ſe contractent lorſqu'on les touche, lorſqu'on remue le corps auquel ils ſont attachés; mais, ceux à pannache ſont incapables de contraction. L'attouchement, ou le mouvement qu'on leur fait éprouver, ne laiſſent pas cependant de changer beaucoup leur attitude & leur ſituation: ils diſparoiſſent même alors très ſubitement; ils ſe retirent entiérement dans une cellule *, qui eſt d'une matiére ſemblable à celle des parties que j'ai déjà décrites, & dont le corps de ces Animaux eſt une production. On peut voir très diſtinctement, à travers les parois tranſparentes de cette cellule, le Polype, lorſqu'il s'y eſt retiré *. Pour comprendre dans quelle ſituation eſt un Polype, qui eſt retiré dans la cellule, on doit ſavoir, que la peau du Po-

* PL. X. Fig. 8. *i k l b i m.*

* *i o g.*

Polype eſt attachée à l'orifice * de la cellule, enſorte que quand il rentre dedans, cette peau ne peut pas le ſuivre. Elle reſte donc attachée par ſon extrémité inférieure à l'orifice de la cellule, & elle y rentre en ſe renverſant. Le pannache, qui tient par ſa baſe à l'extrémité ſupérieure * de cette peau, rentre avec elle, & ſe trouve logé dans le tuïau qu'elle forme lorſqu'elle eſt toute rentrée & toute renverſée *. Les inteſtins ſont plus enfoncés dans la cellule, qu'aucune autre partie *. Comme l'orifice de la cellule & le tuïau que forme la peau, ſont beaucoup plus étroits que le pannache, il eſt obligé de ſe fermer pour pouvoir y entrer: les bras ſe rapprochent, comme le feroient les barbes d'une plume qu'on forceroit à entrer dans un tuïau étroit *. Après avoir vu le Polype ſe cacher dans ſa cellule, on l'en verra bientôt ſortir, ſi on le laiſſe tranquille. On voit paroitre les bras, qui ſont d'abord réunis en faiſceau; mais, quand ils ſont environ ſortis à moitié, ils commencent à s'éloigner par leur extrémité; enfin le pannache s'ouvre, il reparoit comme il étoit auparavant, & le corps ſe montre en dehors de la cellule.

* PL. X. Fig. 8. *i b*, i b.

* *a*.

* a b.

* *a g*.

* a g.

Si l'on obſerve avec attention un Polype qui ſort de ſa cellule, on verra une choſe qui prouve clairement, que la peau ſe retourne lorſqu'il y entre, & qu'elle renferme enſuite le pannache. Quand le pannache commence à paroitre hors de la cellule, on remarque la peau qui paroit avec lui, on voit le pannache ſe dégager de cette peau, à meſure qu'elle ſe remet dans ſon premier état, & les inteſtins entrer dans le tuïau qu'elle forme de nouveau en dehors.

J'ai vu distinctement, lorsque les Polypes à pannache étoient bien en dehors de leur cellule, un fil qui tenoit d'un côté à l'extrémité inférieure de l'estomac *, & de l'autre au fond de la cellule; j'en ai vu d'autres qui m'ont paru s'attacher par une extrémité près de la base du pannache, & par l'autre aussi au fond de la cellule *. Il est apparent que ces fils servent à retirer le Polype dans la cellule.

* PL. X. Fig. 8. g o.

* o o.

On trouve rarement un Polype à pannache seul. Il y en a ordinairement plusieurs ensemble; & ceux de l'espéce dont je parle, sont rangés à côté les uns des autres. Souvent il y en a plusieurs qui sortent d'une même cellule *, mais par des orifices differens *. Ce que je vais dire sur la maniére dont ces Animaux multiplient, servira en même tems à expliquer pourquoi ils se trouvent ainsi les uns à côté des autres.

* i k l b m.

* i b, i b, x y. & Fig. 9.

Il faut avoir une idée bien nette de la figure des Polypes à pannache, & être déjà exercé à les observer, pour voir distinctement les jeunes lorsqu'ils commencent à pousser. Il se fait d'abord une petite élevation sur la superficie de la cellule d'un Polype déjà formé, on découvre ensuite le corps & le pannache *, ou plutôt la base du pannache † du jeune qui commence à pousser, & la pointe des bras * qui sortent des bords de cette base. Ces bras croissent à mesure que le corps croît. Le jeune Polype est d'ordinaire en état de manger au bout de quelques jours. Ses intestins, qui étoient d'abord tout-à-fait transparens, deviennent bruns, après qu'il a pris des alimens.

* Fig. 9. r, r.

† Fig. 8. t s.

* u, u, u.

Quand la nourriture est abondante dans l'eau où sont

ſont les Polypes à pannache, les jeunes pouſſent en grande quantité. J'en ai ſouvent vu plus de cent qui étoient réünis enſemble, & qui formoient un fort joli bouquet. Ils ſe ſéparent enſuite, mais non un à un. Le bouquet ſe partage en deux ou trois parties, qui ont plus ou moins de Polypes *. Cette ſéparation ſe fait fort inſenſiblement. D'abord la maſſe que forment toutes les cellules, ou pour mieux dire, la cellule commune, ſe diviſe en deux ou trois branches, & puis ces branches ſe ſéparent peu à peu entiérement les unes des autres. Pour obſerver commodément ce que je viens de décrire, j'ai fait enſorte que des bouquets de Polypes à pannache ſe ſont attachés contre les parois d'un poudrier. J'ai pu les obſerver avec une forte loupe. Non ſeulement j'ai vu par ce moïen multiplier ces Animaux, & les différentes branches des bouquets qu'ils forment, ſe ſéparer; mais j'ai encore remarqué que ces branches s'éloignoient enſuite les unes des autres. Leur mouvement progreſſif eſt ſi lent, qu'il eſt abſolument imperceptible. Je n'ai jamais obſervé de Polypier peuplé de Polypes, qui ait fait plus de demi-pouce de chemin en huit jours de tems. J'en ai auſſi obſervé pluſieurs, qui ſont pendant très long-tems reſtés au même endroit.

* PL. X. Fig. 9.

J'AI dit ci-deſſus que le corps des Polypes étoit une production de la cellule dans laquelle ils ſe retirent, afin qu'on ne crût pas qu'elles ſont leur ouvrage, comme les foureaux de Teignes ſont l'ouvrage des Teignes. Les cellules doivent être regardées comme une partie du corps des Polypes, elles croiſſent avec

lui, & comme lui, & ſont compoſées de la même matiére, au moins celles des Polypes à pannache que j'ai obſervés.

Ce que je viens de dire ſur la maniére dont les jeunes Polypes à pannache pouſſent aux côtés de ceux qui ſont déjà formés, ſuffit pour faire ſentir le grand rapport qu'ils ont à cet égard avec les Polypes à bras en forme de cornes; c'eſt-à-dire, qu'ils multiplient par rejettons, comme ces derniers. Ils nous fourniſſent par conſéquent un ſecond exemple de cette maniére de multiplier, parmi les Animaux.

Mr. de Reaumur en rapporte encore pluſieurs exemples dans la Préface du ſixiéme Tome des Mémoires pour ſervir à l'Hiſtoire des Inſectes *; ſavoir, ceux de diverſes eſpéces de Polypes à pannache marins. Il en a même découvert de nouvelles, depuis que cette Préface eſt écrite, & il eſt plus que vraiſemblable qu'un grand nombre de corps organiſés, qu'on a pris ſi long-tems pour des Plantes, ſe trouveront auſſi être des Polypiers, remplis de Polypes. Ce qui rend cette conjecture très vraiſemblable, c'eſt le rapport qu'ont entre eux tous ces corps, qu'on a rangés dans la claſſe des Plantes marines, & dont pluſieurs ſont certainement des amas de Polypes.

* Pag. 76. & ſuiv.

Je n'entrerai pas dans un plus grand détail ſur ce ſujet: je ne ſaurois mieux faire que de renvoier à ce que dit Mr. de Reaumur dans la Préface que j'ai citée, & à ce que lui & Mr. Bernard de Juſſieu donneront encore au Public ſur un ſujet ſi intéreſſant.

Je crois devoir faire encore mention d'un Fait touchant les Polypes d'eau douce à pannache. Ils multi-

tiplient non ſeulement par rejettons, mais ils ſont auſſi des œufs. C'eſt ce que nous apprend Mr. de Reaumur dans la Préface dont j'ai fait mention ci-deſſus *. Il a obſervé avec Mr. Bernard de Juſſieu, que les Polypes d'eau douce à pannache ont pondu des œufs bruns & un peu applatis, & ces Meſſieurs ont vu naitre des petits de ces œufs. J'ai vu dans pluſieurs des Polypes à pannache, ſur leſquels j'ai fait mes Obſervations, de petits corps ſphériques de différentes grandeurs, blancs & tranſparens. J'ai ſeulement ſoupçonné que ces petits corps étoient des œufs, mais je n'ai pas eu occaſion d'examiner ſi ce ſoupçon étoit fondé, ou non. Ces petits corps dont je parle, étoient très faciles à diſtinguer à travers la peau tranſparente du Polype, & celle de la cellule. Ils étoient dans un mouvement continuel, & comme balottés d'un endroit à l'autre. Je les voiois paſſer de la cellule * dans le corps d'un Polype †, & monter, entre la peau & les inteſtins, juſque près de la racine du pannache *, & de là retourner enſuite dans la cellule. Ce n'eſt pas tout : ceux, qui ſortoient du corps d'un Polype, & paſſoient dans la cellule, n'étoient pas toûjours pouſſés de nouveau dans le corps du même Polype, mais ſucceſſivement dans celui de divers autres. C'eſt à quoi j'ai fait une grande attention, parce que ce Fait prouve clairement, que les cellules de différens Polypes communiquent entre elles, ou plutôt que pluſieurs de ces Animaux ont une cellule commune: & ſi ces corps ſphériques, que j'ai vus paſſer ſucceſſivement dans le corps de différens Polypes, ſont des œufs, on pourroit dire que ces

* Pag. 76.

* PL. X. Fig. 8. *i k l* b *m*.

† *a b i e*.

* *e*.

œufs ſont en commun à tous les Polypes, dont les corps communiquent enſemble par leur cellule.

ON a vu ci-deſſus, que les Polypes à bras en forme de cornes, ſe partagent quelquefois d'eux-mêmes, c'eſt-à-dire, qu'ils multiplient quelquefois d'eux-mêmes par boutures. Cependant, comme je l'ai déjà dit, il m'a paru que cela arrivoit trop rarement, pour qu'on pût dire que cette maniére de ſe multiplier ſoit ordinaire & naturelle aux Polypes ; & ſur-tout, pour qu'on pût la mettre dans le même rang que leur maniére de multiplier par rejettons. Mais il y a des Animaux qu'on multiplie auſſi, en les coupant, comme les Polypes, & qui ont la propriété de ſe ſéparer d'eux-mêmes, & de multiplier par boutures très fréquemment. Je connois une eſpéce de Vers, que j'ai déjà obſervés avec attention, qui multiplient beaucoup, & que je n'ai vus encore multiplier que par boutures. Il s'agit des Mille-pieds à dard, dont j'ai parlé dans le ſecond Mémoire *. Mr. de Reaumur a coupé de ces Mille-pieds, & il nous apprend, dans la Préface du ſixiéme Tome des Mémoires ſur les Inſectes *, le ſuccès de ſon Expérience. Il a vu chaque portion de Mille-pieds devenir un Mille-pieds complet. C'eſt, en faiſant la même Expérience ſur ces Animaux, que j'ai appris que la multiplication par bouture, avoit non ſeulement lieu en eux lorſqu'on les coupoit, mais auſſi naturellement. Ce fut dans le mois de Mai 1741 que j'eſſaïai pour la premiére fois de couper un Mille-pieds à dard en deux parties, pour voir

* PL. VI. Fig. 1. Pag. 80. & ſuiv.

* Pag. 59.

voir s'il avoit la même propriété que les Polypes que j'obſervois. Je mis les deux moitiés dans un verre plat. Elles étoient faciles à diſtinguer l'une de l'autre. La premiére avoit à ſon extrémité antérieure une tête, très remarquable par le dard charnu qui la termine *, & par un point noir qu'elle a de chaque côté. Ces deux points noirs ſont, peut-être, les yeux du Mille-pieds. Environ demi-heure après avoir ſéparé les deux moitiés dont il s'agit ici, je vins les conſiderer avec une loupe; & quelle ne fut pas ma ſurpriſe, lorſque je m'apperçus que chacune avoit une tête parfaitement formée! Il n'y avoit nulle apparence qu'il fût venu, en auſſi peu de tems, une tête à la ſeconde partie du Mille-pieds; & en effet, je ne pouvois me perſuader, que ce fût-là l'explication de l'énygme qui m'embarraſſoit. Je me mis d'abord à couper un autre Mille-pieds en deux, afin de tâcher de juger du Fait ſingulier que je venois de voir. Il arriva encore, à l'égard de celui-là, ce qui étoit arrivé à l'égard du premier. Je trouvai, peu après la ſection, que les deux portions de cet Inſecte avoient chacune une tête, & étoient des Mille-pieds complets. Mais, je trouvai dans le même verre plat, où j'avois mis les portions du ſecond Mille-pieds que j'avois coupé, outre les deux qui avoient une tête, une troiſiéme portion fort courte & ſans tête. Ce fut encore une énygme pour moi, de ſavoir d'où venoit cette troiſiéme portion; car, j'étois bien ſûr que j'avois ſeulement coupé le Mille-pieds en deux. Je penſai à obſerver des Mille-pieds entiers avec plus d'at-

* PL. VI. Fig. 1. *d.*

d'attention que je n'avois fait juſqu'alors; & c'eſt par ce moïen que j'ai trouvé ce que je cherchois. Je vis pluſieurs de ces Animaux, qui paroiſſoient être, non un ſeul Mille-pieds, mais deux, mis bout à bout. La tête de l'un étoit un peu inſérée dans le dernier anneau de l'autre, & ſon dard étoit dirigé perpendiculairement en deſſus. Je jugeai donc que les Mille-pieds que j'avois coupés, étoient ſemblables à ceux-là, & que l'opération que je leur avois faite, avoit obligé ces deux Mille-pieds réünis à ſe ſéparer. Il me parut vraiſemblable, que cette portion, fort courte & ſans tête, que j'avois trouvée dans le verre où étoient les portions du ſecond Mille-pieds qui avoit été coupé en deux, n'étoit autre choſe, que la partie poſtérieure du Mille-pieds antérieur. J'avois apparemment coupé ce Mille-pieds à peu de diſtance de ſon extrémité poſtérieure, de l'endroit où la tête du Mille-pieds poſtérieur étoit inſérée; c'eſt-à-dire, qu'un bout du Mille-pieds antérieur étoit reſté uni au Mille-pieds poſtérieur. Il s'en étoit peu après ſéparé, & avoit formé cette troiſiéme portion que j'avois trouvée dans le verre.

Après avoir découvert ce que je viens de rapporter, je fus très curieux de ſavoir, pourquoi pluſieurs Mille-pieds ſe trouvoient deux à deux, & mis bout à bout l'un de l'autre. J'en conſidérai pluſieurs de ſuite, qui étoient dans cet état; & la variété, que je remarquai entre eux, me donna déjà lieu de ſoupçonner que ces Mille-pieds réünis, n'avoient jamais été ſéparés auparavant. Voici enfin ce que j'ai appris, après avoir obſervé ces Animaux pendant quelque tems.

Un

Un Mille-pieds, qui n'eſt pas double, le peut devenir en peu de jours. Il ſe forme une tête, environ aux deux tiers de ſon corps, à compter du bout antérieur. On voit diſtinctement le dard charnu de cette tête, qui croît perpendiculairement en deſſus du corps du Mille-pieds; les points noirs paroiſſent aux deux côtés de la tête; enfin le nouveau Mille-pieds, qui n'eſt autre choſe, que la portion poſtérieure de celui dont il eſt venu, ce nouveau Mille-pieds eſt en état de ſe ſéparer, & ſe ſépare de lui-même. Je ne me ſuis pas contenté d'obſerver de ſuite la formation de quelques-uns de ces Animaux, j'ai repeté très ſouvent cette Obſervation, & j'ai toûjours vu la même choſe. J'ai nourri en ſolitude de jeunes Mille-pieds que j'ai tirés du verre dans lequel étoit leur mere, le moment même de leur ſéparation, je les ai vu croître, j'ai vu leur bout poſtérieur devenir un Mille-pieds, & ſe ſéparer. J'ai vu le même Mille-pieds produire ſucceſſivement en quelques ſemaines pluſieurs petits, pluſieurs boutures; & des verres, dans leſquels je n'en avois d'abord que quelques-uns, en ont été fort peuplés au bout de quelque tems.

On peut juger, par ce que je viens de dire de ces Animaux, qu'ils méritent fort d'être obſervés avec attention: c'eſt auſſi ce que je me propoſe de faire. Ce que nous en ſavons à préſent, ſuffit pour nous prouver, qu'ils fourniſſent véritablement un Exemple d'Animaux qui multiplient naturellement par boutures. Mr. Lyonet, qui eſt le premier qui ait coupé des Vers, & qui ait vu chaque partie de-

venir un Ver parfait, a auſſi remarqué, que ces Vers qu'il a coupés, ſe partagent d'eux-mêmes; & c'eſt ce que je crois pouvoir auſſi dire de ceux avec leſquels j'ai nourri pendant long-tems les Polypes. Mais, comme je ne me ſuis pas fait une affaire de les obſerver avec attention, je n'entreprendrai pas de décrire la maniére dont ſe fait, dans ces Animaux, la multiplication par boutures.

EXPLICATION
DES FIGURES
DU TROISIÉME MÉMOIRE.

PLANCHE VIII.

LA Figure 1, repréſente un Polype de la ſeconde eſpéce, dont il ſort deux jeunes Polypes: l'un *e*, n'eſt encore qu'un ſimple bouton de figure cônique; & l'autre *i c*, eſt à peu près cylindrique, & les bras paroiſſent déjà à ſon bout antérieur *c*.

LA Figure 2, eſt celle d'un Polype de la ſeconde eſpéce, qui produit un jeune *a b*, prêt à ſe ſéparer.

LES Figures 3 & 4, ſervent à faire voir la maniére dont les jeunes Polypes ſe ſéparent de leur mere. *a b* Fig 3, eſt une mere fixée par ſes deux extrémités, *a* & *b*, contre un corps quelconque. Le corps de cette mere eſt diſpoſé à peu près en arc *a d b*. Le jeune *c d*, qui tient à ſa mere en *d*, eſt fixé par ſon bout antérieur *c*. Dans cette circonſtance, la mere peut

peut contracter ſon corps, & faire enſorte qu'il devienne la corde *ab* Fig. 4, de l'arc de cercle qu'il formoit auparavant *adb* Fig. 3. Le jeune, reſtant attaché en *c* Fig. 4, ne ſuit pas la mere, & eſt obligé de s'en ſéparer: ils ſe trouvent d'abord à quelque diſtance l'un de l'autre.

LA Figure 5, repréſente le côté intérieur d'un morceau de peau de Polype, dont ſort un jeune. *t*, ouverture de communication qu'il y a entre la mere & ſon petit. *o*, ouverture qui eſt à l'extrémité de la portion reſtante du jeune, dont le bout antérieur a été retranché.

LA Figure 6, repréſente la même portion de Polype que la Fig. 5, mais vue par deſſus. *e*, portion du jeune. *i*, ouverture de communication qui eſt entre la mere & le petit.

ON voit, dans la Figure 7, un Polype *ab* de la ſeconde eſpéce, tel qu'il eſt, quelque tems après avoir mangé un Ver. Une partie du ſuc a paſſé dans les jeunes *d*, *c*, *e*, *i*, *o*, & les a obligés à ſe renfler un peu.

LA Figure 8, repréſente un Polype *a c b* de la troiſiéme eſpéce, né depuis 15 jours, & qui porte déjà dix-neuf petits, y compris ceux qui ſortent des jeunes, que produit cette mere.

LA Figure 9, eſt celle du bouton *e* de la Fig. 1, ſéparé du Polype.

FIGURE 10. Ce même bouton, vu au microſcope.

LA Figure 11, repréſente un Polype *a b* de la troiſiéme eſpéce, remarquable par un de ſes bras *afffff*, qui eſt fourchu en pluſieurs endroits; ſavoir en *c*, *d*, *e* & *i*.

PLANCHE IX.

LA Figure, qui remplit toute cette Planche, repréſente une partie d'un morceau de bois, que j'ai trouvé entre pluſieurs autres dans le mois de Juillet 1742, dans un foſſé de Sorgvliet. Ce morceau de bois eſt couvert de Polypes à longs bras.

PLANCHE X.

LA Figure 1, eſt celle d'une Teigne aquatique, qui eſt repréſentée nageant. Huit Polypes à longs bras ſont fixés par leur bout poſtérieur ſur le foureau de cette Teigne. J'ai vu pluſieurs Polypes, que le mouvement de la Teigne n'obligeoit pas à ſe contracter davantage, que ceux qui ſont repréſentés dans cette Figure.

FIGURE 2. Un Polype de la ſeconde eſpéce, ſur lequel ſont deux petits corps ſphériques *e*, *e*.

ON voit, dans la Figure 3, un Polype de la ſeconde eſpéce, qui a environ un pouce & demi de longueur. Il a dix-huit bras autour de ſa bouche, & outre cela, un autre *cd*, qui ſe trouve déplacé.

LA Figure 4, repréſente un Polype de la troiſiéme eſpéce, dont la partie *ac*, eſt couverte d'excreſcences, à peu près pyramidales, & blanches, qui ſont ſorties du corps de ce Polype.

LA Figure 5, repréſente un Polype *ac*, à deux têtes, ou, ſi l'on veut, deux Polypes *am*, *cm*, placés bout à bout l'un de l'autre, & réünis. Ce Polype eſt

eſt venu d'un jeune, qui a pouſſé en même tems deux têtes, à ſon bout antérieur.

La Figure 6, eſt celle d'un Polype de la ſeconde eſpéce, auquel ſont attachés trois jeunes Polypes côniques *c, c, c,* & qui n'ont chacun qu'un ſeul bras, à l'extrémité du cône.

J'ai nourri plus de deux ans le Polype repréſenté dans la Figure 7. Il avoit, environ un an & demi après ſa naiſſance, ſept queuës extraordinaires *q, q, q, q, q, q, q,* & trois Polypes côniques *c, c, c.*

Les Figures 8 & 9, repréſentent des Polypes à pannache d'eau douce. Il y en a trois, groſſis au microſcope, dans la Figure 8: ſavoir *b f a c d d d e h g i:* qui eſt en dehors de la cellule *i k* g *m b*; i b a g, qui eſt en dedans de la cellule i *m* g *l* b; & le jeune *t x y s,* qui eſt en dehors. *a b i e,* le corps du Polype, à travers la peau tranſparente duquel on diſtingue l'éſophage *e h,* l'eſtomac *f g,* & l'inteſtin droit *a f.* La peau du Polype eſt attachée à l'orifice *i b. a c d d d e* repréſente le pannache, ou la tête du Polype, compoſée de la baſe du pannache *e a c* qu'on ne voit que peu, & des bras *a d, a d, a d* qui ſortent des bords de cette baſe. i b a g fait voir un Polype qui eſt retiré dans la cellule. i a b, la peau du Polype renverſée en dedans, & dans laquelle le pannache eſt logé. a g, les inteſtins. *t s,* la baſe du pannache d'un jeune Polype. *u, u, u,* les bras qui commencent à pouſſer. *g o, f o,* fils attachés par un bout aux inteſtins, & par l'autre au fond de la cellule. Ils ſont repréſentés détachés, ou coupés, dans cette Figure; c'eſt pourquoi ils ne ſont pas tendus en *o, o. i b,* i b, *x y,*

les trois orifices des cellules, qui ſervent chacun à un Polype.

La Figure 9 repréſente un bouquet de Polypes à pannache, de grandeur naturelle, attaché à un morceau de bois *a b*, par la baſe *c d* du Polypier. Cette baſe *c d* n'eſt qu'un amas de la matiére qui a ſervi de cellule aux Polypes, mais qui n'a plus cet uſage, depuis que le Polypier s'eſt augmenté & allongé. On trouve ſouvent des Polypiers qui n'ont point de pareille baſe. *p*, *p*, *p*, pannaches de grandeur naturelle. *i e*, corps d'un Polype de grandeur naturelle. *r*, *r*, jeunes Polypes de grandeur naturelle. On voit, outre cela, dans cette Figure, que le Polypier qu'elle repréſente, a commencé à ſe partager en trois branches, dont l'une eſt prette à ſe ſéparer entiérement des deux autres.


Fig. 2.
Fig. 1.
Fig. 8.
Fig. 11.
Fig. 6.
Fig. 10.
Fig. 9.



Digitized by Google

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 9.

MÉMOIRES POUR L'HISTOIRE DES POLYPES.

QUATRIÈME MÉMOIRE.

Opérations faites ſur les Polypes, & les ſuccès qu'elles ont eu.

LA premiére opération, que j'ai faite ſur les Polypes, a été de les couper *tranſverſalement*. On a vu en general au commencement du premier Mémoire *, quel en a été le ſuccès. J'ai renvoié à celui-ci le détail de cette Expérience. * Pag. 13. &c.

POUR

POUR couper transverſalement un Polype, je le place avec un peu d'eau dans le creux de ma main gauche. Il ſe trouve d'abord contracté au fond de cette eau. On peut, lors même qu'il eſt dans cet état, le couper avec aſſez de facilité, pourvu que l'on ſe ſerve de ciſeaux fort fins. Mais, comme il eſt plus aiſé de le diviſer préciſément où l'on veut, lorſqu'il eſt étendu, je tiens ordinairement la main, dans laquelle il eſt, en repos pendant un moment, pour lui laiſſer le tems de s'étendre; &, quand il eſt tel que je le ſouhaite, je paſſe délicatement, ſous l'endroit de ſon corps où il doit être ſéparé, un des côtés des ciſeaux, que j'ai dans la main droite. Je les ferme enſuite; & d'abord après avoir partagé le Polype, j'examine ſes deux moitiés à la loupe, pour juger du ſuccès de l'opération. Si elle a bien réuſſi, je mets les deux moitiés de Polype, chacune à part dans un verre, où toutes deux enſemble dans le même. Quoiqu'on les mette enſemble dans le même verre, il n'eſt pas à craindre qu'on les confonde, juſqu'à ce que la reproduction, qui doit ſe faire dans la ſeconde partie, ſoit prette d'être achevée.

J'AI mis les portions des Polypes, ſur leſquelles j'ai fait mes Expériences, dans des verres peu profonds, qui ne contenoient que quatre à cinq lignes d'eau. Par ce moïen, j'ai pu toûjours obſerver ces portions avec une loupe, en quelque endroit du verre qu'ils fuſſent.

COMME j'ai eu en même tems pluſieurs verres dans leſquels je tenois des Polypes coupés, j'ai diſtingué chacun de ces verres par un Numero, ou par une

Let-

Lettre; & ces Polypes ont été diſtingués par les mêmes marques dans le Journal de mes Obſervations. Perſonne que moi, n'a touché à mes verres; &, en y mettant de nouvelle eau, j'ai eu un très grand ſoin de ne jamais rien confondre. J'ai pris les mêmes précautions à l'égard de tous les Polypes, ſur leſquels j'ai fait les Expériences, que je rapporterai dans ce Mémoire.

Les deux moitiés d'un Polype, qui viennent d'être ſéparées & placées dans un verre, ſe trouvent d'abord contractées ſur le fond de ce verre. Elles ne reſtent ordinairement pas long-tems ſans s'étendre peu ou beaucoup. La tête de la premiére partie * eſt la tête même du Polype qui a été coupé : cette partie ne différe guères d'un de ces Inſectes complets, même peu de tems après que la ſection a été faite; ſon bout poſtérieur * eſt ſeulement un peu plus large que celui d'un Polype ordinaire, & il a une ouverture très ſenſible. A meſure que cette premiére partie s'étend, l'ouverture, qui eſt à ſon extrémité poſtérieure, ſe ferme, le bout poſtérieur s'étrécit, & devient tel que celui d'un Polype parfait. Il arrive ſouvent, en Eté, que la premiére partie marche & mange, le jour même qu'elle a été ſéparée de l'autre. J'en ai même vu, qui ont mangé immédiatement après la ſection.

* PL. XI. Fig. 1. *a.*

* *c.*

La ſeconde partie *, après s'être un peu étenduc, eſt pour l'ordinaire ouverte à ſon bout antérieur *, les bords de l'ouverture ſont un peu renverſés en dehors. Ils ſe replient enſuite en dedans; & le replis qu'ils forment, ſert à boucher l'ouverture dont je viens

* Fig. 2.

* *c.*

de parler. Le bout antérieur paroit alors ſimplement renflé *; & il l'eſt ordinairement plus ou moins, juſqu'à ce que la reproduction, qui doit s'y faire, ſoit achevée. Je n'ai jamais vu de ſeconde partie qui ait changé de place avant la fin de cette reproduction. La plupart de celles, que j'ai obſervées, ſont reſtées couchées ſur le fond du verre au même endroit, plus ou moins contractées ou étendues, & leur bout poſtérieur, attaché contre le verre. Quelques-unes ſe ſont dreſſées perpendiculairement ſur le fond du verre. Les bras, qui pouſſent à l'extrémité antérieure d'une ſeconde partie, croiſſent préciſément comme ceux des jeunes Polypes. On voit d'abord les pointes de trois ou quatre, qui ſortent des bords de cette extrémité *; &, pendant que ces premiers croiſſent, il en paroit d'autres dans les intervalles qu'ils laiſſent entre eux. Avant même que ces bras aient fini leur accroiſſement, ils peuvent arrêter une proie; & la bouche ſe trouvant dès-lors parfaitement formée, cette proie eſt avalée, comme elle pourroit l'être par un Polype complet.

* PL. XI. Fig. 3. c.

* Fig. 4. c.

La reproduction, dont je viens de parler, ſe fait plus ou moins vîte, ſuivant qu'il fait plus ou moins chaud. J'ai vu, dans le fort de l'Eté, des ſecondes parties, dont les bras ont commencé à pouſſer au bout de vingt-quatre heures; & qui, en deux jours, ont été en état de manger: &, dans un tems froid, j'en ai vu, dont la tête n'a été formée qu'en quinze ou vingt jours.

Il m'a paru, que, toutes choſes égales, la réproduction ſe faiſoit plus vîte dans la ſeconde partie d'un Po-

Polype bien nourri, que dans celle d'un Polype qui a jeûné depuis quelque tems.

Dès qu'une ſeconde moitié a acquis une tête, c'eſt-à-dire, dès que la bouche eſt formée, & que les bras ſont venus, elle reſſemble parfaitement, de même que la premiére, à un Polype qui n'a jamais été diviſé; & elles peuvent l'une & l'autre être regardées comme des Polypes parfaits. Elles ont toutes les propriétés connues dans ces Animaux: elles font tous les mouvemens dont ils ſont ſuſceptibles: elles arrêtent des proies: elles s'en nourriſſent: elles croiſſent & multiplient.

Si l'on coupe transverſalement des Polypes qui pouſſent des petits, ces petits continuent à croître après la ſection, dans quelque partie qu'ils ſe trouvent.

Il arrive ſouvent, que des ſecondes parties, qui n'ont point de petits lors de la ſection, en pouſſent avant que d'avoir pu manger, avant que d'avoir des bras. Il m'a paru que la pouſſe de ces jeunes retarde quelquefois celle des bras. J'ai vu ſortir un jeune Polype ſi près du bout antérieur d'une ſeconde partie, qu'après avoir un peu crû, il s'eſt confondu avec ce bout auquel il n'étoit point encore venu de tête. Ce jeune paroiſſoit être le bout antérieur de cette ſeconde partie: mais, il étoit un peu incliné, & faiſoit avec elle un angle fort obtus, au-lieu de former une ligne droite. Quand il a pu manger, je lui ai donné des Vers, qui ont paſſé de ſon eſtomac dans la portion de Polype dont il ſortoit, comme ils paſſent de la bouche d'un Polype entier, dans ſon eſtomac. Quelque tems après, l'extrémité poſtérieure du jeu-

ne Polype s'eſt rétrécie ; enſuite il s'eſt ſéparé. La ſeconde partie eſt reſtée encore quelques jours ſans bras, qui enfin ont commencé à paroitre à ſon bout antérieur; il en eſt venu ſix.

NON content de ſavoir que les portions des Polypes, diviſés en deux, marchoient, mangeoient, & multiplioient, j'ai voulu encore m'aſſurer ſi elles avoient pour la lumiére, le même penchant qui ſe fait remarquer dans les Polypes qui n'ont pas été partagés *. J'ai donc coupé en deux un nombre conſidérable de Polypes, j'ai mis les premiéres parties dans un verre, & les ſecondes dans un autre; & j'ai vu, par des Expériences très ſouvent réïtérées, que les unes & les autres cherchoient l'endroit du verre le plus éclairé.

* Voi. Mém. I. pag. 11. & pag. 66.

EN quelque endroit que l'on coupe un Polype, au milieu de ſon corps, ou plus ou moins près du boût antérieur, ou du bout poſtérieur, l'Expérience réuſſit également; les portions deviennent également des Polypes complets. Cela eſt même vrai par rapport aux Polypes à longs bras, quand on les coupe au-deſſous de l'endroit où leur corps commence à ſe rétrécir; c'eſt-à-dire, que, lorſqu'on ſépare une partie de cette queuë du reſte du corps, cette partie même devient un Polype parfait. A la vérité, il faut du tems pour cela; & il arrive quelquefois, que la portion de Polype meurt par accident, avant que la reproduction ait pu avoir lieu.

J'AI ſouvent coupé ſimplement les bords du bout antérieur d'un Polype, c'eſt-à-dire, ce cercle dont fortent les bras *: &, quelque mince qu'il fût, il

* PL. XI. Fig. 5.

s'en

s'en eſt formé un Polype, qui, au commencement, étoit tout bras, mais dont le corps eſt enſuite devenu auſſi grand que celui des autres, lorſque j'ai eu ſoin de lui donner à manger. Il arrive quelquefois, que de pareils Polypes prennent d'abord une forme aſſés irréguliére, & que quelques-uns de leurs bras ſe trouvent placés ailleurs qu'à leur bout antérieur, comme je l'ai déjà dit dans le Mémoire précédent.

Il y a plus: des parties même de cercles, pareils à celui dont je viens de parler, des morceaux qui n'avoient que deux * ou trois bras, ſont devenus des Polypes parfaits. Il eſt revenu des bras, pour ſuppléer à ceux qui manquoient. * PL. XI. Fig. 6.

J'ai ſéparé des bras, & je les ai obſervés pour voir s'ils ne deviendroient point des Polypes. L'Expérience n'a pas réuſſi. Je ne voudrois cependant pas décider que le ſuccès en fût impoſſible.

Ce que je viens de dire, ſervira déjà à faire comprendre qu'on peut avec ſuccès diviſer un Polype en plus de deux parties. J'en ai dans le même moment coupé transverſalement en trois & en quatre; & toutes ces parties ſont devenues des Polypes complets.

La premiére & la derniére partie des Polypes, partagés en trois ou en quatre transverſalement, ſont tout-à-fait ſemblables à la premiére & à la ſeconde d'un Polype qui a été coupé en deux. Le bout poſtérieur de la premiére doit ſe diſpoſer en forme de queuë, & il doit venir une tête au bout antérieur de la derniére. Mais, la reproduction, qui doit ſe faire dans les parties intermédiaires, c'eſt-à-dire, dans la ſeconde d'un Polype coupé en

trois, & dans la ſeconde & dans la troiſiéme d'un, qui a été coupé en quatre; la réproduction, dis-je, qui doit ſe faire dans ces portions de Polypes, eſt double: ce ſont des tronçons, qui n'ont ni queuë, ni tête; & ils doivent acquérir l'une & l'autre. C'eſt, en effet, ce qui arrive, & en plus ou moins de tems, ſuivant les circonſtances. Pour donner des idées plus préciſes de ces Expériences, je rapporterai l'extrait de quelques Articles de mon Journal, dans leſquels il s'agit de Polypes, partagés en trois & en quatre.

J'AI diviſé un Polype en trois transverſalement, le 18 Juillet 1741.

La premiére partie a bien réuſſi; elle avoit ſix bras, c'étoient les bras mêmes qu'avoit le Polype qui a été coupé.

La ſeconde partie a commencé à pouſſer un petit le 23; elle n'avoit point encore de bras. J'en ai apperçu le 25 au petit, & à cette ſeconde partie. Le jeune Polype s'eſt ſéparé le 28. La ſeconde partie avoit alors ſept bras.

Les bras ont commencé à pouſſer le 24 à la troiſiéme partie. J'en ai remarqué cinq le 25, & ſept le 28.

Ces trois portions du même Polype ont mangé des Pucerons le 29 Juillet. Elles étoient des Polypes complets.

J'AI diviſé un autre Polype en trois tranſverſalement, le 15 Juillet 1741.

La premiére partie avoit ſept bras.

Les bras ont commencé à pouſſer à la ſeconde le 25. Elle en avoit huit le 28.

Ils

Ils ont commencé à pouſſer à la troiſiéme le 22. J'en ai apperçu ſept le 25, & huit le 28.

Ces trois portions du même Polype ont mangé des Pucerons le 29 Juillet.

J'ai auſſi diviſé un Polype tranſverſalement en quatre, le 18 Juillet 1741.

La premiére partie a bien réuſſi. Elle avoit ſept bras.

Ceux de la ſeconde ont commencé à pouſſer le 25. J'en ai apperçu cinq ce jour-là, ſix le 28, & ſept le 29.

Les bras ont commencé à paroitre à la troiſiéme partie le 25. J'en ai remarqué cinq ce jour là, ſix le 28, & huit le 29.

Les bras de la quatriéme ont commencé à pouſſer le 23, deux jours plûtôt que ceux des deux précédentes. J'en ai vu trois le 25, qui étoient déjà aſſés longs. Elle en avoit ſix le 29.

Les Polypes ne ſont pas aſſés grands, pour pouvoir être coupés, en même tems, en un fort grand nombre de parties. J'ai ſuppléé à cela, en partageant ſucceſſivement un Polype en pluſieurs portions. Après en avoir coupé un en quatre, j'ai eu ſoin de bien nourrir chacune de ces quatre parties: & quand elles ont été parvenues à une certaine grandeur, je les ai encore coupées en deux ou en trois, ſuivant que leur taille l'a permis. Enſuite, j'ai auſſi fait croître toutes ces portions, & je les ai diviſées. De cette maniére, j'ai coupé le Polype, dont il s'agit, en cinquante parties. Je m'en ſuis tenu là, parce que j'ai cru, qu'il ſuffiſoit d'avoir pouſſé la diviſion juſqu'à ce point. Toutes ces cinquantiémes parties ſont devenues des Polypes parfaits. Je leur en ai vu faire toutes les fonc-

fonctions. J'en ai conſervé pluſieurs, pendant plus de deux années. Elles ont beaucoup multiplié. C'eſt ſur un Polype de la ſeconde eſpéce que j'ai fait cette Expérience.

J'AI nourri de ſuite, pendant plus de deux années, des Polypes qui n'ont jamais été coupés, & des Polypes, qui ſont venus des portions de ceux que j'ai diviſés. Je n'ai pas trouvé, toutes circonſtances d'ailleurs égales, que les uns multipliaſſent plus que les autres.

J'AI teſſaïé pluſieurs fois de couper tranſverſalement de jeunes Polypes lorſqu'ils étoient encore attachés à leur mere; & cette Expérience a très bien réuſſi. Je ne ferai mention que de quelques cas particuliers.

J'AI coupé tranſverſalement trois jeunes qui ſortoient d'un Polype de la ſeconde eſpéce: j'ai en même tems coupé la tête à la mere. En quelques jours, je ne ſaurois dire préciſément combien, il eſt venu une nouvelle tête à la mere, & aux ſecondes parties des trois jeunes, qui étoient encore attachés à ſon corps. Ces jeunes Polypes ſe ſont enſuite ſéparés de la mere, & ont formé des Polypes parfaits. Les quatre têtes coupées, c'eſt-à-dire, la premiére partie de la mere, & celles de ſes trois petits, qui ont été ſéparées du reſte de leur corps, ſont auſſi devenues des Animaux parfaits.

LE 26 Mai 1741, j'ai coupé la tête d'un Polype de la ſeconde eſpéce, & celles de deux petits qui ſortoient de ſon corps. Les bras ont commencé à paroitre le 30 à la ſeconde partie de la mere, & à celles des deux petits qui étoient encore attachés à ſon corps.

corps. Les trois têtes coupées ſont auſſi devenues des Polypes complets.

J'ai coupé, le 23 Juin 1741, la tête d'un Polype à longs bras, & celles de deux petits qu'il produiſoit. Les bras ont commencé à pouſſer le 25 à la ſeconde partie de la mere, & à celle de ces petits, qui étoient encore attachés à ſon corps. Les petits ſe ſont ſéparés la nuit du 26 au 27, & étoient déjà alors des Animaux parfaits. Les têtes, qui ont été coupées à la mere & aux petits, ſont auſſi devenues des Polypes complets.

Après avoir coupé transverſalement un grand nombre de Polypes, j'ai entrepris d'en couper *longitudinalement*, c'eſt-à-dire, de faire la coupe parallèle à la longueur de leur corps. C'eſt ce qui eſt un peu plus difficile, que de les couper transverſalement : mais, on peut cependant en venir facilement à bout, en prenant quelques précautions.

On a beaucoup moins de priſe ſur un Polype que l'on coupe longitudinalement, que ſur un que l'on coupe transverſalement lorſqu'il eſt étendu. Pour ſe procurer de la priſe ſur celui qu'on doit couper ſuivant ſa longueur, il s'agit de le faire élargir. Il faut pour cela le faire contracter le plus qu'il eſt poſſible, parce que plus le corps d'un Polype eſt contracté, plus il eſt large. Je mets le Polype, que je veux couper longitudinalement, avec un peu d'eau dans le creux de ma main gauche : mais, au lieu de le laiſſer dans cette eau, & de l'y faire ſimplement contracter, je le conduis avec la pointe d'un pinceau ſur le bord de l'eau. Il repoſe alors ſur ma main; & je tâ-

che de l'y faire contracter le plus qu'il eſt poſſible. Il eſt à remarquer, qu'un Polype s'élargit davantage en ſe contractant hors de l'eau, que dans l'eau : il s'applatit en partie hors de l'eau ſur le corps ſur lequel il repoſe. Ce n'eſt pas la ſeule raiſon pour laquelle il vaut mieux que le Polype, qu'on doit couper longitudinalement, ſoit hors de l'eau, plutôt que dedans. Lorſqu'il eſt dans l'eau, le moindre mouvement que l'on fait, ou en remuant la main dans laquelle il eſt, ou en paſſant les ciſeaux ſous ſon corps pour le couper, le fait changer de ſituation, ce qui eſt ſouvent cauſe, qu'on ne donne pas le coup de ciſeaux où l'on veut. Au contraire, quand un Polype eſt hors de l'eau, on peut paſſer facilement les ciſeaux ſous ſon corps, ſans le faire remuer. Il y a encore un expédient, qu'on peut joindre à ceux que je viens d'indiquer, pour rendre plus larges les Polypes qu'on veut couper ſuivant leur longueur : c'eſt de leur donner bien à manger, avant que de faire cette opération. Les alimens, comme on l'a vu dans le ſecond Mémoire, obligent le corps d'un Polype à s'élargir extrêmement. On peut le mettre ſur la main lorſqu'il a l'eſtomac plein, & le couper avec les alimens qu'il a dans le corps. Ce n'eſt pas le tout que de faire enſorte que le Polype ſoit bien contracté & élargi ſur la main, il faut encore avoir grand ſoin de le placer de maniére, qu'il ſoit diſpoſé en droite ligne, & que ſes deux extrémités ſe puiſſent facilement diſtinguer.

Tout cela étant fait, je prens dans la main droite des ciſeaux fort fins ; j'en fais paſſer ſous le Polype

pe un côté, en commençant par la pointe; & je fais enſorte que ce côté des ciſeaux ſoit diſpoſé ſous le Polype parallélement à la longueur de ſon corps. On peut commencer à faire paſſer le côté des ciſeaux ſous le corps du Polype, par laquelle des deux extrémités de ce corps qu'on veut: mais, comme l'antérieure eſt ordinairement plus large, il eſt plus commode de commencer par celle-ci, d'autant plus qu'on peut alors avec plus de facilité partager la tête également. Quand le côté des ciſeaux, que j'ai fait paſſer ſous le Polype, eſt diſpoſé parallélement à ſa longueur, & que je vois que ſa pointe va tant ſoit peu au-delà du bout du Polype, oppoſé à celui par lequel ce côté a commencé à paſſer ſous ſon corps, je ferme les ciſeaux, & le Polype ſe trouve ordinairement coupé aſſez également en deux ſuivant ſa longueur.

Un Polype entier forme, ainſi que cela a été dit dans le premier Mémoire *, une ſorte de tuïau, qui va d'un bout de ſon corps à l'autre. Une moitié d'un Polype, coupé en deux ſuivant ſa longueur *, forme donc un demi tuïau, dont l'extrémité antérieure * eſt terminée par la moitié de la tête, c'eſt-à-dire, par la moitié de la bouche, & par la moitié des bras, ou à peu près.

* Pag. 50.

* PL. XI. Fig. 7.

* *a c.*

Après avoir coupé le Polype, je panche tant ſoit peu la main, pour faire enſorte que l'eau qui eſt dans le creux, le vienne mouiller; & puis, avec la pointe humectée d'un pinceau, j'écarte les portions de Polype l'une de l'autre, & je les étends ſur ma main humectée, afin de pouvoir les examiner à la loupe commodément. Chacune paroit alors être une

petite bande de peau de Polype, terminée à un bout par quelques bras contractés. Je prens la précaution de mouiller ma main, le pinceau, & les moitiés de Polype qui viennent d'être ſéparées, afin de ne pas riſquer de déchirer ces moitiés: ce qui pourroit facilement arriver ſans cette précaution. Après avoir examiné les portions de Polype, je les conduis avec le pinceau dans l'eau qui eſt dans le creux de ma main, d'où je les enléve l'une après l'autre, pour les mettre dans un verre plat, afin de continuer à les obſerver.

Il arrive, la plupart du tems, que les moitiés d'un Polype, coupé en deux longitudinalement, ſe contournent d'abord, & ſe roulent de différentes maniéres. Elles commencent ordinairement à ſe rouler par une de leurs extrémités, & forment alors un rouleau fort étroit*. J'ai remarqué, que la ſuperficie extérieure de la peau du Polype eſt toûjours en dedans du rouleau. Il ſe déroule enſuite, & la moitié de Polype, après avoir plus ou moins attendu, ſe forme en tuïau; les bords des deux côtés * ſe rapprochent, & ſe réuniſſent. Il arrive quelquefois, que la réunion des bords commence par le bout poſtérieur, & d'autres fois ils ſe rapprochent à peu près par-tout à la fois. Lorſqu'ils ſe réuniſſent peu-à-peu, en commençant par un bout, on peut diſtinguer ordinairement la portion du Polype qui eſt déjà fermée *, de celle qui ne l'eſt pas encore *. Il arrive ſouvent, que la portion de Polype eſt ſi contournée, quand les bords commencent à ſe réunir, qu'on ne peut voir comment ils ſe rapprochent.

* Pl. XI. * Fig. 8.

* Fig. 7. *a i, c b.*

* Fig. 9. *c i b.* * *c a c.*

Ces bords, en ſe réuniſſant, ſe joignent ſi bien, qu'on

qu'on ne voit, dès le premier moment, aucune cicatrice à l'endroit où ils ſe ſont réunis; la peau du Polype eſt auſſi unie là qu'ailleurs. C'eſt ce qui fait, qu'auſſitôt que la réunion des bords eſt achevée, le corps des moitiés de Polypes reſſemble à celui d'un Polype parfait *: mais, les têtes ſont moins garnies de bras: elles n'en ont que trois ou quatre, ſuivant le nombre qu'en avoit le Polype qui a été partagé, & ſuivant que la diviſion a été faite. * PL. XI. Fig. 10. *a*.

Il ne faut communément qu'une heure, & même moins, pour que la moitié d'un Polype, coupé ſuivant ſa longueur, prenne la forme d'un Polype parfait.

Quoique les portions de Polypes, coupés longitudinalement en deux, n'aient que quelques bras, ils leur ſuffiſent pour arrêter une proie. Je fus d'abord ſurpris d'en voir quelques-unes, qui, 24 heures après la ſection, ſaiſirent & avalérent un Ver auſſi long qu'elles. Mais aiant, dans la ſuite, eſſaïé de donner à manger encore plûtôt à des moitiés de Polypes, coupés ſuivant leur longueur, j'en ai vu, qui ont mangé trois heures après la ſection. J'ai quelque lieu de ſoupçonner que les portions d'un Polype, qui n'a pas pris d'alimens depuis un certain tems, lorſqu'on le coupe, mangent plûtôt après l'opération, que celles d'un Polype bien nourri.

Je viens de dire, que les Polypes, qui ſont venus de portions de Polypes, coupés longitudinalement, n'ont d'abord que quelques bras: mais, en peu de jours, on en voit paroitre d'autres, qui pouſſent aux endroits où il en manquoit *; enſorte que, lorſque ces * Fig. 10.

derniers ſont devenus auſſi longs que les autres, il n'y a abſolument aucune difference entre ces Polypes, & ceux qui n'ont pas été coupés.

J'AI diviſé des Polypes en quatre, ſuivant leur longueur, dans le même moment. Voici comment je m'y ſuis pris. Après avoir coupé un Polype en deux, & en avoir étendu les deux moitiés ſur ma main, j'ai coupé ces deux moitiés, comme j'ai dit que je coupois le Polype entier. Ces quatriémes parties de Polypes, coupés longitudinalement, ſont devenues, en peu de tems, chacune un Polype complet.

L'EXTRAIT ſuivant de mon Journal contient un exemple de l'Expérience dont il s'agit. Le 16 Août 1741, j'ai diviſé en quatre, ſuivant ſa longueur, un Polype de la ſeconde eſpéce. Il avoit alors huit bras. J'ai appellé ces quatre parties, N°. 1, 2, 3, & 4.

N°. 1. avoit trois bras, d'abord après la ſection. Il en parut un nouveau le 18, un autre le 20, un le 23, & encore un dans la ſuite.

N°. 2. avoit deux bras. Le 18 il en parut trois nouveaux, le 22 un, & encore un dans la ſuite.

N°. 3. avoit deux bras. Le 18 il en parut trois nouveaux, le 20 un, & encore un dans la ſuite.

N°. 4. avoit un bras. Le 18 il en parut trois nouveaux, le 20 un, le 22 un, & encore un dans la ſuite.

Ces quatre portions du même Polype avoient chacune ſix bras, ſix jours après la ſection, & ſept le 14 Septembre. Elles ont toutes mangé, & multiplié. Je les ai enſuite coupées transverſalement; & l'Expérience a parfaitement réuſſi.

QUAND

QUAND on coupe longitudinalement des Polypes qui pouſſent des petits, ces petits continuent à croître après la ſection.

J'AI fait ſur le même Polype, & en même tems, les deux Expériences dont il a été queſtion juſqu'à préſent, c'eſt-à-dire, que je l'ai coupé dans le même tems transverſalement & ſuivant ſa longueur; je l'ai en quelque maniére écartelé. Les quatre parties de ce Polype ſont devenues des Polypes complets. Il s'eſt fait pour cela, dans chacune d'elles, ce que j'ai dit qui ſe faiſoit dans les portions d'un Polype coupé en long, & dans celles d'un Polype dont on a fait la coupe transverſale. Les deux premiéres parties du Polype écartelé, celles, dont le bout antérieur étoit garni de quelques bras, ſe ſont premiérement diſpoſées en tuïau, en rapprochant & en réuniſſant leurs bords; &, en ſecond lieu, leur bout poſtérieur a pris la forme de celui d'un Polype qui n'a jamais été coupé. Les deux ſecondes parties, après avoir rapproché leurs bords, & s'être diſpoſées en tuïau, ſe ſont trouvées dans l'état de la ſeconde moitié d'un Polype qui a été coupé transverſalement depuis peu; & il s'eſt fait enſuite en elles, tout ce qui ſe fait dans une pareille moitié.

LORSQUE les quatre Polypes, qui ſont venus de celui qui avoit été écartélé, ont pu manger, je les ai nourris. J'en ai enſuite écartélé un: j'en ai fait quatre Polypes; &, au bout de quelque tems, j'ai encore fait la même opération ſur un des ces quatre Polypes. J'ai nourri, & vu multiplier, pendant deux ans, ces quatre derniers Polypes.

J'AI

J'ai coupé en partie un Polype ſuivant ſa longueur, en commençant par la tête; & il s'eſt trouvé enſuite avoir deux corps, deux têtes, & une queuë. Les portions du Polype qui ont été ſéparées, au lieu de ſe rapprocher, & de former un Polype ſimple, formérent, chacune à part, une tête & un corps, comme j'ai dit que le faiſoient les moitiés d'un Polype, coupé longitudinalement d'un bout à l'autre. Après avoir nourri ce Polype à deux têtes, en lui faiſant prendre des alimens par ſes deux bouches, j'ai auſſi fendu en partie, en commençant par la tête, chacune des deux branches qu'il avoit. En peu de tems il a eu quatre têtes. Enfin, je ſuis parvenu à faire enſorte qu'il eût ſept têtes *. Un autre, ſur lequel j'ai fait la même Expérience, en a eu huit. J'ai vu ces Hydres prendre en même tems des alimens par toutes leurs bouches.

* PL. XI. Fig. 11.

On penſe bien, qu'après être parvenu à faire des Hydres, je ne m'en ſuis pas tenu là. J'ai coupé les têtes de celui qui en avoit ſept; &, au bout de quelques jours, j'ai vu en lui un prodige qui ne le céde guères au prodige fabuleux de l'Hydre de Lerne. Il lui eſt venu ſept nouvelles têtes; & ſi j'avois continué à les couper à meſure qu'elles pouſſoient, il n'y a pas à douter que je n'en euſſe vu pouſſer d'autres. Mais, voici plus que la Fable n'a ôſé inventer. Les ſept têtes, que j'ai coupées à cette Hydre, ayant été nourries, ſont devenues des Animaux parfaits, de chacun deſquels il ne tenoit qu'à moi de faire une Hydre.

Si l'on commence par le bout poſtérieur à couper un Polype longitudinalement, & ſi l'on ne le coupe que

que juſques près de la tête, il ſe trouve, peu après, avoir une tête & deux queuës. On peut augmenter le nombre de ces queuës, en les recoupant, après les avoir fait croître, comme j'ai dit que je l'avois fait à l'égard des Hydres à pluſieurs têtes.

J'AI vu marcher des Hydres à pluſieurs têtes, & des Hydres à pluſieurs queuës.

J'AI fait des Hydres d'une maniére, un peu différente de celle que je viens de décrire. Au lieu de fendre le Polype en long juſques près d'une des extrémités, je l'ouvre d'un bout à l'autre, & je l'étends ſur ma main ainſi ouvert. On a vu dans le premier Mémoire *, comment je m'y prens pour faire cette opération: & la Figure 7. de la Pl. IV. de ce Mémoire repréſente groſſi au microſcope, un Polype ouvert, & dont la peau eſt étendue. Je donne des coups de ciſeaux à la peau de tous côtés, & en tout ſens: j'ai ſeulement ſoin de ne pas ſéparer entiérement les portions de cette peau, de faire enſorte qu'elles tiennent encore enſemble par quelque endroit. On s'imagine bien dans quel état eſt, après cela, le Polype. J'en ai ſouvent vus, que j'avois coupés de cette maniére, qui ont eu enſuite trois ou quatre têtes. Ils ont eu auſſi quelquefois des queuës. Ces petits morceaux de peau, qui ne tiennent plus enſemble que par un côté, deviennent chacun ordinairement, ou une tête, ou une queuë. Il ſe peut auſſi qu'il y en ait qui ſe rejoignent. C'eſt ce que je n'ai pas obſervé.

* Pag. 54.

IL arrive, la plupart du tems, que les têtes & les queuës des Polypes extraordinaires, dont je viens de parler, ſe ſéparent d'elles-mêmes, & deviennent des

Polypes parfaits. J'ai nourri pendant ſix ſemaines une Hydre à ſept têtes, avant qu'aucune de ſes têtes ſe ſoit ſéparée.

LORSQU'ON nourrit bien les Polypes à pluſieurs têtes, & ceux à pluſieurs queuës, ils multiplient comme les Polypes ordinaires.

LA derniére Expérience que je viens de rapporter, celle du Polype ouvert d'un bout à l'autre, auquel j'ai donné pluſieurs coups de ciſeaux, a déjà pu faire comprendre, que, de quelque maniére, & en quelque ſens, que l'on coupe un Polype, on ne le tue point, & qu'au contraire on en fait pluſieurs d'un ſeul. Afin de m'aſſurer davantage de ce Fait, j'ai pouſſé plus loin l'opération dont je viens de parler. J'ai ouvert ſur ma main un Polype, je l'ai étendu, & j'ai coupé en tout ſens la peau ſimple qu'il formoit, je l'ai réduit en petits morceaux, je l'ai en quelque maniére hâché. Ces petits morceaux de peau, tant ceux qui avoient des bras, que ceux qui n'en avoient point, ſont devenus des Polypes parfaits. Il arrive quelquefois, cependant, qu'on en voit mourir quelques-uns. Cela vient, peut-être, de ce qu'ils ſont trop petits: peut-être, auſſi cela vient-il d'accidens qui auroient fait périr un Polype entier.

ON doit obſerver avec ſoin les morceaux de peau dont je parle. Il faut les conſiderer ſouvent; &, quand ils commencent à être en état de manger, il faut leur donner des portions de Vers extrêmement petites. Mais, c'eſt ſur-tout en les changeant d'eau, qu'il faut prendre des précautions; ſans quoi, on riſqueroit de les perdre.

J'AI

J'ai repeté pluſieurs fois avec ſuccès cette Expérience.

Tout Polype, qui vient de la portion d'un Polype coupé en deux, ou en pluſieurs parties, de quelque maniére que ce ſoit, a toûjours, comme ceux qui n'ont jamais été partagés, un canal qui régne du bout antérieur, juſqu'au bout poſtérieur; c'eſt-à-dire, qu'il a toûjours un eſtomac. J'ai été pendant long-tems embarraſſé de ſavoir comment cet eſtomac ſe forme dans les Polypes qui viennent d'un fort petit morceau de peau ſimple, étroit & court, & même, dans ceux qui viennent d'un Polype coupé longitudinalement en quatre, ou en cinq parties, c'eſt-à-dire, dans des Polypes, qui, d'abord après la ſection, ne ſont que des morceaux de peau ſimple, minces & longs à proportion de leur épaiſſeur. On voit facilement, que les morceaux d'un Polype, dont on a fait la coupe transverſale, quelque petits qu'ils ſoient, forment toûjours une ſorte de tuïau, fort court à la vérité, mais qui s'allonge à meſure que ces morceaux de Polype s'étendent. Les portions d'un Polype, coupé en deux ſuivant ſa longueur, ſont encore aſſez larges pour que les bords des deux côtés oppoſés puiſſent ſe rapprocher, & pour que chacun de ces deux morceaux, qui d'abord n'étoit, ſi je puis parler ainſi, qu'un demi tuïau, deviennent enſuite un tuïau entier. C'eſt ce que j'ai vu très ſouvent, comme je l'ai dit ci-deſſus. Mais, en eſt-il de même, par exemple, des portions d'un Polype, coupé longitudinalement en un plus grand nombre de parties, qui ſont fort étroites? J'ai été pen-

pendant long-tems dans le doute là-deſſus. Une portion de Polype, qui avoit été coupé en long, m'avoit paru être devenue un Polype complet, ſans que ſes bords ſe fuſſent rapprochés & réunis. J'avois eu lieu de croire, que ce morceau de peau s'étoit ſimplement renflé, & avoit pris par ce moïen la forme d'un Polype. Mais, je n'avois vu cela qu'une fois, & pas aſſez diſtinctement, pour pouvoir fonder une déciſion là-deſſus. J'ai donc travaillé à repeter la même Expérience.

J'Ai d'abord commencé par obſerver des morceaux fort étroits, de Polypes coupés ſuivant leur longueur. J'ai mis ces portions de Polypes dans des verres peu profonds, où je pouvois les obſerver avec une forte loupe. Il importe beaucoup de les examiner ſouvent, ſur-tout dans les deux premiéres heures après qu'elles ont été coupées, afin de bien remarquer les différentes formes qu'elles prennent, & de pouvoir s'aſſurer, que les bords des deux côtés oppoſés ne ſe ſont pas rapprochés & réunis. Je vais donc décrire ce que j'ai vu pluſieurs fois de ſuite; car, j'ai repeté ſouvent la même Expérience pour plus de ſureté.

Une portion fort étroite d'un Polype, coupé longitudinalement, commence ordinairement par ſe rouler de la même maniére que j'ai dit que ſe rouloient celles qui ſont plus larges. Elle forme un rouleau très mince, & commence toûjours à ſe rouler par l'un de ſes deux bouts; & celui, par lequel elle commence, ſe trouve au milieu du rouleau, qui, comme on le peut juger, n'a pas beaucoup de tours: ſou-

ſouvent même il n'en a qu'un ; la portion de Polype forme un cercle, ſes deux bouts ſe touchent. Elle ſe déroule enſuite. J'en ai vu, qui ſe rouloient & ſe dérouloient alternativement deux ou trois fois dans les premiéres heures après l'opération. Il y en a auſſi, qui s'étendent d'abord, & qui reſtent étendues. En obſervant ſouvent un pareil morceau de Polype, & en n'oubliant jamais, après avoir ceſſé de l'obſerver, la ſituation dans laquelle on l'a laiſſé, il eſt facile de s'aſſurer, qu'il ne s'eſt point formé en goutiére d'un bout à l'autre, & que ſes côtés ne ſe ſont pas rapprochés & réunis, en un mot qu'il n'a point pris la forme d'un tuïau. J'en ai vu, qui, je ſuis ſûr, ne l'ont jamais priſe. Ces portions de Polypes ſe ſont peu à peu renflées. Elles étoient d'abord étroites & plattes, & enſuite en ſe renflant, elles ſont devenues à peu près cylindriques. Lorſqu'on en obſerve, avec une loupe, au grand jour, ou à la lumiére d'une bougie, quand elles ſont dans ce dernier état, on peut s'appercevoir, qu'elles ont déjà, dans leur intérieur, un vuide, qui régne d'un bout à l'autre : mais, on a dans la ſuite occaſion de s'en aſſurer davantage. Il ſe forme une tête à une des extrémités de ces portions de Polypes, & elles ſont en peu de jours en état de manger de petits morceaux de Vers. On les voit entrer dans leur corps, & on remarque facilement, que ces morceaux de Vers occupent la capacité du vuide qui s'eſt formé dans l'intérieur des portions de Polypes. Enfin, elles deviennent des Animaux parfaits.

La maniére, dont ſe forme l'eſtomac de ces portions

tions de Polypes, n'eſt pas le ſeul Fait remarquable qu'elles nous préſentent. La ſuperficie extérieure de leur peau eſt auſſi très digne d'attention. Il eſt aiſé de comprendre, qu'un côté de la ſuperficie d'un morceau de peau de Polype, eſt une partie de la ſuperficie intérieure de la peau du Polype, des parois de ſon eſtomac. Lors donc que le morceau de peau ne ſe forme point en tuïau, mais qu'il ſe renfle ſimplement pour devenir un Polype, ce côté de la ſuperficie, qui étoit, avant la ſection, une partie de la ſuperficie intérieure de la peau du Polype entier, devient une partie de la ſuperficie extérieure de la peau du nouveau Polype.

Je rapporterai l'extrait d'un ſeul article de mon Journal, touchant ces morceaux de Polypes dont je viens de parler.

J'ai coupé le 1 Novembre 1743, un Polype ſuivant ſa longueur en pluſieurs parties, entre une & deux heures de l'après-midi. Voici les Obſervations que j'ai faites ſur une d'elles.

Ce morceau de peau étoit aſſez long, & fort étroit. Il s'eſt un peu roulé. J'ai vu diſtinctement, en l'obſervant de ſuite, que les bords ne ſe ſont pas rejoints. Il avoit déjà pris, à quatre heures & demie, une forme cylindrique, c'eſt-à-dire, qu'il s'étoit déjà ſenſiblement renflé. Il n'avoit point de bras. Le 3 Novembre il a paru, à quelque diſtance de ſon extrémité la plus pointue, une excreſcence qui reſſembloit à un bouton de jeune Polype. J'ai remarqué le 4, que c'en étoit un en effet. Il ſortoit même des bras du bout antérieur de ce jeune, auſſi-bien que de celui de

la

Digitized by Google

la mere, c'eſt-à-dire de la portion de Polype. Celle-ci a enſuite mangé & multiplié.

J'AI auſſi obſervé de ſuite de fort petits morceaux de peau courts & étroits, & tels même, qu'il étoit en quelque maniére impoſſible qu'ils ſe repliaſſent pour prendre la forme d'un tuïau. Ils s'enflent, ils deviennent ronds, ou à peu près, & forment un grain vuide en dedans, qui pouſſe enſuite des bras à un endroit de ſa ſuperficie, au milieu desquels eſt la bouche, ils marchent enſuite, ils s'allongent, & ſont enfin des Polypes parfaits.

J'EN viens à préſent à une Expérience, qui ne le céde pas en ſingularité, à celles dont il a été queſtion juſqu'à préſent. Cette Expérience conſiſte à *retourner* des Polypes.

ON doit ſe rappeller encore ici, que tout le corps d'un Polype ne forme qu'un tuïau, qu'une ſorte de boïau ou de ſac, qui va d'une de ſes extrémités à l'autre. Il s'agit donc de retourner ce boïau que forme le corps d'un Polype, comme on retourne un ſac, un bas, un gant, ou le doigt d'un gant; de faire enſorte, que la ſuperficie intérieure de ſa peau devienne la ſuperficie extérieure, & que l'extérieure devienne l'intérieure.

SI j'avois ſçu qu'un morceau de peau de Polype pouvoit devenir un Polype complet, ſeulement en s'enflant de maniére qu'il ſe forme dans le milieu de cette peau ſimple un vuide qui devient l'eſtomac du Polype; ſi, dis-je, j'avois ſçu cela, j'aurois eu plus d'eſperance de voir vivre un Polype retourné: j'aurois déjà

déjà eu une preuve, que la ſuperficie intérieure de la peau d'un Polype peut devenir, au moins en partie, ſuperficie extérieure, ainſi qu'on l'a vu dans les Expériences précédentes. Mais, lorſque j'entrepris de retourner des Polypes, je n'avois pas encore fait ces Expériences.

J'AI penſé à retourner des Polypes, après avoir remarqué un Fait, qui ſe trouve détaillé dans le ſecond Mémoire *: ſavoir, que les grains, ou veſſicules, dont toute la peau de ces Animaux eſt garnie, ſe rempliſſent de ſuc nourricier. Il me vint dans l'eſprit, que, ſi les veſſicules, qui étoient à la ſuperficie extérieure de la peau, ſe trouvoient les plus près de ce ſuc nourricier, elles s'en rempliroient les premiéres, & que le Polype ſe nourriroit, peut-être, auſſi bien que lorſque le ſuc nourricier paſſe d'abord dans les veſſicules qui tapiſſent les parois de l'eſtomac.

* Pag. 131 & ſuiv.

LA premiére idée, qui me vint, fut de mettre un Polype dans une liqueur, qui pût être regardée, par rapport à lui, comme un ſuc nourricier, afin de voir s'il ne tireroit point alors ſa nourriture par toutes les parties extérieures de ſon corps, comme Mr. le Comte de Marſigli dit, dans ſon *Hiſtoire de la Mer*, que font pluſieurs Plantes marines. Il rapporte qu'elles ſont toutes pleines de glandules ou veſſicules, & quelles tirent extérieurement, de l'eau de la mer qui les touche, le ſuc qui ſert à les nourrir. Il eſt vrai, que les Découvertes, faites depuis peu ſur ces prétendues Plantes marines, changent beaucoup ce ſyſtême: mais, elles n'étoient pas encore faites au mois de Juil-

let

let 1741. lorſque je penſai à faire ſur les Polypes l'Expérience dont je parle.

N'AIANT pu parvenir à trouver un ſuc dans lequel je puſſe mettre les Polypes, & qui pût ſervir à les nourrir, je penſai à les retourner, afin de faire enſorte que la ſuperficie extérieure de leur peau formât les parois de leur eſtomac. Je me flattai très peu de voir réuſſir cette Expérience: mais, je crus cependant qu'il ne convenoit pas de négliger de l'entreprendre.

J'ESSAIAI pour la premiére fois de retourner des Polypes dans le mois de Juillet 1741; mais, ce fut inutilement que j'emploiai, pour y parvenir, tous les moïens auxquels je penſai alors. Je fus plus heureux l'année ſuivante, aiant trouvé enfin un expédient qui eſt aſſés facile.

TANT que j'ai voulu retourner des Polypes dont l'eſtomac étoit vuide, je n'ai jamais pu en venir à bout; & j'ai au contraire d'abord réuſſi, dès que je leur ai bien donné à manger avant que de leur faire cette opération; c'eſt-à-dire, dès que j'ai fait enſorte que leur corps ſe ſoit fort élargi. Il importe, en effet, pour qu'elle ait un heureux ſuccès, que l'eſtomac & la bouche du Polype ſoient fort élargis. J'emploiai d'abord pour cela de ces Vers rouges de Tipules, dont j'ai parlé dans le ſecond Mémoire *. Je me ſuis auſſi ſervi avec ſuccès des mêmes Vers dont j'ai nourri ordinairement les Polypes en Hyver *.

* Pag. 101.

* PL. VII. Fig. 2.

CE ſont les Polypes de la ſeconde eſpéce que j'ai retournés les premiers.

JE commence donc par donner un Ver au Polype

ſur lequel je veux faire cette Expérience; & quand ce Ver eſt avalé, je puis la commencer. Il ne convient pas d'attendre qu'il ſoit beaucoup digéré. Je mets le Polype, dont l'eſtomac eſt bien rempli, dans un peu d'eau dans le creux de ma main gauche: je le preſſe enſuite avec un petit pinceau, plus près de l'extrémité poſtérieure que de l'antérieure: je pouſſe, de cette maniére, contre la bouche du Polype, le Ver qui eſt dans l'eſtomac; il la force à s'ouvrir, & en preſſant encore un peu le Polype avec mon pinceau, je fais ſortir le Ver * en partie par ſa bouche *, & je vuide d'autant le bout poſtérieur de ſon eſtomac. Ce Ver, qui ſort de la bouche du Polype, la force à s'élargir conſidérablement, ſur-tout s'il ſort en double, comme on le voit dans la Figure que je viens d'indiquer. Lorſque le Polype eſt dans cet état, je le conduis doucement, ſans rien déranger, hors de l'eau, & je le place ſur le bord de ma main, qui eſt ſimplement mouillé, pour que le Polype ne s'y colle pas trop: je le force à ſe contracter de plus en plus, & je contribue par cela même à faire élargir l'eſtomac & la bouche. On doit ſe rappeller ici, que le Ver ſort en partie de cette bouche, & la tient ouverte *. Je prens enſuite de la main droite une ſoie de ſanglier, ou de porc, aſſez épaiſſe & ſans pointe, & je la tiens, comme on tient une lancette pour ſaigner. J'approche ſon plus gros bout * de l'extrémité poſtérieure du Polype; je pouſſe cette extrémité, & je la fais rentrer dans l'eſtomac du Polype, d'autant plus facilement, qu'il eſt vuide dans cet endroit-là, & fort élargi. Je continue enſuite à faire avancer le bout de ſoie

* PL. XI. Fig. 12. c c. * a.

* Fig. 12.

* b.

ſoie de ſanglier, qui, à meſure qu'il avance, retourne de plus en plus le Polype. Quand il parvient au Ver qui tient la bouche ouverte, il pouſſe ce Ver, ou paſſe à côté, & ſort enfin par cette bouche, couvert de la partie poſtérieure du Polype, qui eſt retournée *. Il eſt facile de ne pas manquer la bouche, parce qu'elle eſt fort ouverte. Il arrive quelquefois, que le Polype ſe trouve d'abord entiérement retourné. On conçoit qu'il couvre alors le bout de ſoie de ſanglier *, qui eſt logé dans le Polype retourné †; que la ſuperficie extérieure du Polype eſt devenue intérieure; que cette ſuperficie touche celle de la ſoie de ſanglier, & que l'intérieure eſt devenue extérieure.

* PL. XI. Fig. 14. *a b.*

* Fig. 13. *b.* † *a b.*

Lorsqu'un Polype eſt hors de l'eau, il eſt difficile de diſtinguer ſes différentes parties; tout eſt confus: ainſi, le Polype retourné, qui eſt hors de l'eau, & au bout de la ſoie de porc, ne peut ſe diſtinguer d'un Polype, non retourné. Pour m'aſſurer davantage du ſuccès de mon opération, je prens de la main gauche la ſoie de ſanglier que je tenois avec la main droite, par le bout oppoſé à celui où eſt le Polype; & de la droite je tiens une loupe. Je mets enſuite le Polype dans l'eau d'un petit verre, préparé d'avance. Tout redevient diſtinct. Je juge facilement, en examinant la peau du Polype, s'il eſt retourné, c'eſt-à-dire, ſi c'eſt bien la ſuperficie intérieure de cette peau qui eſt en dehors. Mais, j'en ai ordinairement encore une autre preuve.

Il eſt rare, que le Polype ſoit entiérement retourné, par le mouvement qui ſert à faire ſortir par la bouche la partie poſtérieure retournée: ainſi, quand

on le met dans l'eau, lorſqu'il eſt au bout de la ſoie de ſanglier, on trouve, la plupart du tems, que cette partie poſtérieure retournée * ſort de la bouche †; mais, on voit une partie du Polype qui n'eſt pas retournée, ſavoir, ſon bout antérieur *, celui qui eſt terminé par les bras: il eſt replié ſur le bout retourné. Pour achever de retourner le Polype, je prens de la main droite un pinceau, pendant que je tiens toûjours dans l'eau le bout de la ſoie de ſanglier qui eſt couvert par ce Polype. Je paſſe délicatement le bout du pinceau ſur la partie non retournée *, dans le ſens néceſſaire pour la faire retourner, ſavoir de *a* en *c*. C'eſt ce qui eſt exécuté dans un inſtant. Je puis en juger à l'œil en opérant; &, dès que j'ai fini, je reprens une loupe, & j'examine de nouveau le Polype. Quand il ſe trouve bien retourné *, il ne s'agit plus que de l'ôter du bout de la ſoie de ſanglier *. Je le tiens, pour cet effet, dans l'eau, je le pouſſe doucement de *a* en *b* avec un pinceau; & il tombe au fond du verre, ſans ſe déranger.

* PL. XI. Fig. 14. * *b.* † *a.*

* *a c.*

* Fig. 14. *a c.*

* Fig. 13. *a b.*

* *d b.*

J'AI fait tout ce que je viens de décrire, en préſence de differentes perſonnes accoutumées à obſerver, & qui ont toujours eu l'œil, aidé d'une loupe, & fixé ſur le Polype, pendant que je le retournois.

D'ABORD après qu'il eſt retourné, ſa bouche ſe ferme, & ſes lévres rentrent même un peu en dedans *. Les bras paroiſſent alors réunis en un faiſceau *, plus ou moins ſerré, qui ſort du milieu du bout antérieur * du Polype: mais, enſuite les lévres ſe renverſent au contraire en dehors, comme ſi le Polype vouloit ſe *déretourner*, (qu'on me permet-

* Fig. 15. *a.*

* *a c.*

* *a.*

te

te cette nouvelle expreſſion) c'eſt-à-dire, ſe remettre, comme il étoit avant que d'être retourné.

C'EST, en effet, ce qu'il tente, & à quoi il réuſſit ſouvent. J'ai vu des Polypes qui ſe ſont déretournés en moins d'une heure. D'autres, n'y ſont parvenus qu'environ 24 heures après avoir ſouffert cette opération.

LES Polypes, qui ſe déretournent, ſe portent enſuite fort bien: ils mangent, croiſſent, multiplient, en un mot, on ne ſauroit les diſtinguer des autres.

IL eſt déjà bien ſingulier, qu'un Animal puiſſe avoir été retourné & déretourné, ſans en mourir, & même ſans en paroitre incommodé. Mais, cela ne me ſuffiſoit pas. Mon but principal, en retournant des Polypes, étoit de les conſerver retournés, & de voir s'ils pourroient vivre dans cet état. J'ai donc travaillé à faire enſorte qu'ils reſtaſſent retournés. Il m'a ſuffi, à l'égard de quelques-uns, d'abaiſſer leurs lévres avec la pointe d'un pinceau, à meſure qu'elles ſe renverſoient ſur le corps. Mais, il eſt trop rare de réuſſir à ſouhait par ce moïen, pour s'en tenir là, quand on ſe propoſe de réïtérer ſouvent l'Expérience. J'ai eu recours à un expédient plus ſûr. C'a été d'*embrocher* les Polypes retournés, avec une ſoie de porc ou de ſanglier, près du bout antérieur. Voici comment je m'y prens.

APRÈS avoir achevé de retourner un Polype, je le remets dans le creux de ma main gauche, qui eſt en partie plein d'eau; j'examine encore ce Polype à la loupe; puis je le conduis avec un pinceau, & je le range ſur ma main au bord de l'eau, je l'étends du

mieux qu'il m'eſt poſſible, & j'étudie bien ſa ſituation. Enſuite je prens de la main droite une ſoie de ſanglier aſſez fine, qui eſt noüée d'un côté: je la tiens
* PL. XI. Fig. 16. d. près de ſa pointe *, & je la plante dans le corps du Polype retourné, aſſez près de ſes lévres: elle les perce, & pouſſe la peau de ma main qui eſt en deſſous. Alors je panche la main de ſorte que l'eau, qui eſt dans le creux, vient baigner le Polype; il en eſt ſoulevé, & cela même fait qu'il s'embroche mieux. Dans ce moment-là, je laiſſe tomber doucement ſur ma
* c. main l'autre bout * de la ſoie de ſanglier, je reprens le pinceau, je pouſſe avec ſon bout le Polype vers le
* a. milieu de la ſoie de ſanglier *, & quand il y eſt, j'enléve cette ſoie avec le Polype, & je la mets dans un
* f e g b. verre, * aiant ſoin de faire enſorte, qu'elle ne le tou-
* e & d. che que par ſes extrémités *, afin que le Polype, étant éloigné du fond & des côtés, ne puiſſe pas s'y appuier, & faire de grands efforts pour ſe déſembro-
* n. cher de maniére ou d'autre. Je mets le nœud *, qui eſt à la ſoie de ſanglier, vers le bas, afin que, ſi le Polype gliſſe, s'il tombe par ſon propre poids, il ſoit arrêté par ce nœud, & ne ſe déſembroche pas.

Ce n'eſt rien pour un Polype, que d'être embroché. Je l'ai éprouvé de differentes maniéres, ſur des Polypes non retournés, ſans que cela les empéchât de manger, & de multiplier. Les Polypes retournés ne paroiſſent pas non plus en ſouffrir.

Il eſt facile de comprendre comment la ſoie de ſanglier, qui traverſe leur corps près de la bouche, les empéche de ſe déretourner.

J'ai retourné un nombre conſiderable de Polypes de

de la ſeconde eſpéce, qui ſont reſtés retournés, & qui ont long-tems vécu. Ils ont mangé, crû, & multiplié.

Il arrive ſouvent, que les Polypes, qu'on retourne & qu'on embroche pour les empécher de ſe déretourner, ſe déchirent un peu les lévres, & que par-là, il ſe forme deux têtes. D'abord ces têtes n'ont point de col, mais, il leur en vient un lorſque le Polype retourné croît; &, alors, il reſſemble à un Polype qu'on auroit coupé en partie ſuivant ſa longueur, en commençant par la tête.

J'ai eu pluſieurs Polypes retournés, qui n'ont eu qu'une tête après l'opération, & dont la bouche étoit préciſément la même bouche qu'ils avoient, avant que d'être retournés.

J'ai nourri pluſieurs petits, produits par des Polypes retournés; & je les ai vu multiplier.

Les premiers Polypes, que j'ai retournés, n'avoient point de petits attachés à leur corps: mais, dans la ſuite, j'en ai retourné pluſieurs qui en avoient. Ces petits ſe trouvent, après l'opération, en dedans du Polype. S'ils ſont déjà avancés, ſi l'endroit, par lequel ils tiennent à la mere, eſt déjà fort étranglé, ils s'en détachent en peu de tems, c'eſt-à-dire, au bout d'un jour ou deux; mais, en attendant qu'ils ſe ſéparent, ils s'étendent dans l'eſtomac de leur mere retournée, & l'on voit leur tête, & une partie de leur corps, qui ſort par ſa bouche. J'ai ordinairement ſéparé, avant l'opération, les petits déjà fort avancés qui ſortoient des meres que je voulois retour-

retourner. Ils ne ſont qu'embarraſſer. Mais, il n'en eſt pas de même de ceux qui ſont moins avancés, de ceux qui n'ont pas encore de bras, ou qui n'en ont que de fort courts, & dont le bout poſtérieur ne s'eſt pas encore rétréci. L'ouverture de communication, qui eſt entre l'eſtomac de ces petits & celui de leur mere, eſt encore dans toute ſa grandeur. Lorſque la mere eſt retournée, le jeune peut ſe retourner de lui-même; & c'eſt ce qu'il fait. Il arrive alors préciſément ce qui arriveroit, ſi, après avoir retourné un gant, les doigts de ce gant ſe retournoient d'eux-mêmes. Si on obſerve avec attention le corps de la mere, d'abord après qu'elle a été retournée, on voit, à l'endroit où tient un de ces jeunes dont je parle, un creux qui peu-à-peu ſe remplit; après quoi, on diſtingue ſenſiblement le corps du jeune Polype, qui en ſort en ſe retournant. C'eſt ce que j'ai vu pluſieurs fois, & avec un très grand plaiſir. Il ne faut que quelques minutes, pour que le petit Polype ſoit tout-à-fait retourné. Enſuite, il continue à croître, il ſe détache de ſa mere, & ne différe en rien de tout autre Polype. J'ai nourri de pareils jeunes, & eux & leurs petits ont multiplié dans mes verres.

On conçoit bien, que les bras des Polypes qu'on retourne, ne ſe retournent pas: ils ſe trouvent d'abord un peu en dedans, au-lieu qu'auparavant ils étoient un peu en dehors: mais, en peu de tems, ils ſe diſpoſent comme ceux des Polypes qui n'ont pas été retournés.

C'est, en obſervant un Polype, d'abord après qu'il avoit

avoit été retourné, que j'ai vu l'ouverture que chaque bras a à ſon origine, dont j'ai parlé dans le ſecond Mémoire *, & par le moïen de laquelle le tuïau qu'il forme, communique avec l'eſtomac. On doit chercher ces ouvertures un peu au-deſſous des bords de la bouche d'un Polype nouvellement retourné. Si l'on ſe ſert d'une forte loupe, on voit ſur la peau de petits enfoncemens très ſenſibles. Leur ſituation, & leur nombre, ne permettent pas de douter, que ce ne ſoient les ouvertures des bras des Polypes. Si on continue à obſerver ces ouvertures, on les voit diminuer peu-à-peu, & enfin diſparoitre. Les mouvemens & les renflemens de la peau du Polype les cachent, ou les ferment. Sans doute qu'il ſe forme d'autres ouvertures en dedans de la bouche.

* Pag. 125.

La ſuperficie extérieure d'un Polype, nouvellement retourné, n'eſt pas d'abord auſſi unie que celle d'un Polype non-retourné. Elle eſt telle, que j'ai décrit, dans le premier Mémoire *, la ſuperficie intérieure de la peau des Polypes. Il arrive même, la plupart du tems, que pluſieurs des grains, qui tapiſſent cette ſuperficie extérieure d'un Polype retourné, ſe détachent: elle paroit pendant quelques jours environnée de ces grains qui s'en ſéparent: mais, enſuite, elle devient abſolument auſſi unie que l'eſt la ſuperficie extérieure des Polypes qui n'ont pas été retournés.

* Pag. 55.

J'ai vu un Polype retourné, qui a mangé un petit Ver, deux jours après l'opération. Les autres n'ont pas mangé ſitôt. Ils ont été quatre ou cinq

jours, plus ou moins, ſans vouloir manger. Enſuite, ils ont tous autant mangé, que les Polypes qui n'ont pas été retournés.

J'AI nourri un Polype retourné pendant plus de deux années. Il a beaucoup multiplié.

J'AI auſſi retourné des Polypes de la troiſiéme eſpéce.

DÈS que j'eus retourné des Polypes avec ſuccès, je m'empreſſai à faire cette Expérience en préſence de bons Juges, afin de pouvoir citer d'autres témoignages que le mien, pour prouver la verité d'un Fait auſſi étrange, que celui qu'elle m'a fait connoitre. Je témoignai auſſi ſouhaiter que d'autres entrepriſſent de retourner des Polypes. Mr. Allamand, que j'en priai, mit d'abord la main à l'œuvre, & avec le même ſuccès que moi. Il a retourné pluſieurs Polypes, il a fait enſorte qu'ils reſtaſſent retournés, & ils ont continué à vivre. Il a plus fait: il a retourné des Polypes qu'il avoit déjà retournés quelque tems auparavant. Il a attendu de faire ſur eux cette opération pour la ſeconde fois, qu'ils euſſent mangé après la premiére. Mr. Allamand les a auſſi vu manger après la ſeconde opération. Enfin, il en a même retourné un pour la troiſième fois, qui a vécu quelques jours, & eſt enſuite péri, ſans avoir mangé; mais, peut-être, ſa mort n'eſt-elle point la ſuite de cette opération.

APRÈS que Mr. Allamand m'eut appris, qu'il avoit réuſſi à retourner des Polypes pour la ſeconde fois, j'entrepris de faire la même Expérience ſur deux de ces Animaux, & j'eus le même ſuccès que lui.

NON

NON content d'avoir coupé des Polypes de différentes maniéres, & d'en avoir retourné, j'ai voulu eſſaïer, ſi ces différentes Expériences réuſſiroient ſur le même Polype. J'en ai coupé un en deux transverſalement ; j'ai enſuite retourné ces moitiés lorſqu'elles ont été des Polypes parfaits. Je les ai vu manger & multiplier, après avoir été retournées. J'ai fait la même Expérience, & avec le même ſuccès ſur les moitiés d'un Polype, coupé en deux ſuivant ſa longueur. Enfin, j'ai coupé deux Polypes retournés, qui étoient venus des moitiés d'un même Polype, & j'ai vu les portions de ces Polypes, premiérement coupés, enſuite retournés, & après cela coupés de nouveau ; j'ai vu, dis-je, les portions de ces Polypes devenir des Polypes parfaits.

LE Polype de forme ſinguliére, qui eſt repréſenté dans la Figure 11. de la Pl. XIII. eſt venu d'un Polype retourné imparfaitement. L'opération n'aiant pas bien réuſſi, je donnai un coup de ciſeaux à ce Polype. Une partie fut ſéparée de l'autre, & c'eſt une de ces parties qui, environ au bout de deux mois, étoit telle qu'elle eſt repréſentée dans cette Figure, après avoir fait pluſieurs repas.

J'AI dit ci-deſſus, que la plupart des Polypes retournés, entreprennent de ſe déretourner, & que même ils peuvent en venir à bout: je dois ajouter ici, que tous ceux, qui ſe déretournent, ne ſe déretournent pas entiérement. C'eſt ce que j'ai eu occaſion de voir, peu après avoir réuſſi à retourner des Polypes; & dans la ſuite j'en ai retourné exprès, pour

pouvoir obſerver ceux qui ne ſe déretourneroient qu'en partie.

Dès que j'en eus vu quelques-uns dans cet état extraordinaire, je fus très curieux de ſavoir ce qu'ils deviendroient: &, certainement, ils ne méritent pas moins d'attention que ceux qui reſtent parfaitement retournés. Ces derniers * ont toûjours une bouche à leur extrémité antérieure *, c'eſt la même bouche que celle qu'ils avoient avant que d'être retournés: elle eſt formée par les mêmes lévres, garnies des mêmes bras: toute la difference qu'il y a, c'eſt que le côté de la peau qui étoit en dehors, ſe trouve en dedans, & que celui qui étoit en dedans, ſe trouve en dehors. Il en eſt tout autrement d'un Polype déretourné en partie. Ses lévres, après qu'il a été retourné, ſe ſont renverſées ſur le corps, la partie antérieure du corps s'eſt même renverſée ſur une partie du reſte *, la peau qui forme cette partie antérieure, s'eſt appliquée ſur l'autre, elle s'y eſt enfin attachée, & a fait à l'extrémité antérieure du Polype, une eſpéce de bourelet *, formé de la portion déretournée, & d'une portion non-déretournée qui eſt en dedans. Le reſte du corps *, la partie poſtérieure de ce Polype extraordinaire eſt encore retournée, & demeure telle. Les lévres *, qui formoient la bouche du Polype, ne ſont plus à ſon extrémité antérieure, elles ſe trouvent plus ou moins près de l'une ou de l'autre extrémité, ſuivant que le Polype s'eſt plus ou moins déretourné: ce qui varie beaucoup. Ces lévres * ſont attachées autour de la portion du corps qui ne s'eſt pas déretournée. La bouche qu'elles

* PL. XI. Fig. 16. *a b.* * *a.*

* Fig. 17.

* *a c.*

* *a b.*

* *a.*

* *a.*

ſes forment, ſi tant eſt que cela puiſſe encore s'appeller une bouche, eſt remplie par cette portion du corps non-déretournée, qui paſſe par cette bouche. Les bras, qui ſortent de ſes bords, ſont alors ſitués d'une maniére fort extraordinaire, & ne paroiſſent plus propres à rapprocher des proies du bout antérieur du Polype: ils varient beaucoup leur direction; quelquefois ils ſont dirigés vers l'extrémité poſtérieure du Polype *, mais ils ſe recourbent plus ſouvent vers le bout antérieur *.

* PL. XI. Fig. 17.

* Fig. 18.

Ce fut, à me mettre bien au fait de l'état de ces Polypes déretournés en partie, que je m'occupai d'abord; & plus j'approfondis la ſituation ſinguliére dans laquelle ils étoient, plus je fus impatient de ſavoir ce qu'ils deviendroient. Comment mangeront-ils? Ce fut la premiére queſtion que je me fis. Leur extrémité antérieure *, formée par les bords de la portion renverſée *, pouvoit être reſtée ouverte, comme elle l'étoit certainement peu après que le Polype s'étoit mis dans cette ſituation ſinguliére; cette ouverture pouvoit ſervir de bouche. Il falloit pour cela qu'il vint des bras autour de ſes bords. C'eſt ce qui me parut d'abord le plus vraiſemblable; mais, j'eus bientôt lieu de penſer qu'il n'en ſeroit rien. Etant parvenu à obſerver avec une forte loupe le bout antérieur de quelques Polypes qui étoient depuis quelques jours déretournés en partie, je remarquai qu'il étoit entiérement fermé: non ſimplement comme l'eſt ſouvent la bouche des Polypes ordinaires, mais de maniére à faire croire qu'il ne pouvoit pas s'ouvrir, qu'il n'y avoit point de bouche. Je ne

* Fig. 17. *c.*

* *c a.*

fus enſuite pas long-tems à apprendre comment ces Polypes pourroient manger. En les obſervant avec attention, je remarquai de nouveaux bras qui pouſſoient près des anciens, & je vis une, & même pluſieurs bouches, qui ſe formoient à peu près au milieu du corps de ces Polypes, ſavoir près de l'endroit où leurs lévres s'étoient attachées à leur corps *. Je vis les lévres de ces bouches diſpoſées en mamelon cônique; & c'eſt ſur-tout à quoi je les reconnus. Voilà donc des Polypes, ſur les côtés deſquels il ſe forme une ou pluſieurs bouches: il vient des bras autour de ces bouches; en un mot elles reſſemblent parfaitement à celles des Polypes ordinaires.

* PL. XI. Fig. 17. *a.*

On pourroit, peut-être, ſoupçonner, que ces bouches, qui ſe forment ſur les côtés des Polypes, déretournés en partie, ne ſont pas véritablement de ſimples bouches, mais de jeunes Polypes qui ſortent de ces côtés. J'oſe aſſurer, que ce ne ſont pas des jeunes. Je me fonde ſur des Expériences ſuivies, dont on va voir des exemples. J'ai vu de ces bouches ſe former ſi près des anciennes lévres * du Polype, qu'un côté de leurs lévres étoit garni d'une partie des anciens bras, & l'autre de quelques nouveaux bras qui commençoient à pouſſer. Les uns étoient fort longs, & les autres fort courts: ces derniers ſe ſont enfin allongés, & il n'a enſuite plus été poſſible de les diſtinguer des autres.

* *a.*

Un Polype, déretourné en partie, ne conſerve pas long-tems la forme qu'il a d'abord après s'être mis dans cette ſituation *. Il en prend enſuite pluſieurs autres très remarquables. C'eſt ce dont on pour-

* Fig. 17. & 18.

ra

ra juger par les Obſervations que je vais décrire.

J'AI retourné un Polype de la ſeconde eſpéce le 26 Septembre 1742. Ce Polype a entrepris de ſe déretourner. Il a réuſſi en partie *. Le 1 Octobre, la portion qui s'étoit déretournée *, ſavoir l'antérieure, étoit déjà attachée & réunie à celle ſur laquelle elle s'étoit renverſée, & formoit avec elle le bourelet *a c*. Les bras étoient dirigés vers l'extrémité poſtérieure *. Il m'a paru qu'il n'y avoit en *c* aucune ouverture. Le bourelet *a c*, compoſé, comme je l'ai déjà dit, de la portion déretournée, & de la ſuivante ſur laquelle la premiére s'eſt appliquée; ce bourelet, dis-je, que je nommerai dans la ſuite ſimplement portion déretournée, avoit changé de ſituation d'une maniére remarquable, le 4 Octobre. Il n'étoit plus bout à bout avec le reſte du corps du Polype, comme dans la Fig. 17. L'endroit *a*, par lequel cette portion déretournée *a c* tenoit au reſte *a b* du Polype, s'étoit un peu étranglé, & la portion *a c* faiſoit avec lui un angle droit. C'eſt ce qui ſe voit dans la Figure 19, où *a c* repréſente la portion déretournée, & *a b* le reſte du corps. Je remarquai le même jour en *e*, une tête de Polype; & je ne pus comprendre comment elle s'étoit formée. Je ſoupçonnai que c'étoit un jeune: mais, la ſuite de mes Obſervations m'en a fait douter. Cette tête eſt reſtée très long-tems attachée au Polype, & beaucoup plus qu'elle n'auroit dû, ſi elle avoit été un jeune Polype ordinaire. Elle doit donc être conſidérée, ou comme un jeune Polype extraordinaire, ou comme une tête qui s'eſt formée en cet endroit, & qui dans la ſuite, en s'allongeant, a eu un

* PL. XI. Fig. 17. * *a c*. * *b*.

col.

col. Elle a pris differentes formes, que j'aurai ſoin de faire remarquer. Je l'appellerai dans la ſuite la portion équivoque. En obſervant avec attention, à la loupe, le Polype dont il s'agit dans cette Expérience, je découvris le 4 Octobre en *a* * pluſieurs bras qui commençoient à pouſſer, & qui me parurent border un côté * d'une bouche † qui s'étoit formée en cet endroit. L'autre côté * de cette bouche étoit bordé par une partie des anciens bras * du Polype. J'obſervai le lendemain, 5 Octobre, ce Polype avec une grande attention, parce que j'étois extrêmement curieux de ſuivre la formation de la nouvelle bouche que j'avois remarquée le jour précédent. Je vis très diſtinctement cette bouche. Les lévres étoient diſpoſées en mamelon cônique, & les nouveaux bras étoient plus petits que les anciens. Je n'avois donc plus lieu de douter qu'il ne ſe fût formé une bouche à peu près ſur le milieu de ce Polype, & par conſéquent dans un tout autre endroit que celui où elle eſt ordinairement. Elle étoit, outre cela, remarquable, en ce qu'un côté de ſes lévres étoit garni, comme je l'ai dit, de nouveaux bras, & l'autre, d'une partie des anciens. On verra bientôt ce qu'eſt devenu le reſte des anciens bras. Le même jour, 5 Octobre, la portion déretournée *a c* *, qui faiſoit le 4 un angle droit † avec la portion non-déretournée *a b*, s'étoit rapprochée de cette derniére partie, de maniére qu'elle faiſoit avec elle un angle aigu. C'eſt ce qu'on peut voir dans la Figure 20, où *a c* repréſente la portion déretournée, & *a b*, la portion non-déretournée. La portion équivoque *e* paroiſſoit comme le 4. Je donnai un Ver au

* PL. XI. Fig. 19.
* *a o.*
† *a o n.*
* *a n.*
* *a d*, *a d.*
* Fig. 19.
† *c a b.*

au Polype, pour juger s'il pouvoit déjà ſe ſervir de ſa nouvelle bouche, & ſi ce qui entreroit par cette bouche, ſe répandroit dans les differentes portions qui compoſoient ce Polype extraordinaire. Le Ver, étant tombé ſur les anciens bras, en fut d'abord arrêté, & ramené ſur la nouvelle bouche. Il fut avalé, comme il l'auroit été par un Polype ordinaire; & en moins d'une heure, je vis que les portions *a c*, *a b*, *a e* * étoient renflées, qu'elles étoient toutes remplies de la matiére du Ver, qui avoit déjà été macéré dans l'eſtomac. * PL. XI. Fig. 20.

QUOIQUE depuis le 5 Octobre juſqu'au 9, j'aie réguliérement obſervé tous les jours le Polype dont il s'agit ici, je ne m'arrêterai pas à décrire ce que j'ai vu dans cet intervalle, parce que les différences que j'ai obſervées d'un jour à l'autre, ne ſont pas aſſés remarquables. Mais, il ſe trouva le 9 fort différent de ce qu'il étoit le 5. On peut en juger par la comparaiſon des Figures 20 & 21. Cette derniére repréſente au naturel ce Polype, tel qu'il étoit le 9. *a c*, eſt la portion déretournée, & *a b*, la portion non-déretournée: on voit diſtinctement que ces deux portions ont une bouche commune *. C'eſt cette bouche dont j'ai apperçu les commencemens le 4 *, & qui eſt en partie garnie de nouveaux bras, & en partie d'anciens. Le reſte des anciens bras ſe voit ſur la portion déretournée *a c* *, depuis *a* juſqu'en *t*. La portion équivoque *e* étoit le 9, telle qu'elle eſt repréſentée dans cette Figure. Comme le Polype avoit mangé entre le 4 & le 9, il étoit crû ſenſiblement. Il a peu changé de Figure entre le 9 & le 24, comme on le peut voir, en comparant la Figure 21, qui le repréſente tel qu'il * PL. XI. Fig. 21. *a*. * Fig. 19. *a o n*. * Fig. 21.

étoit le 9, avec la Figure 22, qui le repréſente tel qu'il étoit le 24. Il étoit plus grand le 24. Les anciens
* PL. XI. Fig. 21. bras, qui étoient le 9 entre *a* & *i* *, étoient diſparus
* Fig. 22. le 24. J'apperçus ce jour-là une tête en *u* * qui avoit déjà un col, & que je pris d'abord pour un jeune: mais, elle eſt reſtée telle qu'elle étoit alors, pendant plus de trois mois que j'ai obſervé ce Polype depuis ce tems-là; ce qui donne lieu de penſer que ce n'étoit pas un jeune, mais ſimplement une tête. Le Polype avoit le 24 deux petits, dont l'un ſortoit de la portion déretournée en *g*, & l'autre, de la portion non-déretournée en *f*. Ils ſe ſont ſéparés quelques jours après.

Depuis le 9 Octobre, juſqu'à ce que j'aie ceſſé d'obſerver le Polype dont il s'agit ici, je l'ai vu marcher pluſieurs fois. Il ſe fixoit ordinairement par ſes
* Fig. 22. *b* & *c*. deux extrémités poſtérieures *. On juge bien, qu'en marchant, il devoit prendre des attitudes fort différentes de celles qui ſont repréſentées dans les Figures 21 & 22. Lorſqu'il étoit en repos, il étoit ordinairement dans la ſituation, ou dans une ſituation approchante de celle qui eſt repréſentée dans la Figure 22; c'eſt-à-dire que les portions *a c* & *a b* étoient plus ou moins rapprochées l'une de l'autre. Je ne m'arrêterai point à ce que j'ai obſervé au ſujet de ce Polype, juſqu'au 17 Décembre. Il ſuffira que je le décrive tel qu'il étoit ce jour-là. Il étoit fixé con-
* Fig. 23. tre les parois du verre par les extrémités *b* & *c* *, de maniére que les portions *a b* & *a c* étoient à peu près bout à bout l'une de l'autre. Il avoit quatre petits,
* *a b*. dont un ſortoit de la portion non-déretournée *, &
* *a c*. trois de la portion déretournée *, ſans compter un jeu-

jeune en forme de cône *, qui ſortoit auſſi de cette portion. La portion équivoque * avoit auſſi deux jeunes ſemblables. * PL. XI. Fig. 23. *b*, * *e*.

J'AI nourri ce Polype juſqu'au mois de Février ſuivant, ſans remarquer en lui de changement conſidérable. C'eſt dans ce mois-là, que j'ai ceſſé de l'obſerver. Il y a toûjours eu une communication entre la portion déretournée *a c* *, & la portion non-déretournée *a b*; c'eſt-à-dire, que les alimens, qui paſſoient par la bouche *a*, ou par la bouche *u*, ſe répandoient dans ces deux portions. Mais, je n'ai plus remarqué de communication entre la portion équivoque *e*, & le reſte du Polype, depuis la fin de Décembre. * Fig. 23.

LES Obſervations, que je viens de rapporter, ſuffiſent pour faire ſentir combien ſont curieux les Polypes qui ſe déretournent en partie. Pour bien juger des révolutions qui ſe font dans ces Animaux, on n'a qu'à comparer de ſuite les Figures 17, 19, 20, 21, 22 & 23, qui repréſentent le même Polype, & dans leſquelles la portion déretournée eſt toûjours marquée *a c*, & celle qui n'eſt pas déretournée *a b*.

CES changemens ne ſont pas les mêmes dans tous les Polypes. Ils varient au contraire conſidérablement. J'ai obſervé pluſieurs Polypes, qui s'étoient déretournés en partie, & je n'en ai pas trouvé deux, dont les changemens de figure fuſſent parfaitement ſemblables.

LES Obſervations ſuivantes, faites ſur un Polype, déretourné en partie, m'ont paru dignes d'être rapportées. Lorſque je pris ce Polype pour le retour-

ner, il avoit deux petits qui ſortoient à peu près du milieu de ſon corps, l'un d'un côté, & l'autre de l'autre. Leurs bras avoient commencé à pouſſer. Avant que de retourner la mere, je coupai le plus grand de ces deux jeunes Polypes, auſſi près du corps de cette mere qu'il fut poſſible, de ſorte qu'il y eut une ouverture dans ſa peau, à l'endroit où étoit le jeune. Celui, qui étoit reſté attaché à la mere, ſe trouva dans ſon eſtomac, dès qu'elle fut retournée. Comme il étoit déjà aſſés avancé, je ne m'attendois pas à le voir ſe retourner de lui-même, ainſi que j'ai dit que le font ceux qui ne ſont pas avancés *. Je comptois qu'il s'étendroit dans l'eſtomac, & que ſa tête ſortiroit par la bouche de la mere retournée, comme il arrive ſouvent. Au lieu de cela, je le vis paroitre ſur le milieu de ſon corps, mais ſur le côté oppoſé à celui auquel il étoit attaché, & où il auroit dû paroitre, s'il s'étoit retourné de lui-même. Je n'eus pas beſoin d'en chercher long-tems la raiſon: je vis clairement, que ce jeune Polype, s'étant trouvé, après le retournement, enfermé dans l'eſtomac, étoit paſſé par l'ouverture, faite à la peau de la mere en ſéparant l'autre jeune d'elle, & avoit paru en dehors de cette mere, préciſément à l'endroit où étoit auparavant le jeune qui avoit été retranché. Ce Fait excita extrêmement ma curioſité. On verra bientôt ce que devint ce jeune.

* Pag. 262.

La mere a été retournée le 24 Septembre 1742. Elle s'eſt déretournée en partie; & la portion déretournée, après s'être peu-à-peu inclinée ſur la portion non-déretournée, entre le 24 Septembre & le 4 Octobre, faiſoit ce jour-là avec elle un angle droit. C'eſt

C'eſt ce qu'on peut voir dans la Figure 1, de la Pl. XII, dans laquelle *a c* repréſente la portion déretournée, *a b* la portion non-déretournée, & *e i* le jeune dont j'ai parlé ci-deſſus. L'endroit *a*, par lequel la portion *a c* tenoit à la portion *a b*, avoit commencé à s'étrécir.

Le lendemain, 5 Octobre, mon Polype ſe trouva dans une ſituation bien différente de celle où il avoit été le jour précédent. Quiconque ne l'auroit pas obſervé auparavant avec une grande attention, & n'auroit pas été fort accoutumé à un Examen ſuivi de ces Animaux, auroit eu bien de la peine à le reconnoitre. La portion déretournée *a c* *, s'étoit placée parallélement à la portion non-déretournée *a b*; & le jeune Polype *e i* ſe trouvoit bout à bout de la portion non-déretournée *a b*, & paroiſſoit parfaitement uni avec elle. L'état dans lequel ſe trouva le Polype déretourné en partie, dont il s'agit ici, eſt repréſenté dans la Figure 2. *a c* repréſente la portion non-déretournée, déſignée par les mêmes lettres dans la Figure 1. *e b* eſt la portion non-déretournée, & *e i* le jeune, qui eſt bout à bout avec cette portion *e b*. Après avoir examiné ce Polype, & admiré comment ce jeune s'étoit enté ſur la portion non-déretournée, je lui donnai à manger. Les bras ſaiſirent un Ver, il l'avala par la bouche *i*, & les alimens ſe répandirent dans tout le corps *i e b*; de ſorte qu'après avoir vu cela, je n'eus plus lieu de douter que le jeune *i e* * ne fût parfaitement uni à la portion non-déretournée *e b*, & ne formât avec elle un ſeul Polype, & un Polype certainement des plus ſinguliers, puiſqu'il é-

* Pl. XII. Fig. 1.

* Fig. 1 & 2.

toit compoſé d'un petit, & d'une portion de ſa mere, ſur laquelle il étoit enté. Ce n'eſt pas tout: la portion *e b* * de la mere étoit retournée, & le petit *i e* ne l'étoit pas. Ainſi, la moitié poſtérieure de ce Polype étoit retournée, & la moitié antérieure ne l'étoit pas. Mais, il s'agiſſoit de ſavoir ſi ce jeune *i e* reſteroit toûjours uni à la portion *e b* de la mere, ſi le Polype *i e b* ne s'étrangleroit point en *e*, & ſi enſuite *i e* ne ſe ſépareroit point de *e b*. C'eſt à quoi j'ai donné une grande attention. Le 9 Octobre, le Polype étoit tel qu'il eſt repréſenté dans la Figure 3. Le jeune *i e* étoit toûjours uni à la portion déretournée *e b*. Les anciens bras, qui ne bordoient pas la bouche *a* * de la portion déretournée *a c*, ſe voioient ſur le corps de cette portion de *a* en *o*. Je donnai à manger au Polype *i e b* & à la portion déretournée *a c*, & je remarquai, qu'il n'y avoit plus de communication entre eux. Le Polype *a c* s'eſt ſéparé du Polype *i e b*, le 15 Octobre. Je les ai nourris l'un & l'autre encore deux mois depuis leur ſéparation. Ils ont multiplié, & fait en tout les fonctions de Polypes complets. La partie antérieure *i e*, du Polype *i e b*, réſultante du jeune *i e* *, ne s'eſt point ſéparée de la partie poſtérieure *e b* * réſultante de la portion non-déretournée *a b* * du Polype qui a été retourné le 24 Septembre.

* PL. XII. Fig. 2.

* Fig. 3.

* Fig. 1.

* Fig. 3.

* Fig. 1.

Le Polype, dont je vais parler à préſent, a été retourné le 3 Octobre 1742. Il étoit le lendemain déretourné en partie *. J'ai vu clairement le 10, qu'il s'étoit formé trois têtes près de l'endroit * où les lévres du Polype s'étoient arrêtées après qu'il a été dére-

* PL. XI. Fig. 18. * *a*.

déretourné en partie. Ces trois têtes avoient déjà un col ce jour-là. Le Polype paroiſſoit alors tel qu'il eſt repreſenté dans la Figure 4, de la Pl. XII. *a b* déſigne la portion non-déretournée, marquée auſſi *a b*, Fig. 18, Pl. XI. Le reſte *a d c g e* * eſt venu de la portion déretournée. *d*, *g*, *e* ſont les trois têtes, qui ſe ſont formées en *a*, Fig. 18. Pl. XI. * PL. XII. Fig. 4.

J'AI donné pluſieurs fois à manger à ce Polype, entre le 10 & le 24 Octobre, & il a pris des alimens par ſes trois bouches *. Il a crû dans cet intervalle, & a changé de figure. On le trouve repréſenté dans la Figure 5, de la Pl. XII, tel qu'il étoit le 24; & ſi on la compare avec la Figure 4, on pourra facilement juger du changement qui s'eſt fait. Les différentes parties du Polype ſont déſignées dans l'une & dans l'autre par les mêmes lettres. *a b*, portion retournée. *a d c g e*, portion déretournée avec les têtes *d*, *g*, *e*, qui ſont dans la Figure 5 déſignées avec leurs cols par les lettres *a d*, *n g*, *n e*. *c* marque le bout antérieur du Polype, après qu'il a été déretourné. Il eſt déſigné par la même lettre dans la Figure 4, & dans la Figure 18 de la Pl. XI. * Fig. 4. *d*, *g*, *e*.

LA portion *c o* * s'eſt enſuite fendue de *c* en *o*, de ſorte que le 6 Novembre la partie du Polype, marquée *b a c d*, ne tenoit plus à l'autre, marquée *c n g e o*, que par un appendice qui étoit en *o*. C'eſt ce qu'on peut voir dans la Figure 6, qui repréſente ce Polype tel que je l'ai vu le 6 Décembre. *o*, appendice par lequel les deux parties *b a c d* & *o c n g e* tenoient encore enſemble. *a b*, portion non-déretournée. *a c*, partie de la portion non-déretournée, marquée *a o c* dans la Fi- * Fig. 5.

Figure 5. *a d*, une des têtes du Polype avec ſon col. Cette tête n'étoit pas ce jour-là dans la ſituation où elle étoit le 24 Octobre. Au-lieu de faire avec *a b* l'angle *d a b* *, elle faiſoit avec *a b* à peu près une ligne droite *d a b* *. La portion *o c* déſigne l'autre partie de *a o c* *, qui s'eſt partagée, comme je l'ai dit, de *c* en *o*. Ces deux parties *a c* & *o c* *, qui en ſont venues, ont crû, de même que le reſte du Polype, entre le 24 Octobre & le 6 Novembre, par le moïen des alimens qu'il a pris. *n g*, *n e*, les deux autres têtes de ce Polype.

* PL. XII. Fig. 5.
* Fig. 6.
* Fig. 5.
* Fig. 6.

Les deux parties *b a d c* & *c n g e o* ſe ſont ſéparées le 10 Novembre, & étoient enſuite telles qu'elles ſont repréſentées dans les Figures 7 & 8, de la Pl. XII. *a d* * ne faiſoit plus une ligne droite avec *a b*, comme le 6 Novembre, mais un angle *b a d*, comme le 24 Octobre, ainſi qu'on en peut juger, en comparant *b a c d* Fig. 7, avec *b a c d* Fig. 5. Pour la partie *c n g e* *, elle étoit le 10 Novembre à peu près comme le 6 de ce mois-là & même comme le 24 Octobre. C'eſt auſſi ce dont on peut juger, en comparant enſemble les Figures 5, 6, & 8. J'ai gardé encore pendant quelque tems après le 10 Novembre, les deux parties repréſentées dans les Figures 7 & 8. Elles n'ont pas beaucoup changé de forme.

* Fig. 7.
* Fig. 8.

En obſervant des Polypes, déretournés en partie, j'ai ſouvent été curieux de ſavoir ce que devenoit la portion retournée du Polype, qui étoit couverte par la portion déretournée. Il me vint dans l'eſprit, que les parois de ces deux portions, qui étoient appli-

pliquées l'une contre l'autre, ſe joignoient, peut-être, enſemble, enſorte qu'elles ne formoient enſuite qu'une ſeule peau. Suivant cela, la portion déretournée *, devoit, en quelque maniére, être doublée par la portion retournée qu'elle avoit recouverte. Je penſai à cette occaſion, que ſi la portion déretournée eſt doublée par la portion retournée qu'elle a recouverte, on pourroit, peut-être, doubler un Polype, en introduiſant dans ſon corps un autre Polype. Il s'agiſſoit donc de mettre dans l'eſtomac d'un Polype, un autre Polype, de maniére que les parois de l'eſtomac du premier fuſſent appliquées contre la ſuperficie extérieure de la peau du ſecond, &, il s'agiſſoit d'obſerver enſuite, ſi les peaux de ces deux Polypes ſe coleroient enſemble; ſi le Polype *intérieur* ſerviroit de doublure au Polype *extérieur*, & ſi après cela ils ne formeroient plus qu'un ſeul Polype.

* PL. XI. Fig. 17 & 18. *a b.*

Je m'appliquai d'abord à chercher un expédient pour introduire un Polype dans un autre Polype. Voici celui qui m'a paru le plus propre. Je donne d'abord à manger aux Polypes qui doivent ſervir pour cette Expérience, afin que les alimens qu'ils prennent, les obligent à ſe renfler, & ſervent à leur faire ouvrir la bouche quand cela ſera néceſſaire. Je mets enſuite ſur ma main gauche, hors de l'eau, le Polype qui doit être introduit dans l'eſtomac d'un autre Polype: je le fais contracter le plus qu'il eſt poſſible; & je le preſſe avec un pinceau, de maniére que les alimens qu'il a dans l'eſtomac, ſortent en partie par la bouche, & la forcent à s'ouvrir. Enſuite je prens de la main droite une ſoie de ſanglier,

dont je fais entrer le plus gros bout dans la bouche du Polype, & que je pouſſe juſqu'au fond de ſon eſtomac. Il eſt même aſſés facile d'introduire le bout d'une ſoie de ſanglier dans le corps d'un Polype qui n'eſt pas rempli d'alimens. Quand cela eſt fait, je place ſur ma main le Polype dans lequel le premier doit être mis, je lui fais ouvrir la bouche, & enfin, je fais entrer dans ſon eſtomac ce Polype, & la ſoie de ſanglier au bout de laquelle il eſt. Ce bout ſe trouve alors couvert par deux Polypes mis l'un dans l'autre. Je le trempe dans l'eau d'un petit verre préparé d'avance, je fais tomber les Polypes au fond; & je les examine avec une loupe.

Je n'ai d'abord pris aucune précaution, pour obliger le Polype intérieur à reſter dans le Polype extérieur: mais, aiant remarqué qu'il en ſortoit, j'ai eu ſoin dans la ſuite d'embrocher les deux Polypes après qu'ils ont été mis l'un dans l'autre, de maniére que la ſoie de ſanglier les tranſperçoit tous deux.

Je m'attendois de voir deux Polypes, mis l'un dans l'autre, ſe coler enſemble, & ne former enſuite qu'un ſeul Polype; mais, j'ai vu d'abord tout autre choſe, & une choſe que j'aurois à peine cru poſſible. Les Polypes, mis l'un dans l'autre, quoiqu'embrochés comme je l'ai dit, ſe ſont ſéparés pluſieurs fois: l'intérieur eſt ſorti de l'extérieur. Les Expériences, que je vais rapporter, feront connoitre la maniére ſinguliére dont cela s'eſt fait.

Le 17 Octobre 1742, j'ai mis un Polype de la ſeconde eſpéce dans un autre Polype de cette eſpéce. J'ai auparavant retranché un peu le Polype exté-

extérieur par ſon bout poſtérieur, afin qu'étant ouvert à cet endroit, & plus court que le Polype intérieur, le bout poſtérieur de ce dernier pût ſortir par l'ouverture, & que je puſſe m'aſſurer par-là que ſon corps alloit d'un bout à l'autre de l'eſtomac du Polype extérieur. Enſuite, j'ai tranſpercé ces deux Polypes avec une ſoie de ſanglier. Je les ai mis dans un verre. Ils étoient tels qu'ils ſont repréſentés dans la Figure 9 de la Pl. XII, dans laquelle *c* repréſente la tête du Polype intérieur, & *a* celle du Polype extérieur. *d*, le bout poſtérieur du Polype intérieur, & *b*, celui du Polype extérieur. On voit, par cette Figure, que la tête & la queuë du Polype intérieur ſortent de l'extérieur. Le 17 Octobre même, le bout poſtérieur *b d* * du Polype intérieur *c a b d* a fendu la peau du Polype extérieur; & eſt paſſé par cette ouverture, deſorte que le ſoir il étoit déjà parvenu à l'endroit, marqué *i* dans la Figure 10. La portion *i d* du Polype intérieur étoit donc déjà ſortie du Polype extérieur. L'ouverture, faite à la portion *i b* du Polype extérieur, s'eſt toûjours refermée, à meſure que la portion *i d* avançoit. Je n'ai jamais apperçu cette ouverture, ni même de cicatrice.

* PL. XII. Fig. 9.

Le 18 Octobre au matin, je trouvai que le bout poſtérieur du Polype intérieur, avoit continué à ſortir du Polype extérieur, en le fendant par le côté; & qu'il étoit déjà dehors juſqu'à l'endroit *e* *, où la ſoie de ſanglier tranſperçoit les deux Polypes. Je trouvai le ſoir, que le Polype intérieur ſortoit du Polype extérieur un peu au-deſſus de *e*. On voioit

* Fig. 11.

diſtinctement que la ſoie de ſanglier tranſperçoit ces deux Polypes l'un après l'autre. C'eſt ce qui eſt repréſenté dans la Figure 11, où *c a i d* repréſente le Polype intérieur, & *a i b* le Polype extérieur. *i d* eſt la portion du Polype intérieur qui eſt ſortie de la portion *i b* du Polype extérieur, en l'ouvrant peu à peu.

* PL. XII. Fig. 11. LE 21, le bout antérieur *c a* * du Polype intérieur, a commencé à fendre les lévres du Polype extérieur; & le lendemain, la portion *c a i* du Polype intérieur étoit entiérement ſortie de la portion *a i* du Polype extérieur, enſorte que ces deux Polypes étoient alors * Fig. 12. à côté l'un de l'autre *. Ainſi le Polype *c e d*, qui avoit été mis dans le Polype *a e b* le 17 Octobre, en eſt ſorti en quatre jours, en le fendant peu à peu de *b* en *e* & de *a* en *e*.

J'AI vu manger un Ver à chacun de ces deux Polypes le 25 Octobre; & le jour ſuivant je les ai déſ- * Fig. 12. embrochés. Ils étoient un peu attachés en *e* *; mais, quelques jours après, ils ſe ſont entiérement ſéparés. Je les ai nourris pendant quelque tems, & ils n'ont en rien différé des autres Polypes.

LES deux Polypes, dont je vais parler, ont auſſi été mis l'un dans l'autre, & l'intérieur eſt auſſi ſorti de l'extérieur, mais un peu différemment de celui dont il a été queſtion ci-deſſus. C'eſt le 17 Oct. 1742, que j'ai mis l'un dans l'autre les Polypes dont il s'agit ici. Je les ai embrochés, mais un peu plus près de la tête * Fig. 13. que les deux précédens. Le bout poſtérieur *b d* * du Polype intérieur ſortoit par l'extrémité poſtérieure *b* de l'intérieur; mais, la tête de l'intérieur paroiſſoit à

pci-

peine hors de la bouche de l'extérieur le jour de l'opération. Le lendemain, 18 Octobre, je n'ai pu appercevoir que les bras * de l'intérieur, & enſuite ils ſont même rentrés entiérement dans le corps de l'extérieur. Le 19, j'ai trouvé le matin les bras * du Polype intérieur qui ſortoient de la bouche du Polype extérieur, laquelle étoit formée en mamelon cônique *. Vers le midi, j'ai vu la tête même du Polype intérieur hors de la bouche de l'extérieur. A quatre heures, je n'ai plus vu que les bras, de même que toute la ſoirée, pendant laquelle j'ai obſervé pluſieurs fois ces Polypes. J'ai compté à neuf heures & demie du ſoir cinq bras * de l'intérieur, qui ſortoient par la bouche *a* de l'extérieur. Le 20, à huit heures & demie du matin, quelques bras de l'intérieur ſortoient par la bouche de l'extérieur. Toute la tête ſortoit à deux heures après midi; & depuis ce moment-là, juſqu'à neuf heures & demie du ſoir, j'ai toûjours vu la même choſe. Je n'ai apperçu le 21, que quelques bras du Polype intérieur qui ſortoient de la bouche du Polype extérieur. A midi, j'ai trouvé un grand changement. La queuë du Polype intérieur avoit fendu en partie un côté du Polype extérieur, & en étoit ſortie. Le ſoir, la portion *e d* * du Polype intérieur, qui ſortoit de l'extérieur *a e b*, aboutiſſoit déjà à l'endroit *e*, où la ſoie de ſanglier *n f* tranſperçoit les deux Polypes. La tête & les bras du Polype intérieur ne paroiſſoient plus hors de la bouche * de l'extérieur, mais cinq bras, *t o*, *t o* &c. ſortoient par une ouverture *t*, par laquelle paſſoit la ſoie de ſanglier. Cette ouverture étoit au côté oppoſé à celui par lequel ſortoit

* PL. XII. Fig. 13. *a o*.

* *a o*.

* *a*.

* *a o*.

* Fig. 14.

* *a*.

toit la portion *e d* de l'intérieur. Le 22, je n'ai vu que deux bras *t o*, *t o* * hors de l'ouverture *t*, par laquelle il en ſortoit cinq le jour précédent : mais, il en ſortoit un * par une ouverture † qui étoit au côté oppoſé. Il m'a ſemblé que je voiois même la tête du Polype intérieur qui ſe montroit un peu par cette derniére ouverture. Enfin, cette tête eſt ſortie le 23 par l'ouverture *e*, & le Polype intérieur s'eſt trouvé hors du Polype extérieur, & placé à côté de lui *.

* PL. XII. Fig. 15.

* *t o*.
† *t*.

* Fig. 12.

On voit donc que le Polype intérieur, au-lieu de fendre la portion *a e* du Polype extérieur, pour faire ſortir ſon bout antérieur, comme cela eſt arrivé dans le cas décrit ci-deſſus; on voit, dis-je, que le Polype intérieur a retiré ſa tête en dedans de l'extérieur, & l'a enſuite fait ſortir par le côté de ce Polype, & avec elle toute la partie antérieure *c e* *.

* Fig. 12.

Je dois faire remarquer ici, que le Polype intérieur a été pendant quatre jours dans le Polype extérieur; & qu'au bout de ce tems-là, il en eſt ſorti en vie, & ſe portant bien. C'eſt de ce Fait dont j'ai voulu parler dans le ſecond Mémoire *.

* Pag. 114.

On pourroit, peut-être, dire, que le Polype intérieur n'a pas été digéré par le Polype extérieur, parce que ce dernier, étant tranſpercé par une ſoie de ſanglier, ne peut pas digérer comme un Polype qui n'eſt pas tranſpercé. Mais, pour répondre à cette objection, je dirai, que le Polype extérieur dont il s'agit, & qui n'a pu en quatre jours faire mourir dans ſon eſtomac le Polype intérieur,

rieur, a mangé, pendant qu'il étoit embroché, pluſieurs Vers, qui ſont morts, & qui ont été digérés, en peu de tems, dans ſon eſtomac.

Les deux Polypes, dont je vais parler à préſent, ont été mis l'un dans l'autre le 9 Octobre 1742. Ils étoient ce jour-là tels que ceux qui ſont repréſentés dans la Figure 9, de la Pl. XII. Le ſuccès de l'Expérience que j'ai faite ſur eux, a été fort different de celui des deux Expériences que je viens de rapporter. Ces deux Polypes n'avoient point changé de ſituation le 12, lorſque je retirai la ſoie de ſanglier qui les tranſperçoit: mais, je remarquai le ſoir, que le bout *c a* * du Polype intérieur, qui ſortoit de la bouche *a* du Polype extérieur, étoit beaucoup plus long que les jours précédens. Je ne ſais ſi cela venoit de ce que le bout *c a* étoit davantage étendu, ou ſi réellement le Polype intérieur ſortoit davantage de la bouche du Polype extérieur. Le 13, la queuë du Polype intérieur a fendu de bas en haut le corps du Polype extérieur juſqu'à l'endroit marqué *i* *. La portion *i d* déſigne celle du Polype intérieur qui eſt ſortie de l'extérieur. Ils étoient encore le 16, tels qu'ils ſont repréſentés dans la Figure 2. J'ai donné un Ver au Polype intérieur *c a i d*, qui pouvoit ſeul manger, la bouche * de l'autre étant remplie par la portion de ce Polype qui en ſortoit. Cependant, j'ai remarqué que les alimens ſe ſont, non ſeulement répandus dans le Polype intérieur qui avoit mangé, mais auſſi dans le Polype extérieur. C'eſt ce dont il étoit facile de juger par le renflement du bout poſtérieur *i b* * du Polype extérieur *a i b*. En effet, ſi

* PL. XIII. Fig. 1.

* Fig. 2.

* *a*.

* Fig. 2,

ſi les alimens s'étoient ſeulement répandus dans le Polype intérieur *c a i d*, il n'y auroit eu de renflé que les portions *c a*, *a i*, & *i d*; & *a i*, entant que portion du Polype extérieur *a i b*, n'auroit même paru enflée, que parce qu'elle contenoit la portion *a i* du Polype intérieur qui étoit cachée ſous celle-là. On voit, dans la Figure 3, les Polypes tels qu'ils étoient quelque tems après que le Polype intérieur eut mangé; & l'on peut facilement remarquer, que la portion *i b*, qui eſt le bout poſtérieur du Polype extérieur, eſt renflée, & remplie d'alimens.

POUR que les alimens aient paſſé du Polype intérieur dans le Polype extérieur, il a fallu que la portion *a i* * du Polype intérieur ſe ſoit ouverte quelque part.

* PL. XIII. Fig. 2 & 3.

LE bout antérieur * du Polype intérieur a changé de place d'une maniére très ſenſible, le 19. Il ne ſortoit plus ce jour-là de la bouche * du Polype extérieur, comme les jours précédens; mais, après avoir fendu les lévres de ce Polype, il s'eſt trouvé ſortir de ſon corps, un peu au-deſſous de la tête. C'eſt ce qui eſt repréſenté dans la Figure 4, où les lettres *c o* déſignent le bout antérieur du Polype intérieur, marqué *c a* dans la Figure 2. La bouche * du Polype extérieur s'étant trouvée dégagée, j'ai eſſaïé de lui donner un Ver. Il l'a avalé; &, après qu'il a été digéré, le ſuc nourricier s'eſt répandu ſenſiblement dans toutes les parties des deux Polypes *. J'ai vu la même choſe le 22, après avoir fait avaler un Ver à la portion *c o*. Les alimens ont auſſi paſſé de cette portion dans les autres. Il n'y avoit donc aucun lieu de douter, que

* Fig. 2. *c a*.

* *a*.

* Fig. 4. *a*.

* Fig. 5. *a i*, *c o*, *i b*, & *i d*.

que le Polype intérieur, dont les portions *c o* & *i d* * faiſoient partie, ne communiquât avec le Polype extérieur *a i b*; c'eſt-à-dire, que le Polype intérieur s'étoit ouvert entre *i* & *o*. Il me ſeroit impoſſible de dire dans quel état étoit la portion du Polype intérieur cachée dans le Polype extérieur, peu après qu'elle s'eſt ouverte: mais, je puis aſſurer, qu'elle s'eſt enſuite confondue avec la portion *a i* * du Polype extérieur, ſans ôſer, cependant, dire comment cela s'eſt fait. J'ai obſervé cette portion *a i* pendant environ trois mois, & de bien des maniéres; & elle m'a toûjours paru telle qu'eſt une portion d'un Polype ordinaire. Les portions *c o* & *i d* du Polype intérieur, étoient comme entées ſur le Polype extérieur *a i b*; elles communiquoient avec lui, comme un jeune Polype communique avec ſa mere. Ces deux Polypes réunis ont crû & multiplié. On en peut juger par la Figure 6, qui les repréſente tels qu'ils étoient le 6 Novembre. Ils produiſoient alors quatre jeunes *, & il s'en étoit déjà ſéparé quelques-uns. La portion antérieure *c o* du Polype intérieur, paroiſſoit plus éloignée de la tête du Polype extérieur, qu'elle n'étoit le 19 Octobre *. J'ai tout lieu de croire, que cela ne vient pas d'un changement de place, mais de ce que la portion *a o* * du Polype extérieur s'eſt allongée. La portion *c o* a communiqué avec la portion *a i* juſqu'au 20 Novembre. Les alimens paſſoient ſenſiblement de l'une dans l'autre. Cette portion *c o* s'eſt enſuite étrecie en *n* *, & c'eſt par-là qu'elle s'eſt ſéparée du reſte, le 24 Décembre; après quoi, elle a fait un Polype à part *, de même que l'autre partie

* Pl. XIII, Fig. 4.

* Fig. 4.

* Fig. 6. *e, e, e, e.*

* Fig. 4.

* Fig. 6.

* Fig. 7.

* Fig. 8. *e.*

* PL. XIII. Fig. 9. des deux Polypes *. Le bout poſtérieur *i d* du Polype intérieur, étoit parfaitement réuni avec le Polype extérieur *a i b*, & il l'étoit encore autant que jamais à la fin de Fevrier 1743, lorsque j'ai cru pouvoir ceſſer de l'obſerver.

On peut juger, par la derniére Expérience que je viens de rapporter, qu'un Polype peut, en quelque maniére, être enté ſur un autre Polype. On a vu du moins que les portions *c o* & *i d* * du Polype intérieur, ont été long-tems unies avec le Polype extérieur *a i b*, comme une branche ou une greffe eſt unie au tronc auquel elle eſt attachée.

* Fig. 6.

Mais, ce n'eſt pas cela ſeulement que j'ai cherché, lorſque j'ai commencé à mettre des Polypes les uns dans les autres. J'ai voulu voir, ſi le Polype intérieur ne s'incorporeroit point avec le Polype extérieur ſans en ſortir, de maniére qu'on pût dire, qu'il l'a doublé, & que de deux Polypes il s'en eſt formé un.

De toutes les Expériences que j'ai faites dans ce but-là, il n'y en a point qui ait mieux répondu à mon attente, que celle que j'ai commencée le 22 Octobre 1742. Le Polype, que j'ai mis ce jour-là dans un autre Polype, n'en eſt jamais ſorti, ni en tout, ni en partie. Je l'avois retourné, avant que de le faire entrer dans l'autre Polype; & j'ai eu ſoin, comme à l'ordinaire, d'embrocher les deux Polypes, après qu'ils ont été mis l'un dans l'autre. Je ne ſaurois dire ce qu'eſt devenu le corps du Polype intérieur; s'il a été diſſous dans l'eſtomac du Polype extérieur, ou s'il s'eſt incorporé avec ce dernier Polype. Mais, je puis aſſurer, que j'ai vu ce corps du Polype intérieur dans

dans le Polype extérieur, pluſieurs jours après qu'il y a été introduit. Par rapport à la tête du Polype intérieur, je ſuis aſſuré, qu'elle s'eſt réunie avec celle du Polype extérieur. Les lévres de ce dernier Polype ſe ſont collées contre le col du premier; &, au bout de quelque tems, les deux têtes de ces Polypes n'en formoient qu'une, qui avoit deux rangs de bras *. J'ai vu très diſtinctement, à diverſes fois que j'ai donné à manger au Polype *c a b* *, qu'il n'avoit qu'une bouche, & que c'étoit celle du Polype intérieur. La bouche de l'extérieur * étoit remplie par la tête du Polype intérieur; ou, plûtôt, elle n'étoit plus une bouche. On ne diſtinguoit plus que les bras qui avoient bordé ſes lévres, & qui formoient alors le ſecond rang de bras *, dont je viens de parler.

* PL. XIII. Fig. 10. *a* & *c*.
* Fig. 10.
* *a*.
* *a*.

J'AI nourri ce Polype, depuis le 22 Octobre 1742, juſqu'au milieu de Fevrier 1743, qu'il eſt mort de maladie. Il a crû & multiplié pendant cet intervalle de tems; & j'ai toûjours pu diſtinguer les deux rangs de bras qu'il avoit à ſa tête.

CE Polype * n'eſt pas un des moins extraordinaires dont nous aions parlé juſqu'à préſent. Il étoit compoſé du Polype extérieur, & du Polype intérieur, ou du moins de ſon bout antérieur, qui auroit pu facilement devenir un Polype parfait. On peut donc aſſurer, qu'il étoit compoſé de deux Polypes: &, cela étant, on peut regarder l'Expérience, dont il s'agit ici, comme l'oppoſé de la premiére que nous avons faite ſur les Polypes. Celle-ci nous a appris, que d'un Polype on pouvoit en faire deux; & celle-là, que de deux Polypes on pouvoit en faire un.

* Fig. 10.

Le hazard m'a appris à réunir des portions de Polypes. J'avois mis dans un petit verre deux morceaux de Polypes, dont je m'étois ſervi pour faire une Expérience. Les aiant examinés le lendemain, je remarquai, qu'ils étoient attachés l'un à l'autre. Je les coupai de nouveau, & je les rapprochai exprès. Ils ſe réunirent encore. Il n'en fallut pas davantage, pour me porter à faire cette Expérience avec attention. Voici comment je m'y prens pour réunir des portions de Polypes.

Après avoir coupé le Polype dont je veux réunir les moitiés, je mets ces moitiés au fond d'un verre plat, dans lequel il n'y a de l'eau qu'à la hauteur de quelques lignes. Je les rapproche l'une de l'autre en les pouſſant avec la pointe d'un pinceau, & je les diſpoſe de maniére que les deux bouts par leſquels elles doivent ſe réunir, ſe touchent, ou peu s'en faut. S'ils ſe touchent, j'obſerve à la loupe s'ils continuent à ſe toucher. S'ils ne ſe touchent pas tout-à-fait, j'examine ſi les moitiés, en s'étendant, ne rapprochent pas ces deux bouts l'un de l'autre juſqu'à ſe rencontrer. Il arrive ſouvent, que les portions de Polype ſe dérangent, & que les extrémités qui doivent ſe toucher, s'éloignent l'une de l'autre. Alors, je les remets avec un pinceau dans la ſituation où elles doivent être. Mais, ſi je vois que leurs bouts continuent à ſe toucher, j'ai grand ſoin de les laiſſer dans un parfait repos. C'eſt, après que les bouts ſe ſont touchés pendant quelque tems, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, que l'on commence à s'appercevoir qu'ils s'attachent. Mais, cela n'arrive pas à tous ceux

ceux qui ſe ſont touchés pendant quelque tems. On trouve ſouvent enſuite qu'ils ſe ſont éloignés l'un de l'autre, ſoit par la contraction, ſoit par le dérangement de la ſituation des portions de Polypes. Il faut dans ce cas remettre ces portions dans la ſituation convenable. Il m'a paru, qu'il étoit bon de les forcer à ſe contracter, avant que de les rapprocher. On oblige par-là les bouts, qui doivent ſe toucher, à s'élargir; & plus ils ſont larges, plus il eſt apparent qu'ils ſe réuniront. C'eſt au moins ce que j'ai lieu de conjecturer. Quoique j'aie ſoin de rapprocher les portions de Polypes d'abord après qu'elles ont été ſéparées, ce n'eſt pas que cela ſoit abſolument néceſſaire pour que l'Expérience réuſſiſſe. J'en ai vu, qui n'ont commencé à ſe réunir que deux heures après que le Polype avoit été coupé. Peut-être que ſi l'on s'obſtinoit à rapprocher toûjours les bouts de portions de Polypes qui s'éloignent, on parviendroit enfin à les faire toutes réunir.

Je n'ai pouſſé à cet égard la patience que juſqu'à un certain dégré. Je n'ai rapproché les portions de Polypes, à meſure qu'elles ſe dérangeoient, que pendant une heure ou deux. En général le ſuccès n'eſt pas ſi fréquent dans cette Expérience, que dans celles dont j'ai parlé juſqu'à préſent.

Les deux portions de Polypes ne ſont d'abord réunies, que par une partie de leur extrémité. Le Polype, qu'elles forment, eſt fort étranglé à l'endroit où la réunion s'eſt faite *. Mais, à meſure qu'on le nourrit, l'étranglement diminue, & diſparoit enfin entiérement.

* PL. XIII. Fig. 12. *c.*

Je ferai mention à préſent en particulier de quelques Polypes, dont j'ai fait réunir les portions, afin que, par le moïen de ces exemples, on puiſſe ſe faire une idée plus nette de la choſe.

J'ai coupé tranſverſalement, le 5 Novembre 1742, à deux heures après midi, un Polype de la ſeconde eſpéce. J'ai rapproché les deux moitiés * de maniére que le bout antérieur de la ſeconde touchoit le bout poſtérieur de la premiére. Il m'a paru peu après qu'elles commençoient à ſe réunir. J'ai vu diſtinctement le ſoir qu'elles étoient attachées l'une à l'autre. Mais, comme je l'ai dit ci-deſſus, le Polype qu'elles formoient, étoit fort étranglé à l'endroit où la réunion s'étoit faite *. J'ai donné un Ver à ce Polype le lendemain. Mon but étoit, non ſeulement de voir s'il mangeroit, mais ſur-tout s'il y avoit une communication entre la premiére & la ſeconde partie. C'eſt ce dont j'ai eu une démonſtration ; car, j'ai vu paſſer une partie du Ver de la moitié antérieure * qui l'avoit avalé, dans la moitié poſtérieure * qui lui étoit réunie. Ces deux parties ont été enſuite renflées *; & l'endroit, par lequel elles étoient réunies, paroiſſoit encore fort étranglé *. Le 15, le Polype a commencé à pouſſer un jeune, & enſuite il en a pouſſé pluſieurs autres. L'étranglement n'étoit plus ſenſible le 20.

* PL. XIII. Fig. 12. *a c & c b.*

* *c.*

* *a c.*

* *c b.*

* Fig. 13. *a c & c b.*

* *c*,

Après être parvenu à réunir des portions d'un même Polype, j'ai entrepris de réunir celles de différens Polypes. J'ai coupé, le 7 Novembre 1742, deux Polypes de la ſeconde eſpéce, & rapproché la premiére partie de l'un de la ſeconde partie de l'autre,

&

& réciproquement. L'Expérience n'a réuſſi que ſur deux de ces parties: c'eſt-à-dire, qu'une premiére moitié d'un Polype s'eſt attachée à une ſeconde moitié d'un autre Polype. Il y avoit ceci de remarquable, que la premiére partie étoit blanchâtre, & la ſeconde d'un brun aſſés foncé. J'ai donné le 7 Novembre même, à onze heures du ſoir, un Ver à ce Polype; & le lendemain, à huit heures du matin, j'ai trouvé que ce Ver étoit entiérement paſſé dans la ſeconde partie. Elle étoit fort renflée, & la premiére ne l'étoit point. J'ai donné à manger à cette premiére partie. L'endroit, par lequel les deux moitiés réunies ſe touchoient, n'a commencé à s'élargir que le 13; & vers la fin du mois, après que le Polype a eu fait quelques repas, l'étranglement ne ſe remarquoit plus, & les deux moitiés avoient une même couleur. Elles étoient brunes. Ce Polype, compoſé des portions de deux differens Polypes, a enſuite multiplié au-deſſus & au-deſſous de l'endroit où les portions ſe ſont réunies, c'eſt-à-dire, que chaque portion a produit des petits. Je l'ai obſervé juſqu'à la fin du mois de Février ſuivant.

J'Ai auſſi eſſaié de faire tenir enſemble des portions de Polypes de différente eſpéce. Je ne puis pas dire que j'aie réuſſi. J'ai ſeulement vu deux morceaux de Polypes, l'un de la ſeconde, & l'autre de la troiſiéme eſpéce, qui ont été un peu attachés enſemble pendant une quinzaine de jours, & qui enſuite ſe ſont ſéparés. Mais, je n'ai pas tenté cette Expérience aſſés ſouvent, ni avec aſſés de ſoin, pour aſſurer qu'elle ne peut pas réuſſir.

Lors-

LORSQUE je fus parvenu à réunir des portions de Polypes, à les greffer en quelque maniére, je fis d'abord part, ſuivant ma coutume, du ſuccès de cette Expérience à Mr. de Reaumur. Ce Fait ne lui étoit pas nouveau. C'eſt ce qu'il a eu la bonté de m'apprendre par une Lettre, dattée le 14 Décembre 1742. „ Aiant jetté, dit-il, des Polypes, coupés en deux, „ les uns ſur les autres dans un verre extrêmement „ cônique, deux morceaux ſe réunirent. C'eſt même „ ce qui me donna l'idée de faire plus en grand ce „ que vous avez exécuté en petit. Je ſongeai à réu- „ nir deux moitiés de deux différentes Orties, cou- „ pées par un plan perpendiculaire à la baſe. Mr. de „ Villars, Médecin à la Rochelle, voulut bien ſe char- „ ger de faire ces opérations. Il a été obligé d'avoir „ recours à la ſuture pour aſſujettir les deux moitiés „ l'une contre l'autre. Quelques-unes de ſes Expé- „ riences lui ont réuſſi; mais, il y en a beaucoup „ plus qui lui ont manqué. Il les continue actuel- „ lement ".

Cet Extrait de Lettre de Mr. de Reaumur confirme, comme on le voit, ce que j'ai dit ſur la réunion des portions de Polypes; mais il nous apprend encore que cette Expérience a auſſi réuſſi ſur des Animaux fort différens.

LA reſſemblance, qui ſe trouve à cet égard entre les Orties de mer, & les Polypes d'eau douce à bras en forme de cornes, peut encore ſervir à nous prouver que les propriétés ſinguliéres que nous avons remarquées à ces derniers Animaux, ſe trouvent auſſi dans d'autres. C'eſt ce que j'ai déjà fait voir par rap-

rapport à la maniére de multiplier des Polypes par rejettons & par bouture *. J'aurois pu encore dans la ſuite de ces Mémoires, à l'occaſion de differens Faits que leur Hiſtoire nous préſente, parler de quelques autres rapports qu'ils ont avec d'autres Animaux, mais je n'ai pas voulu trop interrompre le narré de mes Expériences; & j'ai préféré de renvoyer ici, ce qui me paroit néceſſaire de dire ſur ce ſujet.

* Mém. 3. pag. 209. & ſuiv.

LES Inſectes, dont je viens de donner l'Hiſtoire, doivent le nom de Polype, comme on l'a vu ci-deſſus *, au rapport qu'a leur forme avec celle des Polypes de mer.

* Mém. 1. pag. 49.

Il eſt bien naturel de demander ſi ces Animaux n'ont point entre eux d'autres reſſemblances, & ſurtout, ſi les Polypes marins n'ont point les propriétés ſinguliéres qui ſont actuellement connues dans les Polypes d'eau douce à bras en forme de cornes? Je tacherai de répondre, autant qu'il me ſera poſſible, à ces Queſtions, en rapportant une partie de ce qu'on trouve dans les Auteurs ſur les Polypes de mer.

Ces Polypes ſont de grands Animaux, en comparaiſon de ceux dont il a été queſtion dans ces Mémoires. Il paroit, par ce qu'on en dit, qu'ils ont communément entre un & trois pieds de longueur. Pline parle * d'un monſtrueux Polype, dont les bras avoient, dit-il, trente pieds de long, & qui étoient ſi épais, qu'un homme pouvoit à peine les embraſſer. Je crois qu'il eſt permis de douter d'un pareil Fait.

* Hiſt. Nat. lib. 9. cap. 30.

Les Polypes de mer ſont voraces, & ſe ſervent de leurs bras, comme ceux d'eau douce, pour ſaiſir leur proie & pour la porter à la bouche.

Nous n'avons, à ce que je crois, rien de ſi détaillé, ni de ſi exact, ſur l'anatomie de ces Animaux, que ce qui ſe trouve dans les Oeuvres de Swammerdam *. Cet habile Naturaliſte a anatomiſé la Seche, qui eſt une eſpéce de Polype. On peut voir dans ſa Deſcription, que l'intérieur de cet Animal n'a pas une ſtructure ſi ſimple, que nous paroit être celle des Polypes d'eau douce à bras en forme de cornes.

* Biblia Nat. pag. 875. &c.

Tous les Naturaliſtes diſent unanimement, que les Polypes de mer ſont mâles & fémelles, s'accouplent, & ſont Ovipares *. J'ai vu les œufs de la Seche, ils ſont noirs, & ils ſont attachés pluſieurs enſemble en forme de grape de raiſins. J'ignore ſi les Polypes de mer ont d'autres manières naturelles de multiplier que celle-ci.

* Voi. ſurtout. Ariſt. Hiſt. Animal. lib. 5. cap. 18. Maſſarius in nonum Plin. lib pag. 182. & ſeq. Baſilex 1537.

Ce qui intéreſſe le plus ici, c'eſt de ſavoir ſi l'on ne peut point les multiplier en les coupant. Aldrovande dit *, que le Polype, coupé par morceaux, vit; & je ne ſache pas qu'il y ait rien de plus dans d'autres Auteurs. Il eſt bien apparent, que cela ſignifie ſeulement, que les morceaux d'un Polype donnent encore des marques de vie, mais non, que ce qui manque à chacun d'eux pour être un Animal complet, ſe reproduit au bout de quelque tems. On ne pourra donc ſavoir s'ils ont cette propriété, que lorſqu'on aura coupé ces Polypes, & obſervé de ſuite les portions qui auront été ſéparées.

* Proleg. in lib. de Inſ. pag. 17.

Il eſt cependant parlé de la réproduction de quelques

ques parties des Polypes de mer, qui a certainement lieu dans ceux d'eau douce à bras en forme de cornes. C'eſt celle des bras qu'ils ont perdus en tout ou en partie. Elien dit * que les Polypes de mer mangent leurs propres bras lorſqu'ils manquent d'alimens. D'autres Auteurs * le nient, & aſſurent, que ce ſont les Congres qui les rongent; mais tous conviennent que ces bras recroiſſent.

* Ælian. Hiſt. lib. 1. cap. 17.

* Ariſt. Hiſt. Animal. lib. 8. cap. 2. Plin. Hiſt. Nat. lib. 9. cap. 29.

Je cite ces différens Auteurs; mais, ſans vouloir décider du degré de foi que méritent les Faits qu'ils avancent. Il faudroit, pour le pouvoir, connoitre les Obſervations ſur leſquelles eſt fondé ce qu'ils diſent, & ſavoir comment elles ont été faites. Ce ſont des détails qui ne ſe trouvent dans aucun de ces Auteurs.

J'ai indiqué, dans le troiſiéme Mémoire *, les rapports connus entre les Polypes à bras, en forme de cornes, & ceux à pannache. Il n'eſt pas néceſſaire que je m'y arrête à préſent.

* Pag. 229.

Il y a pluſieurs eſpéces d'autres Animaux, beaucoup plus petits que les Polypes à pannache, & qui paroiſſent devoir être auſſi rangés dans la claſſe des Polypes. Mr. de Reaumur en a trouvé en grande quantité aux environs de Paris, & en Poitou. Il y en a auſſi abondamment, & de pluſieurs eſpéces, dans les foſſés qui ſont autour de la Haye, & dans ceux de Sorgvliet. Tous ces Animaux ont la bouche à une de leurs extrémités; & c'eſt à la même extrémité, que ſont auſſi leurs bras, ou ce qui leur tient lieu de bras. J'en connois quelques eſpéces, qui ſont ſurement voraces. En les obſervant avec

une forte loupe, on voit diſtinctement de petits Animaux qui ſont attirés dans leur bouche. Il ſeroit difficile de bien décrire ces Polypes, ſans le ſecours d'un grand nombre de Figures. Leeuwenhoek en a décrit une eſpéce dans la lettre dont nous avons déjà parlé *. Ils ſont repréſentés fort en grand dans la Planche des Tranſactions Philoſophiques qui a rapport au nombre que je cite en marge. Figure 8. NWV. & ITS.

* Tranſ. Phil. nomb. 283. Art. 4. pag. 1305.

A l'occaſion de ces différentes eſpéces de Polypes, qui peuvent fournir une abondante matiére à découvertes, je ne ſaurois me diſpenſer de dire un mot de celle qu'a faite Mr. Hoghes, Eccléſiaſtique Anglois. Il a vu, dans l'eau d'une grotte de l'Iſle de Barbade, des corps organiſés, qu'il a d'abord pris pour des fleurs, mais qu'il a cru enſuite devoir placer dans la Claſſe des Animaux. Aiant voulu cueillir ces prétendues fleurs, elles ſe ſont d'abord cachées, comme nous avons dit que le faiſoient les Polypes à pannache. Elles ont reparu enſuite au bout de quelques minutes, & ſe ſont développées peu-à-peu. Il paroit, par les Obſervations de Mr. Hoghes, que les eſpéces de raïons, ou plutôt de bras, qui bordent le bout antérieur de ces Animaux, leur ſervent à ſaiſir les petits Animaux qui nagent dans l'eau. On peut voir, dans les Tranſactions Philoſophiques, une plus ample Deſcription de ce qu'il à obſervé ſur ce ſujet. Il convient de remarquer, que Mr. Hoghes n'avoit aucune connoiſſance de ce qui a été découvert en Europe depuis quelques années ſur les Polypes, lorſqu'il a fait les Obſervations dont il s'agit ici, & que

que même les ſiennes ont été faites les premiéres.

J'AI dit ci-deſſus, qu'on ignoroit ſi les Polypes de mer pouvoient ſe multiplier par la ſection: j'ajouterai ici, qu'il ne paroit pas que cette propriété ait été connue dans aucun Animal, au moins par les Naturaliſtes dont il nous reſte quelques Ecrits. Ils ont bien fait mention de divers Animaux, dont les morceaux, après avoir été ſéparés, donnent des marques de vie pendant quelque tems. Ariſtote dit *, que la plupart des Inſectes vivent après qu'ils ont été partagés; mais, il ne dit rien qui puiſſe faire juger qu'il ait obſervé dans les portions de ces Animaux aucune reproduction, au moïen de laquelle chacune ſoit devenue un Animal complet. Il paroit ſeulement, qu'il a remarqué, que les unes vivoient plus long-tems que les autres. Il rapporte, que les Animaux, qui ont le corps long, & beaucoup de pieds, vivent le plus long-tems lorſqu'ils ſont partagés; & que les parties marchent, après qu'elles ont été ſeparées, l'une en avant, & l'autre en arriére. Il cite, à cette occaſion, l'exemple des Scolopendres. C'eſt ce que St. Auguſtin rapporte * auſſi d'un Animal de ce genre, c'eſt-à-dire, d'une eſpéce de Mille-pieds. Celui, qu'il a vu, fut même coupé en pluſieurs parties, & *chacune*, dit-il, *ſe mouvoit de maniére, que ſi nous ne les avions pas ſéparées nous-mêmes, & ſi les bleſſures n'euſſent pas été viſibles, nous les aurions priſes pour tout autant d'Animaux différens.*

* Hiſt. Animal. lib. 4. cap. 7.

* Lib. de quantitate Animæ.

IL ne paroit donc pas, qu'on ait fait des Expériences, pour voir ce que deviendroient les morceaux d'Animaux en qui il reſte du mouvement, après

qu'ils ont été ſéparés. Mais, il eſt certain, qu'en divers endroits, on a cru, que les morceaux de tels ou tels Animaux reſtoient en vie, & même devenoient des Animaux parfaits. Ces idées, à la vérité, n'ont guères paſſé que pour des préjugés du vulgaire. On a vu, dans la Préface du Tome 6me. des Mémoires de Mr. de Reaumur ſur les Inſectes *, ce que des Pêcheurs de Normandie avoient remarqué à l'égard des Etoiles de mer, & nous rapporterons bientôt ce que des Païſans de Suéde ont dit d'un autre Animal aquatique, & quel jugement on a porté de leur opinion.

* Pag. 61 & 62.

On a vu ci-deſſus, que des morceaux des Polypes dont il a été queſtion dans ces Mémoires, étant rapprochés les uns des autres, pouvoient ſe réjoindre, & former un ſeul Animal. C'eſt ce que Jean Baptiſte Porta dit * des Léſards. Il paroit, qu'il a tiré ce paſſage d'Elien *, qui dit la même choſe des Léſards & des Serpens. Cette propriété eſt encore actuellement attribuée aſſés généralement à ces mêmes Animaux. Je ne ſaurois dire ſi cette opinion eſt fondée ſur des Obſervations, ou ſur des conjectures. Il n'y a au fond, dans le Fait dont il s'agit ici, rien à quoi on n'ait pu être préparé par la connoiſſance que nous avions d'autres propriétés fort communes aux Animaux. L'Expérience a appris, en bien des occaſions, que les parties des Animaux pouvoient, lorſqu'elles ſe touchoient, s'attacher & ſe réünir auſſi facilement que le font celles des Plantes. C'eſt ce que les Médecins & les Chirurgiens ont éprouvé bien des fois à l'égard du corps humain; & c'eſt qui oblige à prendre des précautions dans les cas où l'on veut empê-

* Phytognomonica. lib. v. cap. 12. Edit. Francof.

* Ælian. Hiſt. lib. 2. cap. 23.

pêcher qu'une pareille réünion ne ſe faſſe. Il n'eſt donc pas étonnant, que la même propriété ait lieu dans des Inſectes: & s'ils ſont de ceux, je ne dis pas ſeulement dont chaque portion ſéparée peut devenir un Animal complet, &c. mais même de ceux dont les morceaux conſervent ſimplement de la vie pendant quelque tems après leur ſéparation; s'ils ſont, dis-je, de ces Inſectes, on n'a pas lieu d'être ſurpris, & que les morceaux de ces Animaux ſe réüniſſent, & qu'ils forment enſuite un Animal.

J'AI déjà dit ci-deſſus, que les Anciens faiſoient mention de la reproduction des bras des Polypes de mer: j'ajouterai ici, qu'ils parlent encore d'une reproduction qui ſe fait dans d'autres Animaux, ſavoir celle de la queuë des Léſards & des Serpens. Ariſtote * & Pline † aſſurent, qu'elle recroît. C'eſt ce qui eſt encore admis aſſés généralement à préſent par rapport aux Léſards. Mais, ſi l'on veut connoitre des Faits, bien prouvés & bien détaillés, ſur la reproduction de quelques parties de certains Animaux, il faut lire le beau Mémoire de Mr. de Reaumur, qui renferme les découvertes qu'il a faites à cet égard ſur les Ecreviſſes *.

* Hiſt. Animal. lib. 2. cap. 17.

† Hiſt. Nat. lib. 9. cap. 29.

* Mém. de l'Acad. pour l'année 1712. pag. 226.

LES Polypes, qui ont fait le ſujet de ces Mémoires, aiant d'abord été principalement connus par la propriété qu'ils ont de pouvoir être multipliés par la ſection, il n'eſt pas étonnant qu'on ait été porté à les regarder comme des Plantes, puiſque cette propriété

priété n'étoit connue juſqu'alors que dans des Plantes. On ne pourroit que ſe confirmer de plus en plus dans cette idée, ſi on les conſidéroit enſuite par rapport à d'autres propriétés que nous avons fait connoitre. En effet, qui ne croiroit que ces Polypes ſont des Plantes, & non des Animaux, ſi, après avoir appris qu'ils peuvent être multipliés par bouture, on entendoit dire qu'ils multiplient naturellement par rejettons, & qu'ils peuvent être greffés? On ne feroit, en les regardant comme Plantes, que ſuivre des régles généralement reçues ſur la nature des Plantes & des Animaux. Mais, à la vérité, en ſuivant ces mêmes régles, on ne pourroit non plus diſconvenir que ces Polypes ne ſoient des Animaux, quand on obſerveroit leur mouvement progreſſif, & ſur-tout, quand on leur verroit ſaiſir des Inſectes, les porter à la bouche avec leurs bras, les avaler, & les digérer.

MAIS, quelle idée devroit-on ſe faire des Polypes, ſi l'on ne conſultoit que les régles formées ſur les propriétés, connues juſqu'à préſent dans les Plantes & dans les Animaux; quelle idée, dis-je, devroit-on s'en faire, en penſant à la propriété qu'ils ont de pouvoir être retournés ſans périr, & même ſans qu'il ſe faſſe en eux aucune altération ſenſible? Comme cette propriété, n'eſt, ſi je ne me trompe, connue dans aucune Plante, ni dans aucun Animal, il faudroit donc conclure, qu'à cet égard, les Polypes ne ſont, ni Plante, ni Animal.

SI donc on s'en tenoit ſcrupuleuſement aux idées qu'on s'eſt faites aſſés généralement ſur la nature des Plantes & des Animaux, il s'enſuivroit, qu'un Polype,

pe, vu les différentes propriétés qu'il renferme, ſeroit en même tems Plante & Animal, & ne ſeroit ni Animal, ni Plante.

On peut juger par-là combien ſont peu ſûres ces régles prétendues générales, dont il eſt queſtion. Indépendamment de la preuve que les Polypes nous en fourniſſent, il eſt facile de ſentir, que les Plantes & les Animaux ne nous ſont pas aſſés connus, pour que nous puiſſions faire des régles générales ſur leur nature. Je m'explique à l'égard des Animaux.

Quand je dis, qu'ils ne nous ſont pas aſſez connus, j'entends que nous n'en connoiſſons pas un aſſés grand nombre; & que ceux, qui nous ſont connus, ne le ſont pas aſſés.

Je crois pouvoir poſer ici pour principe, ſans rien hazarder, qu'il y a des Animaux inconnus: & je demande enſuite, ſi nous pouvons faire des régles générales qui ſe rapportent à ces Animaux inconnus? Pour le pouvoir, il faudroit être aſſuré, qu'il y a un parfait rapport entre les Animaux inconnus, & ceux qui nous ſont connus. C'eſt ce qu'on ne ſauroit prouver, &, au contraire, la diverſité des propriétés, qui ſe trouvent dans les Animaux connus, ſemble donner lieu d'inférer que les Animaux inconnus en ont, dont nous n'avons encore aucune idée.

Je ſuppoſe qu'on n'eût d'abord connu que les Animaux qui ne ſont ſujets à aucune transformation, auroit-on eu raiſon de dire, que les Animaux en général ne pouvoient point paſſer par différens états? Et auroit-on pu, fondé ſur cette régle, lorſ-

qu'on auroit commencé à connoitre quelques corps organiſés ſujets à des transformations; auroit-on pu, dis-je, décider qu'ils n'étoient pas des Animaux, parce qu'ils ſe transformoient?

POURQUOI ne ſe trouveroit-il pas entre les Animaux que nous connoiſſons, & les Animaux inconnus, des différences auſſi grandes, & même plus grandes que celles qu'il y a entre les Animaux qui ſe transforment, & ceux qui ne ſe transforment point?

IL eſt d'autant plus raiſonnable de ne pas juger d'une maniére abſolue, des Animaux inconnus par les Animaux connus, que le nombre des premiers l'emporte, ſelon toutes les apparences, beaucoup ſur celui des derniers.

NON SEULEMENT on ne peut pas faire des régles générales, qui ſe rapportent aux Animaux inconnus, mais on eſt encore fort éloigné d'en pouvoir faire de ſûres à l'égard des Animaux connus. La raiſon en eſt, que la plûpart de ces derniers ne ſont connus que très ſuperficiellement; & que ce ſeroit auſſi précipiter ſon jugement, que de juger en tout ou en partie des Animaux moins connus, par ceux qui le ſont davantage.

DES Expériences, qu'on a tous les jours occaſion de réïtérer, nous apprennent clairement, qu'un grand nombre d'Animaux, de quadrupédes, par exemple, ne peuvent pas être multipliés par la ſection. Quand on les partage, chaque partie meurt. Au-lieu de conclure ſeulement de ces Expériences, que les portions de tels & tels Animaux ne

ne pouvoient pas devenir des Animaux parfaits; & que, ſelon toutes les apparences, il en étoit de même de celles de pluſieurs autres qu'on n'a pas coupés: au-lieu, dis-je, de s'en tenir à cette conſéquence particuliére, on a fait une régle générale, & on a ſuppoſé, qu'on ne pouvoit multiplier aucun Animal, en le coupant. Cependant, il ſe trouve que pluſieurs Animaux connus, & entre autres les Vers de terre, qu'on a très ſouvent occaſion de voir, ont cette propriété qui paroiſſoit incompatible avec la nature d'un Animal.

COMBIEN n'y a-t-il, peut-être, pas d'Animaux, que l'on croit bien connoitre, qui ont des propriétés auſſi extraordinaires que celle-là, & qu'on ne s'attendroit guères à y trouver?

IL ſeroit facile de prouver également, que nous ne connoiſſons pas aſſés les Plantes, pour pouvoir faire des régles générales ſur leur nature.

PUISQUE nous ſommes encore éloignés de connoitre toutes les propriétés dont les Plantes & les Animaux ſont ſuſceptibles, il n'eſt pas étonnant, que celles, qui ſervent de caractére diſtinctif à chacune de ces claſſes de corps organiſés, ne ſoient pas fort bien connues.

IL ſemble d'abord, quand on n'a pas taché d'approfondir la nature des Plantes & des Animaux, qu'il n'y a rien de plus aiſé, que de trouver les caractéres qui diſtinguent les uns des autres. Cela vient, ſi je ne me trompe, de ce qu'on ne juge que ſur des idées particuliéres, au-lieu qu'il s'agit de comparer des idées générales, ſavoir l'idée abſtrai-

te d'une Plante avec l'idée abſtraite d'un Animal.

Il eſt très facile de diſtinguer un Cheval d'un Chêne, & l'on s'accoutume à penſer qu'il n'eſt pas plus difficile de diſtinguer un Animal d'une Plante. Ce ſont cependant deux choſes bien différentes. Il ſuffit, pour en juger, d'eſſaïer de ſéparer de l'idée d'un Cheval & de celle d'un Chêne, toutes celles qui ſont particuliéres à cette eſpéce d'Animal & à cette eſpéce de Plante, & de ne garder que celles qui ſont communes à tous les Animaux connus & à toutes les Plantes connues. Plus les idées qu'on ſe formera, ſeront générales, & plus celles des propriétés particuliéres qui ſervoient à diſtinguer un Cheval d'un Chêne, diſparoitront : & plus on approchera de l'idée générale d'un Animal & de celle d'une Plante, moins on trouvera de différences entre elles.

Aussi les Naturaliſtes, qui ſe ſont appliqués à découvrir les caractéres diſtinctifs des Plantes & des Animaux, ont-ils rencontré de grandes difficultés. Ils ont trouvé très difficile, une choſe qui paroit très facile à ceux qui n'ont pas étudié la matiére.

On ne peut guères citer à cette occaſion d'Autorité plus reſpectable que celle du célèbre Boerhave. Combien ce grand homme n'avoit-il pas travaillé à étudier les Plantes, & les Animaux? Cependant, il paroît qu'il n'a trouvé qu'une ſeule différence générale & eſſentielle entre ces deux Claſſes de corps organiſés. C'eſt ce qu'on peut voir au commencement de ſa *Chymie*, dans les articles où il traite des Plantes & des Animaux *. Cette différence conſiſte dans la maniére dont les Plantes & les Animaux ti-

* Pag. 57 & ſuiv. Edit. de Leyde 1732.

tirent leurs alimens. *Les alimens des Plantes*, dit Mr. Boerhave *, *ſont tirés par des racines extérieures, & ceux des Animaux par des racines intérieures. Cette partie extérieure, appellée racine, qui tire les alimens du corps dans lequel elle eſt placée, diſtingue aſſés une Plante de tout Animal connu juſqu'à préſent* *. Et, dans la définition qu'il donne du corps d'un Animal, il dit, *qu'il a en dedans des vaiſſeaux, en guiſe de racines, par leſquels il tire la matiére des alimens* *. Enſuite, après avoir encore inſiſté ſur la comparaiſon d'une Plante & d'un Animal, il ajoute: *c'eſt en cela, que conſiſte le rapport & la différence qu'il y a entre un Végétable & un Animal* *.

* pag. 64.

* pag. 57.

* pag. 64.

* pag. 65.

Il n'eſt pas inutile de faire remarquer, que Mr. Boerhave ne décide cependant point, que la différence, dont il s'agit, ſe trouve abſolument entre toutes les Plantes & tous les Animaux. Il ſe tient dans la réſerve, & dit ſeulement, que *cette partie extérieure, appellée racine, qui tire les alimens du corps dans lequel elle eſt placée, diſtingue aſſés une Plante de tout Animal*, connu juſqu'à préſent.

Ce que nous avons dit dans le ſecond Mémoire, de la maniére dont les Polypes ſe nourriſſent, prouve qu'ils ſont des Animaux, ſuivant la définition de Mr. Boerhave. Indépendamment de l'Autorité de cet habile homme, je doute qu'il y ait beaucoup de perſonnes qui ne les regardent en effet comme tels.

Mais, ce ſont des Animaux, qui ont plus de rapports particuliers avec certaines Plantes, que quantité d'autres Animaux que nous connoiſſons.

C'EST ce qui pourroit, peut-être, déterminer à les appeller des Animaux-Plantes. Mais, je ne ſais ſi l'on peut leur donner ce nom, autrement que par maniére de parler, parce qu'il me paroit, qu'on a moins de raiſons de prendre les Polypes d'une maniére abſolue pour des Animaux-Plantes, que pour de ſimples Animaux. Afin de pouvoir décider, que tel corps organiſé, n'eſt ni Plante, ni Animal, mais doit être placé dans une claſſe mitoïenne entre les Animaux & les Plantes; afin, dis-je, de le pouvoir décider, il faudroit connoitre préciſément toutes les propriétés dont les Plantes & les Animaux ſont ſuſceptibles. Nous avons vu ci-deſſus, que nous étions fort éloignés de cette connoiſſance. Ce n'eſt que lorſqu'on y ſera parvenu, qu'on pourra faire d'autres claſſes de corps organiſés. En attendant, il eſt beaucoup plus naturel de regarder les Polypes, & divers autres corps organiſés qui ont reçu le nom de Zoophites, comme des Animaux qui ont plus de rapports remarquables avec les Plantes, que d'autres.

NOUS n'avons pas cru devoir entreprendre d'expliquer, en tout, ni en partie, les Faits ſinguliers que nous avons rapportés. Il eſt trop dangereux, en fait d'Hiſtoire Naturelle, d'abandonner l'Expérience, pour ſe laiſſer conduire à l'imagination. On riſque de n'arriver, en ſuivant cette route, qu'à des Hypothèſes peu ſûres, & qui peuvent devenir nuiſibles aux progrès de cette Science, ſi on a le malheur de ſe prévenir pour elles. Au-lieu d'éclaircir les Faits par de nouvelles Expériences, on a recours

cours à une Hypothéſe, diſons à un préjugé, qui diſpenſe de la peine d'obſerver, mais qui ne ſert ſouvent qu'à multiplier nos erreurs.

C'EST ainſi, par exemple, qu'on a cru, pendant tant de Siécles, qu'un grand nombre d'Animaux venoient de la corruption des corps, dans leſquels, ou ſur leſquels on les trouvoit. C'eſt l'origine qu'on a attribuée à tous les Inſectes dont on ne connoiſſoit pas la maniére de multiplier. Non qu'on ne pût s'en inſtruire, même avec une attention médiocre; mais, le préjugé a aveuglé, & empêché qu'on ne penſât à examiner. Dès qu'on s'eſt défié de ce préjugé, & qu'on a obſervé, on a vu ces Animaux faire des œufs, ou des petits, comme tant d'autres. Ces Faits, que des Philoſophes n'ont pu voir, ou plutôt, que le préjugé ne leur a pas permis de chercher, ou de voir, peut-être, quand ils étoient ſous leurs yeux; ces Faits, dis-je, peuvent être découverts par des Enfans qui ſe ſont amuſés pendant quelque tems à obſerver des Inſectes. C'eſt ce dont j'ai eu le plaiſir de faire l'expérience il y a peu de tems.

IL eſt bien vraiſemblable, que, ſans pluſieurs préjugés qu'on s'eſt faits, l'Hiſtoire Naturelle ſeroit plus avancée qu'elle ne l'eſt: & il eſt ſur-tout fort apparent, que ſi l'on n'avoit pas ſuppoſé, que les Animaux ne pouvoient point multiplier par la ſection, on connoitroit déjà depuis long-tems cette propriété à pluſieurs. Tout en effet paroiſſoit inviter à faire cette découverte. On avoit vu & admiré depuis long-tems, que divers Animaux très

con-

connus ne mouroient pas d'abord après qu'ils avoient été partagés en deux, ou en pluſieurs parties. On avoit remarqué dans ces parties de la vie & de l'action. Pourquoi n'a-t-on pas penſé à les conſerver, & à les obſerver, pour voir s'il ne ſe feroit point, en chacune d'elles, une reproduction de ce qui leur manquoit pour être un Animal parfait? C'eſt qu'on a ſuppoſé, que cela étoit impoſſible.

Mr. Linnéus, Profeſſeur en Botanique à Upſal, en rapporte un exemple dans un Programme qui eſt imprimé à la tête d'un Diſcours qu'il a fait en 1743. Il dit, que des Païſans de la Province de Smaland, & d'autres endroits, aſſurent unanimement touchant le Ver, qu'il appelle *Gordius*, que ſi on le coupe en un grand nombre de parties, chaque morceau conſerve ſon mouvement, & reprend une tête, un corps, ou une queuë, quand on le remet dans l'eau. Mr. Linnéus ajoute enſuite, que les Naturaliſtes, aveuglés par les principes qu'ils avoient adoptés, ont regardé ce qu'on diſoit de ce Ver, comme une fable ſi ridicule, & ſi contraire à la Nature, qu'ils n'ont pas même fait une ſeule Expérience pour le vérifier.

Il eſt à remarquer, que ce ne ſont que des gens groſſiers, & qui ne pouvoient pas être imbus des préjugés de l'Ecole, qui ont cru tout uniment, ſur les Faits qu'ils ont vus, que des portions d'Animaux devenoient des Animaux complets.

L'idée, dans laquelle on a été, qu'aucun Animal ne pouvoit être multiplié par bouture, ne paroit propre qu'à faire perdre les occaſions de découcou-

couvrir la propriété qu'on a trouvée aux Polypes, lorſqu'on les a coupés. Cependant, il eſt arrivé, par un hazard aſſés ſingulier, que cette idée a beaucoup contribué à cette découverte: car je n'ai entrepris l'Expérience dont elle a été une ſuite, que parceque j'ai ſuppoſé que les morceaux d'un Animal ne pouvoient pas devenir des Animaux complets. C'eſt ce qu'on peut voir au commencement du premier Mémoire *.

* Pag. 7. & ſuiv.

Dès qu'on a ſçu, que les Polypes pouvoient être multipliés par la ſection, on eſt revenu du préjugé dans lequel on a été ſi long-tems à cet égard ſur la nature des Animaux. On a eſſaïé d'en couper de differentes eſpéces, on en a obſervé les morceaux; &, en peu de tems, comme je l'ai dit ci-deſſus *, on a trouvé pluſieurs Animaux qui avoient la même propriété que les Polypes.

* Mém. 1. pag. 4.

Il y a lieu de ſe flatter, que ces découvertes produiront pluſieurs bons effets. Elles doivent naturellement nous jetter dans une grande défiance à l'égard de ces régles générales, auxquelles, ſi je puis parler ainſi, on a prétendu borner la Nature, & qui ne peuvent ſervir qu'à mettre obſtacle à nos connoiſſances. Elles doivent contribuer à nous faire penſer, que ce que nous connoiſſons, n'eſt que très peu de choſe, en comparaiſon du nombre prodigieux de merveilles que renferme la Nature: que nous connoiſſons encore trop peu de Parties de ce Tout admirable, qui eſt l'Ouvrage d'un Etre infini à tous égards; que nous en connoiſſons, dis-je,

trop peu de Parties pour être en état d'expliquer tous les Faits qui ſe préſentent à nous.

Nous devons, afin d'étendre nos connoiſſances ſur l'Hiſtoire Naturelle, faire nos efforts, pour découvrir le plus de Faits qu'il nous ſera poſſible. Si nous connoiſſions tous les Faits que la Nature renferme, nous en aurions l'Explication, nous verrions le Tout qu'ils forment enſemble. Plus nous en connoitrons, plus nous ſerons en état d'approfondir quelques Parties de ce Tout. Nous ne pouvons donc mieux travailler à expliquer les Faits que nous connoiſſons, qu'en tâchant d'en découvrir de nouveaux. La Nature doit être expliquée par la Nature, & non par nos propres vûes, qui ſont trop bornées pour enviſager un ſi grand Objet dans toute ſon étendue. La beauté de la Nature paroit certainement davantage, quand ce que nous en connoiſſons, n'eſt pas mêlé avec nos Imaginations. Elle nous donne alors des idées plus dignes de la ſageſſe infinie de ſon Auteur, & par cela même plus propres à former l'eſprit & le cœur. C'eſt ce que nous devons nous propoſer dans toutes nos Recherches.

EX-

EXPLICATION

DES FIGURES

DU QUATRIÉME MÉMOIRE.

PLANCHE XI.

LES Figures 1 & 2, repréſentent les moitiés *a c*, *c b* d'un Polype de la ſeconde eſpéce, qui a été coupé en deux. La Figure 1, eſt celle de la premiére partie. *a*, la tête du Polype. *c*, l'endroit où il a été coupé. Ce bout *c*, paroit ſouvent ouvert, peu après la ſection. La Figure 2, repréſente la ſeconde partie, dont le bout antérieur *c* eſt ouvert.

ON voit auſſi dans la Figure 3, une ſeconde partie *c b*, mais dont le bout antérieur *c* eſt fermé, & un peu renflé.

LA Figure 4, eſt celle d'une ſeconde partie *c b*. Les bras commencent à paroitre au bout antérieur *c*.

LA Figure 5, repréſente les lévres d'un Polype, qui ont été ſéparées, avec des ciſeaux, du reſte du corps. De ces lévres ſortent les bras du Polype.

LA Figure 6, eſt celle d'une partie des lévres d'un Polype, dont ſortent deux bras.

LA Figure 7, repréſente la moitié *a e i b*, d'un Polype qui a été coupé ſuivant ſa longueur. Cette partie ne s'eſt pas encore fermée. On voit ſa ſuperficie intérieure. Cette moitié de Polype a quatre bras à ſon extrémité antérieure *a e*.

LA Figure 8, repréſente une moitié d'un Polype coupé ſuivant ſa longueur, & telle que de pareilles moitiés ſont ſouvent, peu après la ſection. Elles ſe roulent ſur elles-mêmes, en commençant par une de leurs extrémités. Celle qui eſt repréſentée ici, a commencé par ſon bout antérieur. Les bras ſont en dedans du rouleau.

LA Figure 9, repréſente auſſi une moitié *a e b i*, d'un Polype coupé ſuivant ſa longueur, dont les bords *a i*, *e b*, ont commencé à ſe rapprocher & à ſe réunir par le bout poſtérieur *i b*, & ſont déjà réunis juſqu'en *c*. On ne diſtingue aucune cicatrice à l'endroit où ces bords ſe ſont réunis.

LA Figure 10, eſt celle de la même moitié, qui eſt repréſentée dans la Fig. 9, mais dont les bords ſont entiérement réunis. Cette moitié peut dans cet état être déjà regardée comme un Polype entier. On voit deux nouveaux bras, qui commencent à pouſſer dans les intervalles que les vieux laiſſent entre eux.

LA

LA Figure 11, eſt celle d'une Hydre à ſept têtes.

ON voit, dans la Figure 12, un Polype *a b*, fort contracté & fort renflé, & tel qu'il paroit lorſqu'on le met ſur la main hors de l'eau, pour le retourner. *c* & *e*, les extrémités d'un Ver de Tipule qui ſort de la bouche en double, & qui la tient fort ouverte. *b d*, la ſoie de ſanglier dont on ſe ſert pour retourner le Polype, placée de maniére qu'une de ſes extrémités *b* touche le bout poſtérieur *b* du Polype. C'eſt, lorſque la ſoie de ſanglier eſt diſpoſée de cette maniére, que l'on commence à pouſſer le bout *b* du Polype, pour le faire rentrer en dedans, en le retournant.

ON voit, dans la Figure 13, un Polype *a b* retourné, placé au bout de la ſoie de ſanglier *b d*, tel qu'il s'y trouve d'abord après que l'opération eſt achevée.

LA Figure 14, repréſente auſſi un Polype *c a b*, au bout d'une ſoie de ſanglier *b d*; mais celui-ci n'eſt pas entiérement retourné. La portion poſtérieure *a b*, aiant été pouſſée en dedans par la ſoie de ſanglier, s'eſt retournée, & eſt ſortie dans cet état par la bouche *a*, & la portion antérieure *a c* eſt reſtée non-retournée.

LA Figure 15, eſt celle d'un Polype retourné *a b*, tel que ſont ordinairement ceux ſur leſquels on a fait cette opération, peu après qu'on leur a fait

quitter la ſoie de ſanglier, au bout de laquelle ils ſe trouvoient. Leurs lévres rentrent d'abord en dedans, & les bras ſe trouvent réunis comme en un faiſceau, plus ou moins ſerrés, & paroiſſent ſortir du milieu du bout antérieur du Polype.

LA Figure 16, repréſente un Polype retourné *a b*, embroché près de la tête *a*, à une ſoie de ſanglier *c d*, noüée en *n*, & placée dans un verre, de maniére qu'elle ne le touche que par ſes extrémités, ſçavoir l'extrémité *d*, le bord *f h*, & l'extrémité *c*, le fond *e g*. Le nœud *n*, eſt en deſſous du Polype *a b*, afin que s'il gliſſe de *a* en *n*, il ſoit arrêté par ce nœud *n*, & ne ſe déſembroche pas, en gliſſant juſqu'en *c*.

LA Figure 17, repréſente un Polype *c a b*, déretourné en partie. C'eſt-à-dire, qu'après avoir été entiérement retourné, comme *a b* Fig. 15, ſes lévres ſe ſont renverſées en dehors, & enſuite toute la portion antérieure *a c*. *a*, bouche du Polype, avant qu'il fût déretourné en partie. *a c*, bourelet, ou portion déretournée. *a b*, portion viſible de ce qui eſt reſté retourné. Les bras de ce Polype ſont dirigés vers le bout poſtérieur *b*.

CEUX du Polype de la Figure 18, qui repréſente auſſi un Polype déretourné *c a b*, ſont recourbés vers *c*, qui eſt le nouveau bout antérieur de ce Polype.

LA

La Figure 19, repréſente le même Polype que la Fig. 17, après que la portion déretournée *a c*, qui ſe trouve dans cette derniére Figure bout à bout avec la portion non-déretournée *a b*, s'eſt inclinée & diſpoſée enfin de maniére qu'elle a formé, avec la portion *a b* Fig. 19, un angle droit *c o b*. *a d*, *a d*, anciens bras. *a n*, partie des anciennes lévres du Polype, dont ſort une partie des anciens bras. *a o*, nouveaux bras qui commencent à pouſſer. *a o n*, nouvelle bouche, bordée d'un côté, *a n*, par les anciens bras, & de l'autre *a o*, par les nouveaux. *o b*, portion retournée. *e*, corps dont je ne connois pas l'origine.

La Figure 20, repréſente le même Polype que la Figure 19, mais il eſt un jour plus vieux. *a c*, portion déretournée. *a b*, portion retournée. *e*, corps équivoque. *a*, bouche, marquée *a o n* dans la Figure précédente. *a d*, *a d*, anciens bras. *a i*, nouveaux bras.

Le même Polype ſe voit dans la Figure 21, mais, après avoir mangé, crû, & changé de forme d'une maniére aſſez ſenſible. *a c*, portion déretournée. *a b*, portion retournée. *e*, corps équivoque. De *a* en *i* on voit le reſte des anciens bras, ceux qui n'ont pas ſervi à border la nouvelle bouche *a*, qui s'eſt formée.

On voit encore le même Polype dans la Figure 22, mais plus grand, & plus vieux. *a c*, portion dé-

déretournée. *a b*, portion retournée. *e*, corps équivoque. *u*, bouche qui s'eſt formée, ſans que je m'en ſois apperçu. *a*, bouche marquée *a o n* dans la Fig. 19.

La Figure 23 eſt encore celle du même Polype, mais il eſt dans une attitude fort differente de celle qui eſt repréſentée dans les deux précédentes Figures, & il a pluſieurs jeunes. *a c*, portion déretournée. *a b*, portion retournée. *e*, corps équivoque, dont ſont ſortis deux jeunes Polypes côniques. *k*, autre Polype cônique, qui eſt ſorti de la portion *a c*. *a*, bouche marquée *a o n* dans la Figure 19. *u*, bouche, marquée *u* dans la Figure 22.

Planche XII.

La Figure 1 repréſente un Polype déretourné en partie. *a c*, portion déretournée. *a b*, partie poſtérieure du Polype qui eſt reſtée retournée. *e i*, jeune qui s'eſt trouvé dans l'eſtomac du Polype d'abord après qu'il a été retourné, mais qui en eſt ſorti par l'ouverture faite à la peau de la mere en coupant un autre jeune qui ſortoit auſſi de ſon corps.

On voit, dans la Figure 2, le même Polype qui eſt repréſenté dans la premiére, mais après qu'il s'eſt fait en lui un changement aſſez conſiderable. *a c*, portion déretournée. *e b*, portion qui eſt reſtée retournée. *e i*, jeune qui eſt enté ſur la portion retournée *e b*.

La

La Figure 3, repréſente le même Polype, tel qu'il étoit quatre jours après avoir été tel qu'il eſt repréſenté dans la Figure précédente. *a c*, portion déretournée, ſur le côté de laquelle on voit une partie des bras qu'avoit le Polype, avant que d'avoir été retourné. *e b*, portion retournée. *e i*, jeune.

La Figure 4, repréſente un Polype, déretourné en partie. *a b*, portion poſtérieure du Polype qui eſt reſtée retournée. *a d c g e*, portion déretournée, dans laquelle il s'eſt fait déjà un changement conſidérable; il s'eſt formé trois têtes *d*, *g*, *e*.

La Figure 5, repréſente le même Polype de la Figure 4, mais plus vieux de 14 jours. *a b*, portion qui eſt reſtée retournée. *a d c n g e o*, portion déretournée. *a d*, *n g*, *n e*, les trois têtes avec leurs cols; elles ſont marquées *d*, *g*, *e* dans la Figure précédente.

La Figure 6, eſt celle du même Polype, tel qu'il étoit 13 jours après avoir été dans l'état repréſenté dans la Figure 5. La portion *o c* de cette Figure 5 s'eſt partagée de *o* en *c*, & les deux portions *b a c d o* & *c n g e o* Figure 6, n'ont plus été attachées l'une à l'autre, que par un petit appendice *o*. *a b*, portion qui eſt reſtée retournée. *a c*, *o c*, deux portions, qui dans la Figure précédente ſont marquées réunies en *o c*. *a d*, *n g*, *n e*, les trois têtes avec un col, marquées dans la Figure 5, par les mêmes lettres.

Les deux portions, qui ne tiennent dans la Figure 6, que par l'appendice *o*, ſont vues ſéparées dans les Figures 7 & 8. *a b* Figure 7, portion retournée. *a d*, une des têtes. *n g*, *n e* Figure 8, les deux autres têtes.

La Figure 9, repréſente deux Polypes, dont l'un eſt mis dans l'autre. *a b*, Polype extérieur. *c a b d*, Polype intérieur. *n f*, ſoie de porc, qui tranſperce en *e* ces deux Polypes.

La Figure 10, eſt celle des mêmes Polypes. *a i b*, Polype extérieur. *c a i d*, Polype intérieur, dont la portion *i d* a fendu celle *i b* du Polype extérieur, & en eſt ſortie par ce moïen. *n f*, ſoie de, ſanglier qui tranſperce ces deux Polypes.

On voit, dans la Figure 11, les mêmes Polypes, mais la portion *i d* du Polype intérieur a fendu davantage la portion *i b* du Polype extérieur, & en eſt ſortie juſques au-delà de l'endroit *e*, où entroit la ſoie de porc *n f*, qui tranſperçoit d'abord les deux Polypes enſemble, mais qui, lorſqu'ils étoient dans l'état repréſenté dans cette Figure, tranſperçoit d'abord l'intérieur, & enſuite l'extérieur. *a i b*, Polype extérieur. *c a i d*, Polype intérieur. *n f*, ſoie de ſanglier qui tranſperce ces deux Polypes.

La Figure 12, repréſente les deux Polypes, après que l'intérieur, aiant fendu les lévres de l'ex-

té-

térieur, a achevé de ſortir de ce Polype. *a e b*, Polype extérieur. *c e d* Polype intérieur. *n f*, ſoie de porc qui les tranſperce.

La Figure 13, repréſente deux autres Polypes, mis l'un dans l'autre. *a b*, Polype extérieur. *b d*, extrémité poſtérieure du Polype intérieur. Tout le reſte de ſon corps eſt caché dans celui du Polype extérieur, excepté cinq bras *a o*, *a o*, *a o*, *a o*, *a o*, qui ſortent par la bouche *a* de ce dernier. *n f*, ſoie de ſanglier, qui tranſperce les deux Polypes.

La Figure 14, repréſente les mêmes Polypes. *t e d*, Polype intérieur. *t o*, *t o*, *t o*, *t o*, *t o*, bras du Polype intérieur, qui ſont ſortis par une ouverture qui étoit en *t*. *n f*, ſoie de porc, qui tranſperce ces Polypes.

La Figure 15, eſt encore celle des deux Polypes de la Figure 13. *a t b*, Polype extérieur. *t e d*, Polype intérieur. *t o*, *t o*, deux bras du Polype intérieur, qui ſortent par l'ouverture *t*. *e o*, bras du même Polype.

Planche XIII.

La Figure 1, repréſente deux Polypes, mis l'un dans l'autre. *a b*, Polype extérieur. *c a b d*, Polype intérieur.

On voit les mêmes Polypes dans la Figure 2,

mais la portion *i d* du Polype intérieur eſt ſortie du Polype extérieur, en fendant ſa portion *i b*. *a i b*, Polype extérieur. *c a i d*, Polype intérieur.

LA Figure 3, repréſente les Polypes de la Fig. 2, mais après qu'ils ont mangé : c'eſt le Polype intérieur qui a avalé un Ver par ſa bouche *c*. Ce Ver a enſuite rempli toutes les parties des deux Polypes, & les a obligés à s'enfler. *a i b*, Polype extérieur. *c a i d*, Polype intérieur.

LA Figure 4, repréſente les mêmes Polypes, mais après que la portion *c a* du Polype intérieur Fig. 2, a fendu les lévres du Polype extérieur, & s'eſt ſituée de la maniére qu'elle eſt repréſentée dans la Figure 4, où *c o* marque la portion, déſignée dans la Fig. 2 par les lettres *c a*. *a i b*, Polype extérieur. *c o i d*, Polype intérieur.

LA Figure 5, repréſente les Polypes de la Figure 4, mais renflés par les alimens, qui ont été introduits dans leurs eſtomacs, par la bouche *a* du Polype extérieur, & qui ſe ſont répandus dans *a i b* Polype extérieur, & dans *c o i d*, Polype intérieur, enté ſur l'autre.

CES Polypes ont grandi & multiplié, après avoir mangé à diverſes repriſes. La Figure 6, les repréſente. *a i b*, Polype extérieur. *c o i d*, Polype intérieur. *e, e, e, e*, jeunes Polypes.

LES

Les mêmes Polypes ſont encore repréſentés dans la Figure 7. La portion *c o* du Polype intérieur, eſt fort étranglée en *n. a i b*, Polype extérieur. *c n o i d*, Polype intérieur.

La Figure 8, repréſente la portion *c n* de la Figure 7, qui s'eſt ſéparée du reſte en *n*.

On voit, dans la Figure 9, le reſte des deux Polypes. *a i b*, Polype extérieur. *o n*, reſte de la portion *c n o* Fig. 7. du Polype intérieur. *i d*, portion poſtérieure du Polype intérieur.

La Figure 10, repréſente un Polype, dans lequel j'ai mis un autre Polype. La tête du Polype intérieur s'eſt réunie avec celle du Polype extérieur. Ces deux têtes ſe ſont enſuite confondues de maniére, qu'elles n'étoient plus reconnoiſſables que par deux rangs de bras qui étoient l'un au-deſſus de l'autre.

La Figure 11, eſt celle de la moitié d'un Polype que j'ai déchiré en le retournant: je lui ai, après cela, donné encore quelques coups de ciſeaux. Au bout de deux mois, elle s'eſt trouvée telle qu'on la voit repréſentée dans cette Figure.

La Figure 12, repréſente deux moitiés de Polypes qui ont été ſéparés, & qui ſont déjà un peu réunis. *a c*, premiére partie. *c b*, ſeconde partie.

c, endroit où elles ſe ſont réunies, qui eſt fort étranglé.

LA Figure 13, repréſente les mêmes moitiés de Polypes que la précédente, mais elles ſont remplies d'alimens. *a c*, premiére partie. *c b*, ſeconde partie. *c*, endroit où elles ſe ſont réunies, qui eſt fort étranglé.

FIN.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 9.

Fig. 8.

Fig. 7.

Fig. 12.

Fig. 10.

Fig. 16.



Fig. 13.



Fig. 14.



Fig. 19.

Fig. 18.

Fig. 17.

Fig. 23.

Fig. 22.

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 9.



Fig. 8.



Fig. 7.

Fig. 12.



Fig. 14.



Fig. 13.



Digitized by Google

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 9.

Fig. 8.

Fig. 12.

Fig. 11.

Fig. 13.

AVIS AU RELIEUR.

Les Planches doivent être placées ſuivant cette Table.

B E R I G T
VOOR DEN BOEKBINDER.

De Platen moeten gezet worden volgens de onderſtaande Lyſt.

Pl. 1. 2. 3. 4. & 5.	Pag. 78
Pl. 6. & 7.	Pag. 148
Pl. 8. 9. & 10.	Pag. 228
Pl. 11. 12. & 13.	Pag. 324

98

005660776

Digitized by Google